EXCERPTA QUÆDAM

E

NEWTONI

Principiis Philoſophiæ Naturalis,

CUM NOTIS VARIORUM.

CANTABRIGIÆ:

TYPIS ACADEMICIS EXCUDEBAT J. BENTHAM.

Veneunt apud *T. & J. Merrill*, et *J. Nicholſon*, *Cantabrigiæ*; *J. Fletcher* et *D. Prince*, *Oxoniæ*; *B. Dod*, *J. Whiſton & B. White*, et *J. Nourſe*, *Londini*; *Teſſeman*, *Ebor*; *Kincaid & Bell*, *Edinburgiæ*; *R. & A. Foulis*, *Glaſguiæ*; et *Gul. Smith*, *Dublinii*.

M.DCC.LXV.

A

LIST of the SUBSCRIBERS.

A

JAmes Adair, Eſquire, Soho Square, London
James Adair jun. Eſquire
William Adair, Eſquire
William Alder, Eſquire, Berwick upon Tweed
John Alderſon, Eſquire, Cambridge
Charles Allix, Eſquire, Swaffham, Cambridgeſhire
Mr. Allott, Trinity College, Cambridge
Mr. Arden jun. Trinity College, Cambridge
Mr. Arnald, St. John's College, Cambridge

B

Reverend Mr. Backhouſe, M. A. Fellow of Chriſt College, Cambridge
Mr. Tho. Baldwin, B. A. St. Peter's College, Cambridge
Reverend Mr. Barclay, M. A. Fellow of Merton College, Oxford
Reverend Mr. Barker, M. A. Fellow of Queen's College, Cambridge, 2 Copies
Mr. Barnes, St. John's College, Cambridge
Reverend Mr. Barton, M. A. Fellow of Clare-Hall, Cambridge
Reverend Mr. Bates, M. A. Fellow of St. Peter's College, Cambridge
Mr. Bates, B. A. Fellow of King's College, Cambridge
Reverend Mr. Beadon, M. A. Fellow of St. John's College, Cambridge, and Chancellor of St. David's, 2 Copies
Mr. Beecher, B. A. St. John's College, Cambridge
Mr. Bell, B. A. Fellow of Clare-Hall, Cambridge
Reverend Mr. Bell, M. A. Fellow of Pembroke-Hall, Cambridge
Mr. Bennet, Emmanuel College, Cambridge
Mr. Bennet, Trinity College, Cambridge
Mr. Bentham, Cambridge
Library of Berwick upon Tweed
Mr. Beverly, Chriſt College Cambridge
James Bindley, Eſquire, Fellow of St. Peter's College, Cambridge
Reverend Mr. Blackall, Fellow of Emmanuel College
John Eraſmus Blacket, Eſquire, Newcaſtle upon Tyne
Francis Blake, Eſquire, F. R. S.
Mr. Bond, Caius College, Cambridge
Samuel Borlaſe, Eſquire
Reverend William Borlaſe, B. A. St. Peter's College
Mr. George Borlaſe, B.A. St. Peter's College

A LIST of the SUBSCRIBERS.

Reverend Mr. Bowden, M. A. Fellow of Merton College, Oxford
Mr. Brand, Caius College, Cambridge
Saliſbury Brereton, Eſquire, F. R. S.
Mr. Brown, Gentleman Commoner of Hertford College, Oxford
Aſhton Warner Byam, Eſquire, Fellow of St. Peter's College, Cambridge
ReverendMr. Byrche, M. A. late Fellow of Sidney College, 2 Copies
Mr. Byron, St. John's College, Cambridge

C

The Honourable Mr. Cornwallis, B. A. Fellow of Merton College, Oxford
Count Carburi
Sir Gervas Clifton, Baronet, Chriſt College, Cambridge
Mr. Callamy, Fellow-Commoner of Emmanuel College, Cambridge
Reverend Mr. Carlos, M. A. Fellow of Caius College, Cambridge
Reverend Mr. Carr, M. A. Fellow of Clare-Hall, Cambridge
Mr. Carter, Trinity College, Cambridge
Mr. Caſtle, M. A. Caius College
Henry Bolton Cay, Eſquire, Fellow of Clare-Hall
Thomas Chamberlayne, Eſquire, Fellow-Commoner of Clare-Hall, Cambridge
Mr. Chambers, M. A. Fellow of Univerſity College, and Vinerian Law Fellow in the Univerſity of Oxford
Reverend Samuel Chandler, D.D. F. R. S.
Mr. Chapman, M. A. Fellow of Merton College, Oxford
Reverend Mr. Churchill, M. A. Fellow of Clare-Hall, Cambridge
Mr. Clowes, Clare-Hall
Mr. Clubbe, Caius College, Cambridge
Mr. Cole, Trinity College, Cambridge
Doctor Collignon, Profeſſor of Anatomy in the Univerſity of Cambridge
Reverend Mr. Colman, M. A. Fellow of Corpus Chriſti College, Cambridge
Mr. Iſaac Cope, Leek, Staffordſhire
Reverend Mr. Corey, M. A. Fellow of Caius College
Library of Corpus Chriſti College, Oxford
Reverend Mr. Cowper, M. A. Fellow of Corpus Chriſti College, Cambridge
Mr. Thomas Craſter, St. John's College, Cambridge
Mr. Croſley, St. John's College, Cambridge
Lewis Cruſius, D. D. F. R. S. upper Maſter of the Charterhouſe School

D

Reverend Mr. Daker, B. A. Fellow of Magdalen College, Cambridge
Robert Dale, LL. D. Fellow of Trinity-Hall, Cambridge
Reverend Mr. Darby, M. A. Fellow of Jeſus College, Cambridge
Mr. John Davenport, Leek, Staffordſhire
Reverend Mr. Davies, M. A. Fellow of Merton College, Oxford
Reverend Mr. Daviſon, M. A. Fellow of St. Peter's College, Cambridge
Mr. Dawſon, B. A. Jeſus College, Cambridge
Mr. Dean, St. John's College, Cambridge
Mr. Diſney, St. Peter's College, Cambridge

Richard

Richard Hancorn Duppa, Eſquire
Mr. Dutens, Queens College, Cambridge

E

Mr. Earl, M. A. Merton College, Oxford
Mr. Eaton, B. A. St. Peter's College, Cambridge
Charles Egleton, Eſquire, Fellow-Commoner of Queen's College, Cambridge
Reverend Mr. Elliſon, M. A. Fellow of Merton College, Oxford
Reverend William Elliſton, D. D. Maſter of Sidney College, Cambridge
Reverend Mr. Evans, M. A. Fellow of Clare-Hall, Cambridge

F

The Honourable Mr. Fitzwilliams, M. A. Trinity-Hall, Cambridge
Reverend Mr. Farmer, M. A. Fellow of Emmanuel College, Cambridge
William Fauquier, Eſquire, F. R. S.
Mr. Foote, Gentleman-Commoner of Hertford College, Oxford
Mr. John Ford
Reverend Mr. Forſter, M. A. Fellow of Jeſus College, Cambridge
Reverend Thomas Frampton, B. D. Fellow of St. John's College, Cambridge
Mr. Frank, Trinity College, Cambridge

G

The Right Honourable Lord Grey
The Honourable John Grey, M. A. Queen's College, Cambridge
—— Gardner, Eſquire, Fellow-Commoner of St. John's College, Cambridge
Reverend Mr. Gardner, M. A. Fellow of Catherine-Hall, Cambridge
Mr. Glover, St. John's College, Cambridge
Reverend Peter Stephen Goddard, D. D. Maſter of Clare-Hall, Cambridge
Mr. Goodenough, M. A. Merton College, Oxford
John Old Goodford, Eſq; Fellow-Commoner of Queen's College, Cambridge
Reverend John Gordon, D. D. St. Peter's College, Cambridge
William Gordon, Eſquire, Fellow of Queen's College, Cambridge
Samuel William Gordon, Eſquire, Fellow of St. Peter's College, Cambridge
Mr. Graham, Trinity College, Cambridge
Mr. Gregory, Magdalen College, Cambridge

H

John Hadley, M. D. F. R. S. late Fellow of Queen's College, and Profeſſor of Chemiſtry in the Univerſity of Cambridge
Reverend Mr. Hall, B. A. Fellow of St. John's College, Cambridge
Reverend Mr. Hallifax, M. A. Fellow of Lincoln College, Oxford; and Profeſſor of Divinity at Greſham College
George Hardinge, Eſquire, Middle Temple
Reverend John Harris, Vicar of Sturmiſter-Marſhal, Dorſetſhire
John Harriſon, Eſquire, Fellow-Commoner of St. John's College, Cambridge

Mr.

A LIST of the SUBSCRIBERS.

William Heberden, M. D. F. R. S. 6 Copies
Reverend Mr. Henſon, M. A. Fellow of Sidney College, Cambridge
Mr. Heſlop, B. A. Corpus Chriſti College, Cambridge
Mr. Hettley, St. John's College, Cambridge
Reverend Mr. Hey, M. A. Fellow of Sidney College, Cambridge
Noel Hill, Eſquire, Fellow-Commoner of St. John's College, Cambridge
Doctor Hinckley
Jacob Hinde, Eſquire, Langham-Hall, Eſſex
Mr. Hobhouſe, M. A. Brazen Noſe College, Oxford
Reverend Mr. Holcombe, M. A. late Fellow of Chriſt College, Cambridge
Reverend Mr. Hornſby, M. A. Savillian Profeſſor of Aſtronomy in the Univerſity of Oxford
Mr. Hudſon, Queen's College, Cambridge
Julius Hutchinſon, Eſquire, Fellow-Commoner of Sidney College, Cambridge
John Hyde jun. Eſquire, of the Temple

I

Doctor Jebb, Stratford
Mr. Johnſon, Caius College, Cambridge
Reverend Mr. Jones, Cambridge
Mr. Jones, B. A. Trinity College, Cambridge
Mr. Jones, St. Peter's College, Cambridge
Mr. Ironſide, B. A. Fellow of St. John's College, Cambridge
Mr. Ives, B. A. Caius College, Cambridge

K

Reverend Mr. Keate, B. A. Fellow of King's College, Cambridge
Reverend Mr. King, M. A. Fellow of St. Peter's College, Cambridge

L

Mr. Lambert, B. A. Trinity College, Cambridge
Mr. Law, Chriſt College, Cambridge
Reverend John Lawſon, B. D. Rector of Swanſcombe
Reverend Mr. Lee, M. A. Fellow of King's College, Cambridge
Mr. Seymour Leeke, St. Peter's College, Cambridge
Mr. Charles Le Grice, St. John's College, Cambridge
Reverend Mr. Leiceſter, Prebendary of Peterborough
Charlton Leighton, Eſquire, Fellow-Commoner of St. John's College Cambridge
Reverend Mr. Lloyd, M. A. Fellow of Queen's College, Cambridge
Mr. John Lloyd, Queen's College, Cambridge
William Lobb, M. A. Fellow of St. Peter's College, Cambridge
Reverend Roger Long, D. D. Maſter of Pembroke-Hall, and Profeſſor of Aſtronomy in the Univerſity of Cambridge
Reverend Mr. Longmire, M. A. Fellow of St. Peter's College, Cambridge
Mr. Lovell, M. A. Fellow of Merton College, Oxford
Reverend Mr. Ludlam, M. A. Fellow of St. John's College, Cambridge

Mr.

M

Mr. Mace, Clare-Hall, Cambridge
Horatio Mann, Eſquire, St. Peter's College, Cambridge
Reverend Mr. Marſh, Rector of Ford, Northumberland
Reverend Mr. Marſh, M. A. Fellow of Queen's College, Cambridge
Mr. Marſh, St. John's College, Cambridge
Reverend Mr. Martyn, M. A. Fellow of Sidney College, and Profeſſor of Botany in the Univerſity of Cambridge
Francis Maſeres, Eſquire, of the Temple
Lieutenant Colonel Edward Maxwell
Robert Maxwell, Eſquire
Reverend Mr. Michell, B. D. F. R. S. late Fellow of Queen's College, and Woodwardian Profeſſor of Foſſils in the Univerſity of Cambridge
Reverend Mr. Moiſes, M. A. Lecturer of All Saints, Newcaſtle
Mr. Moore, B. A. Trinity College, Cambridge
Reverend Patrick Murdock, D. D. F. R. S.
Reverend Mr. Murhall, M. A. Fellow of Chriſt College, and Senior Proctor in the Univerſity of Cambridge

N

Mr. Naſmith, Corpus Chriſti College, Cambridge
Reverend John Newcombe, D.D. late Maſter of St. John's College, Cambridge, and Dean of Rocheſter
Reverend Mr. Newcombe, M. A. Fellow of Hertford College, Oxford
Reverend John Nicols, D. D. Preacher to the Charterhouſe, and Prebendary of Ely

O

The Right Honourable Arthur Onſlow, Eſquire
George Onſlow, Eſquire, Member of Parliament for the County of Surry
George Onſlow, Eſquire, Member of Parliament for Guilford, Surry
Reverend Mr. Oldham, M. A. Fellow of St. Peter's College, Cambridge
Reverend Mr. Oliver, M. A. Fellow of Sidney College, Cambridge

P

Mr. Pawſon, St. Peter's College, Cambridge
Mr. Peake, St. John's College, Cambridge
Mr. Pearce, St. John's College, Cambridge
Peter Peirſon, Eſquire, of the Inner Temple
Andrew Pemberton, Eſquire, Fellow of St. Peter's College, Cambridge
Mr. Iſaac Pennington, St. John's College, Cambridge
Mr. Penton, Trinity College, Cambridge
Mr. Perrin, Gentleman-Commoner of Chriſt Church, Oxford
John Lewis Petit, M. D. F. R. S.
Mr. Pierſon, B. A. Jeſus College, Cambridge

Mr.

Mr. Popham, Trinity College, Cambridge
Reverend Mr. Porteus, M. A. late Fellow of Chriſt College, Cambridge
William Poſt, Eſquire, Fellow of Queen's College, Cambridge
Mr. Preſton, B. A. Queen's College, Cambridge
Samuel Provooſt, Eſquire, Fellow-Commoner of St. Peter's College, Cambridge
Reverend Mr. Purkis, Fellow of Magdalen College, Cambridge

R

Mr. Rawlinſon, Queen's College, Cambridge
Mr. Rayner, B. A. Caius College, Cambridge
Edward Reeve, Eſquire, Lincoln's Inn
Mr. Richmond, B. A. Trinity College, Cambridge
Reverend William Ridlington, LL. D. Fellow of Trinity-Hall, and Profeſſor of Law in the Univerſity of Cambridge
Mr. Rooke, Trinity College, Cambridge
Mr. Rudd, St. John's College, Cambridge
Mr. Thomas Ruggles, Fellow-Commoner of Sidney College Cambridge
Reverend Mr. Ruſſel, M. A. Fellow of Corpus Chriſti College, Oxford

S

The Right Honourable the Counteſs of Stamford
Reverend Samuel Salter, D. D. Maſter of the Charterhouſe
Mr. Scaife, Trinity College, Cambridge
Reverend Mr. Shepherd, B. D. Fellow of Chriſt College, Plumian Profeſſor of Aſtronomy and Experimental Philoſophy in the Univerſity of Cambridge, and F. R. S.
John Simpſon, Eſquire, Newcaſtle upon Tyne
Reverend John Smith, D. D. Maſter of Caius College, Cambridge
John Smith, Eſquire, Fellow-Commoner of Magdalen College, Cambridge
Mr. Smyth, B. A. Clare-Hall, Cambridge
Mr. Spry, M. A. Fellow of Merton College, Oxford
Reverend William Steggall, M. A. Rector of Wyverſton, Suffolk
Reverend Mr. Stevens, M. A. Fellow of Trinity College, Cambridge
Reverend Mr. Stoddart, B. A. Chriſt College, Cambridge
Mr. Swale, B. A. St. John's College, Cambridge

T

The Honourable Thomas Townſhend, Member of Parliament for the Univerſity of Cambridge
Mr. Taylor, Queen's College, Cambridge
Reverend Mr. Tew, M. A. Fellow of King's College, Cambridge
Reverend Thomas Thorp, M. A. Vicar of Berwick upon Tweed
Mr. Robert Thorp, Newcaſtle upon Tyne
Mr. Tildyard, Fellow-Commoner of Caius College, Cambridge
Reverend Mr. Trevigar
Mr. Travis B. A. St. John's College, Cambridge

Reverend Mr. Tucker, M. A. Canterbury
Reverend Mr. Turner, M. A. Fellow of Merton College, Oxford
Reverend Mr. Turner, M. A. Fellow of Emmanuel College, Cambridge
Mr. Turner, Pembroke-Hall, Cambridge
Mr. Tyſon, B. A. Corpus Chriſti College, Cambridge

W

Mr. Waddington, Clare-Hall, Cambridge
Mr. Ward, B. A. St. John's College, Cambridge
Mr. Ward, Chriſt College, Cambridge
Edward Waring, M. A. Fellow of Magdalen College, Lucaſian Profeſſor of Mathematics in the Univerſity of Cambridge, and F. R. S.
Reverend Mr. Watſon, M. A. Fellow of Trinity College, and Profeſſor of Chemiſtry in the Univerſity of Cambridge
Mr. Watſon, Caius College, Cambridge
Reverend Mr. Weſton, M. A. Fellow of Magdalen College, Oxford
Reverend Mr. Wheeler, M. A. Fellow of Magdalen College, Oxford
Mr. John White, B. A. Caius College, Cambridge
Reverend Mr. Henry Whitfield, Fellow of Pembroke-Hall, Cambridge
John Wilſon, M. A. Fellow of St. Peter's College, Cambridge
Mr. Wilſon, Chriſt College, Cambridge
Mr. Wilſon, Pembroke-Hall, Cambridge
Mr. Wiſe, St. John's College, Cambridge
Francis Wollaſton, Eſquire, F. R. S. 4 Copies
Reverend Francis Wollaſton, LL. B. Rector of Eaſt Dereham, Norfolk
George Woodd, Eſquire, Richmond in Surry
Mr. Woodhouſe, Emmanuel College, Cambridge
Ralph Wormley, Eſquire, Fellow-Commoner of Trinity-Hall, Cambridge
Reverend Mr. Wynter, B. A. Fellow of Sidney College, Cambridge
Reverend Mr. Wyvill, LL. B. Queen's College, Cambridge

Y

The Honourable John Yorke, Eſquire
The Honourable and Reverend James York, Dean of Lincoln

Z

Reverend Mr. Zouch, M. A. Fellow of Trinity College, Cambridge.

CORRIGENDA.

PAG. 11. l. 27. pro *augeantur numero et magnitudine, diminuantur* &c. lege *augeantur numero, et magnitudine diminuantur*. Pag. 21. l. ult. pro *B d*, lege *BD*. Pag. 24. l. 20. pro *Dc*, lege *DC:* l. 21. pro *puncti* a, lege *puncti* Q: l. 23. pro *Dc*, lege *dc:* l. 25. pro *Dc*, lege *dc:* l. 26. pro *DcbA*, lege *DCbA*. Pag. 25. l. 26. pro *Bk*, lege *BK*. Pag. 26. l. 33. pro *AIG*, lege *AI*. Pag. 34. l. 26. pro *B v*, lege *B u*. Pag. 80. l. 19. deeſt *. Pag. 88. l. 21. pro *ob*, lege *ab*. Pag. 89. l. 26. pro *hypotheſes*, lege *hypotheſin*. Pag. 90. l. 30. pro *gravitationum*, lege *gravitationis*. Pag. 102. l. 4. pro *planetos*, lege *planetas*. Pag. 121. l. 33. pro *Prop. IV*, lege *Prop. VI*. Pag. 150. l. 36. pro *ſyzygias*, lege *ſyzygiis*. Pag. 153. l. 29. pro *octantantibus*, lege *octantibus*. Pag. 161. l. 17. et 18. pro *ſignentibus*, lege *ſequentibus*. Pag. 165. l. 34. pro *ineund*, lege *ineundo*.

NEWTONI

PRINCIPIA

PHILOSOPHIÆ NATURALIS.

DEFINITIONES.

1. *Quantitas materiæ eſt menſura ejuſdem orta ex illius denſitate et magnitudine conjunctim.*
2. *Quantitas motus eſt menſura ejuſdem orta ex velocitate et quantitate materiæ conjunctim.*
3. *Materiæ vis inſita eſt potentia reſiſtendi, quâ corpus unumquodque, quantum in ſe eſt, perſeverat in ſtatu ſuo vel quieſcendi vel movendi uniformiter in directum.*
4. *Vis impreſſa eſt actio in corpus exercita, ad mutandum ejus ſtatum vel quieſcendi vel movendi uniformiter in directum.*
5. *Vis centripeta eſt, qua corpora verſus punctum aliquod, tanquam ad centrum, undique trahuntur, impelluntur, vel utcunque tendunt.*

6. *Vis centripetæ quantitas abſoluta eſt menſura ejuſdem major vel minor pro efficacia cauſæ eam propagantis a centro per regiones in circuitu.*
7. *Vis centripetæ quantitas acceleratrix eſt ipſius menſura velocitati proportionalis, quam dato tempore generat.*
8. *Vis centripetæ quantitas motrix eſt ipſius menſura proportionalis motui, quem dato tempore generat.*

Haſce virium quantitates brevitatis gratiâ nominare licet vires motrices, acceleratrices, et abſolutas; et diſtinctionis gratiâ referre ad Corpora centrum petentia, ad corporum Loca, et ad Centrum virium: nimirum vim motricem ad Corpus, tanquam conatum totius in centrum ex conatibus omnium partium compoſitum; et vim acceleratricem ad Locum corporis, tanquam efficaciam quandam de centro per loca ſingula in circuitu diffuſam, ad movenda corpora quæ in ipſis ſunt; vim autem abſolutam ad Centrum tanquam cauſâ aliquâ præditum, ſine quâ vires motrices non propagantur per regiones in circuitu; ſive cauſa illa ſit corpus aliquod centrale (quale eſt Magnes in centro vis magneticæ, vel Terra in centro vis gravitantis) ſive alia aliqua quæ non apparet. Mathematicus duntaxat eſt hic conceptus. Nam virium cauſas et ſedes Phyſicas jam non expendo.

AXIOMATA, SIVE LEGES MOTUS.

AXIOMATA, SIVE LEGES MOTUS.

I.

Corpus omne perſeverare in ſtatu ſuo quieſcendi vel movendi uniformiter in directum, niſi quatenus illud a viribus impreſſis cogitur ſtatum ſuum mutare.

II.

Mutationem motus proportionalem eſſe vi motrici impreſſæ, et fieri ſecundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.

III.

Actioni contrariam ſemper et equalem eſſe reactionem: ſive corporum duorum actiones in ſe mutuo ſemper eſſe æquales et in partes contrarias dirigi.

COROLLARIUM I.

Corpus viribus conjunctis diagonalem parallelogrammi eodem tempore deſcribere, quo latera ſeparatis.

Si corpus dato tempore, vi ſola *M* in loco *A* impreſſa, ferretur uniformi cum motu ab *A* ad *B*; et vi ſola *N* in eodem loco impreſſa, ferretur ab *A* ad *C*: compleatur parallelogrammum *ABDC*, et vi utraque feretur corpus illud eodem tempore in diagonali ab

TAB. I. Fig. 1.

Axiomata, Sive

A ad *D*. Nam quoniam vis *N* agit ſecundum lineam *AC* ipſi *BD* parallelam, hæc vis per legem II. nihil mutabit velocitatem accedendi ad lineam illam *BD* a vi altera genitam. Accedet igitur corpus eodem tempore ad lineam *BD*, ſive vis *N* imprimatur, ſive non; atque ideo in fine illius temporis reperietur alicubi in linea illa *BD*. Eodem argumento in fine temporis ejuſdem reperietur alicubi in linea *CD*, et idcirco in utriuſque lineæ concurſu *D* reperiri neceſſe eſt. Perget autem motu rectilineo ab *A* ad *D* per legem I.

COROLLARIUM II.

Tab. I. Fig. 1.

Et hinc patet compoſitio vis directæ AD *ex viribus quibuſvis obliquis* AB *et* BD, *et viciſſim reſolutio vis cujuſvis directæ* AD *in obliquas quaſcunque* AB *et* BD. *Quæ quidem compoſitio et reſolutio abunde confirmatur ex mechanica.*

Tab. I. Fig. 2.

Ut ſi de rotæ alicujus centro *O* exeuntes radii inæquales *OM*, *ON* filis *MA*, *NP* ſuſtineant pondera *A* et *P*, et quærantur vires ponderum ad movendam rotam: Per centrum *O* agatur recta *KOL* filis perpendiculariter occurrens in *K* et *L*, centroque *O* et intervallorum *OK*, *OL* majore *OL*, deſcribatur circulus occurrens filo *MA* in *D*: et actæ rectæ *OD* parallella ſit *AC*, et perpendicularis *DC*. Quoniam nihil refert, utrum filorum puncta *K*, *L*, *D* affixa ſint an non affixa ad planum rotæ; pondera idem valebunt, ac ſi ſuſpenderentur a punctis *K* et *L* vel *D* et *L*. Ponderis autem *A* exponatur vis tota per lineam *AD*, et hæc reſolvetur in vires *AC*, *CD*, quarum *AC* trahendo radium *OD* directe a centro nihil valet ad movendam rotam; vis autem altera *DC*, trahendo radium *DO* perpendiculariter, idem valet, ac ſi perpendiculariter traheret radium *OL* ipſi *OD* æqualem; hoc eſt, idem atque pondus *P*, ſi modo pondus illud ſit ad pondus *A* ut vis *DC* ad vim *DA*, id eſt (ob ſimilia triangula *ADC*, *DOK*,) ut *OK* ad *OD* ſeu *OL*, Pondera igitur *A* et *P*, quæ ſunt reciproce ut radii in directum poſiti *OK* et *OL*, idem pollebunt,

et ſic conſiſtent in æquilibrio: quæ eſt proprietas notiſſima libræ, vectis, et axis in peritrochio. Sin pondus alterutrum ſit majus quam in hac ratione, erit vis ejus ad movendam rotam tanto major.

Quod ſi pondus *p* ponderi *P* æquale partim ſuſpendatur filo *Np*, partim incumbat plano obliquo *p G:* agantur *p H*, *NH*, prior horizonti, poſterior plano *p G* perpendicularis; et ſi vis ponderis *p* deorſum tendens, exponatur per lineam *p H*, reſolvi poteſt hæc in vires *p N*, *HN*. Si filo *p N* perpendiculare eſſet planum aliquod *p Q*, ſecans planum alterum *p G* in linea ad horizontem parallela; et pondus *p* his planis *p Q*, *p G* ſolummodo incumberet; urgeret illud hæc plana viribus *p N*, *HN*, perpendiculariter nimirum planum *p Q* vi *p N*, et planum *p G*, vi *HN*. Ideoque ſi tollatur planum *p Q*, ut pondus tendat filum; quoniam filum ſuſtinendo pondus jam vicem præſtat plani ſublati, tendetur illud eadem vi *p N*, qua planum antea urgebatur. Unde tenſio fili hujus obliqui erit ad tenſionem fili alterius perpendicularis *P N*, ut *p N* ad *p H*. Ideoque ſi pondus *p* ſit ad pondus *A* in ratione, quæ componitur ex ratione reciproca minimarum diſtantiarum filorum ſuorum *p N*, *AM* a centro rotæ, et ratione directa *p H* ad *p N*; pondera idem valebunt ad rotam movendam, atque ideo ſe mutuo ſuſtinebunt, ut quilibet experiri poteſt.

Pondus autem *p*, planis illis duobus obliquis incumbens, rationem habet cunei inter corporis fiſſi facies internas: et inde vires cunei et mallei innoteſcunt: utpote cum vis qua pondus *p* urget planum *p Q* ſit ad vim, qua idem vel gravitate ſua vel ictu mallei impellitur ſecundum lineam *p H* in plana, ut *p N* ad *p H*; atque ad vim, qua urget planum alterum *p G*, ut *p N* ad *NH*. Sed et vis cochleæ per ſimilem virium diviſionem colligitur; quippe quæ cuneus eſt a vecte impulſus. Uſus igitur corollarii hujus latiſſime patet, et late patendo veritatem ejus evincit; cum pendeat ex jam dictis mechanica tota ab auctoribus diverſimode demonſtrata. Ex hiſce enim facile derivantur vires machinarum, quæ ex rotis, tympanis, trochleis, vectibus, nervis tenſis et pon-

de-

Axiomata, Sive

deribus directe vel oblique aſcendentibus, cæteriſque potentiis mechanicis componi ſolent, ut et vires tendinum ad animalium oſſa movenda.

COROLLARIUM III.

Quantitas motus quæ colligitur capiendo ſummam motuum factorum ad eandem partem, et differentiam factorum ad contrarias, non mutatur ab actione corporum inter ſe.

Etenim actio eique contraria reactio æquales ſunt per legem III, ideoque per legem II. æquales in motibus efficiunt mutationes verſus contrarias partes. Ergo ſi motus fiunt ad eandem partem; quicquid additur motui corporis fugientis, ſubducetur motui corporis inſequentis ſic, ut ſumma maneat eadem quæ prius. Sin corpora obviam eant; æqualis erit ſubductio de motu utriuſque, ideoque differentia motuum factorum in contrarias partes manebit eadem.

COROLLARIUM IV.

Commune gravitatis centrum corporum duorum vel plurium, ab actionibus corporum inter ſe, non mutat ſtatum ſuum vel motus vel quietis; et propterea corporum omnium in ſe mutuo agentium (excluſis actionibus et impedimentis externis) commune centrum gravitatis vel quieſcit vel movetur uniformiter in directum.

[a] Nam ſi puncta duo progrediantur uniformi cum motu in lineis rectis, et diſtantia eorum dividatur in ratione data, punctum dividens vel quieſcit vel progreditur uniformiter in linea recta. Ergo ſi corpora quotcunque moventur uniformiter in lineis rectis, commune centrum gravitatis duorum quorumvis vel quieſcit vel

Tab. I. Fig. 3.

[a] 1. Si rectæ duæ poſitione datæ *AC*, *BD* ad data puncta *A*, *B*, terminentur, datamque habeant rationem ad invicem, et recta *CD*, quâ puncta indeterminata *C*, *D*, junguntur, ſecetur in ratione datâ in *K*: dico quod punctum *K* locabitur in rectâ poſitione datâ.

Concurrant enim rectæ *AC*, *BD* in *E*, et in *BE* capiatur *BG* ad *AE* ut eſt *BD* ad *AC*, ſitque *FD* ſemper æqualis datæ *EG*; et erit ex conſtructione

vel progreditur uniformiter in linea recta; propterea quod linea, horum corporum centra in rectis uniformiter progredientia jungens, dividitur ab hoc centro communi in ratione data. Similiter et commune centrum horum duorum et tertii cujuſvis vel quieſcit vel progreditur uniformiter in linea recta; propterea quod ab eo dividitur diſtantia centri communis corporum duorum et centri corporis tertii in data ratione. Eodem modo et commune centrum horum trium et quarti cujuſvis vel quieſcit vel progreditur uniformiter in linea recta; propterea quod ab eo dividitur diſtantia inter centrum commune trium et centrum quarti in data ratione, et ſic in infinitum. Igitur in ſyſtemate corporum, quæ actionibus in ſe invicem aliiſque omnibus in ſe extrinſecus impreſſis omnino vacant, ideoque moventur ſingula uniformiter in rectis ſingulis, commune omnium centrum gravitatis vel quieſcit vel movetur uniformiter in directum.

Porro in ſyſtemate duorum corporum in ſe invicem agentium, cum diſtantiæ centrorum utriuſque a communi gravitatis centro ſint reciproce ut corpora; erunt motus relativi corporum eorundem, vel accedendi ad centrum illud vel ab eodem recedendi, æquales inter ſe. Proinde centrum illud a motuum æqualibus mutationibus in partes contrarias factis, atque ideo ab actionibus horum corporum inter ſe, nec promovetur, nec retardatur, nec mutationem patitur in ſtatu ſuo quoad motum vel quietem. In ſyſtemate autem corporum plurium, quoniam duorum quorumvis

tione *EC* ad *GD*, hoc eſt, ad *EF* ut *AC* ad *BD*, ideoque in ratione datâ, et propterea dabitur ſpecie triangulum *EFC*. Secetur *CF* in *L* ut ſit *CL* ad *CF* in ratione *CK* ad *CD*; et ob datam illam rationem dabitur etiam ſpecie triangulum *EFL*; proindeque punctum *L* locabitur in rectâ *EL* poſitione datâ. Junge *LK*, et ſimilia erunt triangula *CLK*, *CFD*; et ob datam *FD* et datam rationem *LK* ad *FD* dabitur *LK*. Huic æqualis capiatur *EH*, et erit ſemper *ELKH* parallelogrammum. Locatur igitur punctum *K* in parallelogrammi illius latere poſitione dato *HK*. Q.E.D.

Corol. Ob datam ſpecie figuram *EFLC*, rectæ tres *EF*, *EL*, et *EC*, id eſt *GD*, *HK*, et *EC* datas habent rationes ad invicem.

Eâdem ratione demonſtrari poteſt ſi motus punctorum *C* et *D* non fiant in eodem plano.

AXIOMATA, SIVE

vis in ſe mutuo agentium commune gravitatis centrum ob actionem illam nullatenus mutat ſtatum ſuum; et reliquorum, quibuſcum actio illa non intercedit, commune gravitatis centrum nihil inde patitur; diſtantia autem horum duorum centrorum dividitur a communi corporum omnium centro in partes ſummis totalibus corporum quorum ſunt centra reciproce proportionales; ideoque centris illis duobus ſtatum ſuum movendi vel quieſcendi ſervantibus, commune omnium centrum ſervat etiam ſtatum ſuum: manifeſtum eſt quod commune illud omnium centrum ob actiones binorum corporum inter ſe nunquam mutat ſtatum ſuum quoad motum et quietem. In tali autem ſyſtemate actiones omnes corporum inter ſe, vel inter bina ſunt corpora, vel ab actionibus inter bina compoſitæ; et propterea communi omnium centro mutationem in ſtatu motus ejus vel quietis nunquam inducunt. Quare cum centrum illud ubi corpora non agunt in ſe invicem, vel quieſcit, vel in recta aliqua progreditur uniformiter; perget idem, non obſtantibus corporum actionibus inter ſe, vel ſemper quieſcere, vel ſemper progredi uniformiter in directum; niſi a viribus in ſyſtema extrinſecus impreſſis deturbetur de hoc ſtatu. Eſt igitur ſyſtematis corporum plurium lex eadem, quæ corporis ſolitarii, quoad perſeverantiam in ſtatu motus vel quietis. Motus enim progreſſivus ſeu corporis ſolitarii ſeu ſyſtematis corporum ex motu centri gravitatis æſtimari ſemper debet.

COROLLARIUM V.

Corporum dato ſpatio incluſorum iidem ſunt motus inter ſe, ſive ſpatium illud quieſcat, ſive moveatur idem uniformiter in directum ſine motu circulari.

Nam differentiæ motuum tendentium ad eandem partem, et ſummæ tendentium ad contrarias, eædem ſunt ſub initio in utroque caſu (ex hypotheſi) et ex his ſummis vel differentiis oriuntur congreſſus et impetus quibus corpora ſe mutuo feriunt. Ergo per legem 11 æquales erunt congreſſuum effectus in utroque caſu;

caſu; et propterea manebunt motus inter ſe in uno caſu æquales motibus inter ſe in altero. Idem comprobatur experimento luculento. Motus omnes eodem modo ſe habent in navi, ſive ea quieſcat, ſive moveatur uniformiter in directum.

COROLLARIUM VI.

Si corpora moveantur quomodocunque inter ſe, et à viribus acceleratricibus æqualibus ſecundùm lineas parallelas urgeantur; pergent omnia eodem modo moveri inter ſe, ac ſi viribus illis non eſſent incitata.

Nam vires illæ æqualiter (pro quantitatibus movendorum corporum) et ſecundùm lineas parallelas agendo, corpora omnia æqualiter (quoad velocitatem) movebunt per legem II. ideoque nunquam mutabunt poſitiones et motus eorum inter ſe.

Sectio Prima.

SECTIO I.

De methodo Rationum primarum et ultimarum, cujus ope ſequentia demonſtrantur.

PROOEMIUM.

De methodo Exhauſtionum. — De methodo Indiviſibilium. — De methodo Rationum primarum et ultimarum. — De accomodatione methodi Rationum primarum et ultimarum ad inventionem virium centripetarum.

Datæ propoſitionis veritatem ſæpiſſimè per methodos diverſas ſtabilire conceditur. Eminet vero inter alias illa demonſtrationis forma, quam directam nominare licet: in quâ nimirum, ope axiomatum quorundam ſimpliciſſimorum, vel theorematum quæ antea demonſtrata ſunt, ad propoſitionis ipſius cognitionem, nullâ circuitione factâ, perducimur.

Quoniam vero hominum ſolertia nequit in omni caſu ideas illas intermedias quibus extremæ connectuntur inveſtigare, ſæpiſſimè invenimus geometras permultos præſtantiſſimam hanc veritatem eliciendi rationem invitos ſane declinare, atque ratiocinia ex abſurdo in ſcriptis ſuis paſſim uſurpare. Quandocunque enim aditus ad veritatem immediate perducens vel patebat nullus, vel difficilis ac confragoſus, hypotheſin omnem quam quis excogitare potuit diluendo, præter illam quam ſtabilire et confirmare voluerunt, ex falſis ſuppoſitionibus verum tandem eruebant. Hâc demonſtrationis formâ ſæpiſſimè ſtabilitur veritas propoſitionum ſimpliciſſimarum ad figuras rectilineas ſpectantium. Propoſitiones vero quæ ſpectant ad figuras curvilineas deteguntur, vel immediatâ comparatione legum quibus generantur, vel ope figurarum rectilinearum, inter quas et curvilineas intercedit data relatio: hæ vero relationes inveſtigari nequeunt immediatâ comparatione figurarum, quæ in modo generationis ſunt prorſus diſſimiles; et conſulitur perſpicuitati et evidentiæ geometricæ, ſi ex receptis et conceſſis figurarum rectilinearum proprietatibus ad curvilineas liceat immediatè tranſire. Neceſſariò igitur oritur hujuſce methodi frequentior uſus in inveſtigandis figurarum proprietatibus, ſi curvilinearum relationes ex iiſdem principiis cum eâdem ſimplicitate et evidentiâ determinare vellemus. Cum ſpatia rectilinea inter ſe conferenda ſunt, ut magnitudines eorum patefiant, methodus primaria ea eſt quâ utitur Euclides in Elem. i. 4. ubi triangulum triangulo ſuperponi intelligitur, quamque applicat in omni aliâ comparatione ſpatiorum rectilineorum inter ſe. Cum autem ſpatia curvilinea cum rectilineis vel inter ſe conferenda ſunt, propter geneſeos legem diverſam, eadem methodus applicari nequit. Hinc alio ratiocinati ſunt modo veteres geometræ, methodumque exhauſtionum invenerunt. Secundum hanc inſcribere et circumſcribere ſolebant ſpatia rectilinea ſpatio curvilineo quidem inæqualia, eâ vero lege variata, ut, ſi aſſumatur data quævis quantitas, differentia eorum

rum ita minuetur, ut fiat hâc quantitate minor: et tandem, inveniendo abſurditatem quandam ſequi ſi ſpatia quæ comparabant majora vel minora aliud alio fingerentur, æqualia eſſe concludebant. SECTIO PRIMA.

Exempli gratiâ: Probaturus Archimedes aream circuli æqualem eſſe areæ trianguli, cujus baſis eſt circuli peripheria, et altitudo ſemidiameter, polygonum ABC circulo circumſcribit; probatque, aucto laterum polygoni numero, tale tandem deſcriptum fore polygonum, quod circulum minus quàm pro minimâ aſſignabili differentiâ exſuperabit: patet igitur, triangulum DEF, cujus baſis EF eſt circuli peripheria, et cujus altitudo DC circuli radius, circulo non eſſe majus: ſi enim majus eſſet, polygonum circulo circumſcribere liceret triangulo illo minus: cum vero polygoni peripheria major ſit peripheriâ circuli, polygoni area aream trianguli neceſſariò exſuperabit; area enim polygoni æqualis eſt areæ trianguli cujus baſis eſt polygoni peripheria, et altitudo circuli radius, ideoque triangulum DEF circulo majus eſſe nequit. — Rurſus polygonum aliud in circulo eodem inſcribendo, et comparando aream ejus cum trianguli prædicti areâ, eodem probat argumento trianguli aream circuli areâ minorem non eſſe; et ex præmiſſis concludit, triangulum DEF, cum neque majus neque minus ſit circulo, ei æquale eſſe. TAB. I. FIG. 4.

Ut vero clarius innoteſcat quomodo veteres geometræ à notis proportionibus figurarum rectilinearum curvilineas inter ſe comparabant, aliud jam exemplum methodo exhauſtionum demonſtratum trademus. — Exprimant lineæ AB, AD areas duorum circulorum, et AP, AQ ſimilia polygona in his circulis inſcripta: biſectis perpetuò circulorum arcubus à lateribus polygonorum ſubtenſis, areæ polygonorum propius ad areas circulorum accedent quàm pro datâ quâvis differentiâ; et eandem rationem, quam habent polygona inter ſe, habebunt etiam circuli. Nam, ſi negas, ſit AP ad AQ ut AB ad AE, quæ minor eſt quàm AD: augeantur numero et magnitudine, diminuantur latera polygoni AQ, donec differentia inter aream ejus et aream circuli AD minor fuerit quàm ED (quod fieri poteſt per Elem. x. 1.) ſit hæc differentia $q\,D$, et exprimetur polygonum in circulo AD per Aq; ſitque Ap polygonum ſimile in circulo AB: quoniam eſt $AP : AQ :: AB : AE$ [per hyp.] et polygonum Ap ad ſimile Aq, ut AP ad AQ; erit $AB : AE :: Ap : Aq$; quoniam igitur circulus AB major eſt quàm polygonum inſcriptum Ap, erit AE major quàm Aq; per hypotheſin autem Aq major eſt quàm AE; ergo, his duobus inter ſe repugnantibus, ſequitur polygonum AP non eſſe ad polygonum AQ ut circulus AB ad quantitatem AE quæ minor eſt quàm circulus AD: ob eandem cauſam AQ non eſt ad AP ut AD ad AF minorem quàm AB. Exinde etiam ſequitur, non eſſe AP ad AQ ut AB ad quantitatem Ae quæ major eſt quàm AD; nam ſi AF ſit ad AB ut AD ad Ae, erit AP ad AQ, ut AF, quæ minor eſt quàm AB, ad AD, quod contradicit jam demonſtratis: quoniam igitur AP non eſt ad AQ ut AB ad quantitatem minorem vel majorem quàm AD, ſequitur, circulos AB et AD eandem inter ſe rationem habere quam habent ſimilia polygona inſcripta AP et AQ. TAB. I. FIG. 5.

SECTIO PRIMA.

Ex hâc argumentandi ratione patet univerſaliter veritas propoſitionis, cujus ope omnia hujuſce generis theoremata demonſtrari poſſunt; nempe, ſi duæ variabiles quantitates AP, AQ, invariabilem ſemper rationem inter ſe habentes, accedant ad fixas quantitates AB, AD propius quàm pro datâ quâvis differentiâ, ratio limitum AB, AD eadem eſt ac invariabilis ratio quantitatum AP, AQ.

Hâc methodo propter tœdium improbatâ, ſuperioris ævi geometræ aliam, cui nomen indiviſibilium methodus impoſitum eſt, excogitarunt. Attamen principia quibus innititur hæc argumentandi ratio a fautoribus ejus duriora eſſe conceduntur; atque alii, dum ipſas quæ aſſumuntur hypotheſes captum humanum ſuperare affirmant, hujuſce methodi inventores iter ſane ad veritatem corripuiſſe, vires vero demonſtrationis mathematicæ infirmaſſe, judicarunt. Sequuntur hujuſce generis ratiocinandi exempla quædam à clariſſimo Walliſio deſumpta.

Conſiderantur lineæ ex innumeris punctis conſtare, ſuperficies ex lineis, et ſolida ex ſuperficiebus; vel forſan circulus ex innumeris ſectoribus, ſphæra ex pyramidibus, et ſic in cæteris: et in computandis magnitudinum rationibus ſecundùm hanc methodum, computanda eſt ſumma omnium indiviſibilium elementorum, ex quibus ſuperficies vel ſolida accuratè componi ſupponuntur. Exempli gratiâ: Supponatur parabola $APBB$ conſtare ex lineis quarum una eſt PP, inſcriptum triangulum, et circumſcriptum parallelogrammum ex æquali numero linearum TT, CC: probando ſummam omnium linearum PP in parabolâ eſſe ad ſummam omnium TT in triangulo ut 4 ad 3, et ad ſummam omnium CC in parallelogrammo ut 2 ad 3, concludunt, aream parabolæ eſſe ad aream trianguli ut 4 ad 3, et ad aream parallelogrammi ut 2 ad 3. Simili modo ad ſolida applicatur methodus: ſupponantur enim parabolois, inſcriptus conus, et circumſcriptus cylindrus ex circulis PP, TT, CC conſtare, et ſi probetur ſummam circulorum PP eſſe ad ſummam TT ut 3 ad 2, et ad ſummam CC ut 3 ad 6, concludunt ſolida eſſe in eâdem proportione.

TAB. I. FIG. 6.

Methodus hæc ratiocinandi, modo cautè applicetur, ſatis demonſtrativa eſſe jure habetur; ut ex demonſtratione celeberrimæ illius propoſitionis Archimedis abunde confirmatur; — nempe, ſphæram eſſe ad cylindrum inſcriptum ut 2 ad 3. Secentur cylindrus, hemiſphærium, et conus ejuſdem baſis et altitudinis, planis ad baſim parallelis, quorum unum eſt $CSKDC$: quoniam $SO^2 = CD^2 = SD^2 + DO^2 = SD^2 + DK^2$; et quoniam circuli, quorum hæ lineæ ſunt ſemidiametri, ſunt ut earum quadrata; ſequitur, ſummam omnium circulorum in cylindro æqualem eſſe ſummæ omnium circulorum in hemiſphærio, unà cum ſummâ omnium in cono: ipſe igitur cylindrus, qui ex his circulis componi ſupponitur, æqualis erit hemiſphærio et cono ſimul ſumptis: conus autem eſt tertia pars cylindri; ergo, hoc ſublato, manet hemiſphærium ad cylindrum ut 2 ad 3.

TAB. I. FIG. 7.

Quàm cautè vero applicanda eſt hæc methodus ex ſequentibus exemplis patebit. Si circulus conſideretur tanquam polygonum cujus latera in infinitum diminuuntur, et proinde arcus minimus cum chordâ ejus perfectè coincidere

dere ſupponatur, ſequitur, tempus vibrationis penduli in hoc arcu eſſe æquale tempori deſcenſûs per chordam ejus: ex mechanicis vero patet, quòd ratio hæc, ſi accuratè aſſignari poſſit, ſit ratio quadrantis circuli ad diametrum. Neque aliter ſolvi poteſt hæc difficultas, ni recurratur ad indiviſibilia elementa prioribus infinitè minora.

TAB. I. FIG. 8.

Aliter. Si corpus a quiete decidat uniformi vi gravitatis agitatum, et tempus deſcenſûs ejus dividi concipiatur in infinitè parva momenta, quæ per indiviſibiles partes *ab*, *bc*, *cd* lineæ *an* exprimuntur; et ſi velocitates ſint in his momentis uniformes, et per lineas *bp*, *cq*, *dm* repreſentatæ, ſpatia deſcripta rectè exprimentur per rectangula, *ap*, *bq*, *cm*; in duobus igitur momentis ſecundùm hanc methodum tria deſcribuntur æqualia rectangula, in tribus ſex, et ſic deinceps: ſpatia autem deſcripta revera ſunt ut quadrata temporum; in duobus igitur momentis deficit quarta pars ſpatii, in tribus tertia pars, &c.

Etiamſi exhauſtionum methodus, quâ uſi ſunt veteres in theorematis ſuis difficilioribus inveſtigandis atque demonſtrandis, principiis innitatur quæ et ratio et bis mille annorum autoritas et uſus confirmarant; tamen hæc demonſtrationis forma, quæ forſan autori noſtro celeberrimo propter evidentiam ejus exploratam multùm arrideret, ob longas ambages atque obliquam veritatis inveſtigandæ rationem vehementer diſplicuit. Majoribus vero moleſtiis ſe urgeri perſentit, ſi indiviſibilium doctrinam ad theoremata ſua ſtabilienda converteret. Etenim ipſe conceptus quantitatum illis quæ ſenſibus offeruntur infinitè minorum videtur eſſe perdifficilis; nec ratiociniis inde deductis conceditur fides omnium conſenſu ſtabilita. Newtonus igitur, theoremata illa præclara, quorum veritas lemmatum ſequentium ope deducitur, demonſtrationis formâ confirmare, ut aliquibus placet, antea inauditâ, non indignum judicavit: quæ à nobis ſane reſtat explicanda, atque eâ ratione illuſtranda, ut ſimul eluceant et hujuſce methodi perſpicuitas, et evidentia, atque ad ſequentia accommodatio.

Supponuntur magnitudines non ex partibus indiviſibilibus conſtare, ſed motu perpetuo generari: *Lineæ nempe deſcribuntur, ac deſcribendo generantur, non per appoſitionem partium, ſed per motum continuum punctorum, ſuperficies per motum linearum, ſolida per motum ſuperficierum, anguli per rotationem laterum, tempora per fluxum continuum, et ſic in cæteris. Hæ geneſes in rerum naturâ locum verè habent, et in motu corporum quotidie cernuntur.* Ex finitis igitur magnitudinum hoc modo genitarum incrementis vel decrementis, quæruntur primæ vel ultimæ rationes, quibuſcum magnitudines ipſæ naſcuntur, vel evaneſcunt, vel etiam in infinitum augentur. Hæ vero rationes primæ vel ultimæ inveſtigantur obſervando limites rationum, quæ inter variabiles magnitudines obtinent, dum finitæ ſunt; limites nempe eos ad quos magnitudinum rationes perpetuò accedunt, quos nunquam tranſgredi, neque etiam attingere poſſunt, ſed ad quos propius accedunt quàm pro datâ quâvis differentiâ. Ultimæ igitur rationes magnitudinum evaneſcentium, et primæ naſcentium, non ſunt rationes quas magnitudines ipſæ unquam inter ſe habent, ſed limites omnium variabilium rationum.

SECTIO PRIMA.

Limites omnium variabilium rationum facillimè inveſtigantur reducendo quantitates, quibus generaliter rationes illæ exprimuntur, in terminos quorum pars una ex variabili parte minime pendet; et ſupponendo variabilem illam partem vel evaneſcere, vel in infinitum augeri. Exempli gratiâ: Sint duæ quantitates $ax^n + bx^{n-1}$ et $cx^n + dx^{n-1}$ variabiles propter variabilem x; dividendo per x^{n-1} reducitur ratio hæc ad rationem $ax + b$ ad $cx + d$: evaneſcat x, et fit $ax + b : cx + d :: b : d$; augeatur x in infinitum, et fit $ax + b : cx + d$ (vel $a + \frac{b}{x} : c + \frac{d}{x}$) $:: a : c$. Rationes igitur b ad d, et a ad c ſunt limites omnium variabilium rationum, quæ obtinent inter quantitates $ax^n + bx^{n-1}$ et $cx^n + dx^{n-1}$ dum diminuitur vel augetur valor quantitatis x; quos tamen nunquam tranſgrediuntur, neque attingunt dum x finita eſt; ſed ad quos propius accedere poſſunt quàm pro datâ quâvis differentiâ.

Reſtat ut priuſquam huic proœmio finem imponamus, de accommodatione hujuſce methodi ad virium centripetarum et centrifugarum theoriam perpauca ſubjungamus.

Rationes, quas inter ſe habent ideæ ſpatii, temporis, velocitatis et vis, reſpectu ad earum quantitates vel gradus, exprimi poſſunt vel per notas in arte analytica uſurpatas, vel per varios extenſionis gradus et modos: requiritur ſolummodo ut in his ideis earumque menſuris conſiderandis eadem geneſeos ac variationis conſervetur norma. Si vis acceleratrix agere fingatur intercedentibus finitis et æqualibus temporis periodis, durante unaquâque periodo, prior manet velocitas; ſed hæc, addita velocitati novo vis impulſu generatæ, efficit, ut corpus deinceps motu majori, uniformi vero in ſingulâ periodo, feratur; et differentiæ ſpatiorum, quæ temporibus hiſce æqualibus et finitis deſcribuntur, accuratæ erunt menſuræ differentiarum inter varias velocitates his impulſibus generatas. Si intervalla temporum minuantur, hæ menſuræ in eâdem proportione decreſcunt; et ſi intervalla hæc perpetuò minuantur, ut tandem accedamus ad ſtatum quo indeſinenter agit vis, hoc eſt, ſi intervalla temporum perpetuò accedant ad evaneſcentiæ ſtatum, virium effectus determinantur explorando leges quantitatum quæ ſecundùm normam ſimilem variantur. Proinde, ſi ex hypotheſi indiviſibilium quidquam de earum proprietatibus demonſtrari poſſit, virium acceleratricium effectus et correſpondentes relationes ſimul deteguntur; ſimiliter, ſi ſecundùm Newtoni methodum à variationibus finitis magnitudinum geometricarum ipſarum relationes inveniantur, eodem tempore inveniri poſſunt vel leges virium acceleratricium vel ſpatia his viribus deſcripta. — Et, quoniam patet vim acceleratricem impulſus ſuos non edere poſt finita temporis intervalla, ſed agere eam indeſinenter; ſpatia, vi tali deſcripta, eâdem methodo inveſtigari nequeunt, quâ ſpatia finitis intervallis à ſe invicem diſtincta: neceſſariò igitur requiritur ut aliâ inveſtigationis ratione utamur, hoc eſt, ut vel indiviſibilium vel rationum primarum ac ultimarum doctrina in æſtimandis virium acceleratricium quantitatibus et effectibus uſurpetur.

Si

Si vis acceleratrix in eâdem directione quâ imprimitur vis projectilis corpus ſollicitet, motus erit rectilineus quidem, ſed ob continuam ejus accelerationem oportet ut ad ultimarum rationum doctrinam recurramus ſi ſpatia datis quibuſvis temporibus deſcripta determinare velimus. — Si directio vis acceleratricis cum motu projectili in angulo quocunque componatur, corpus, à directione tangentis perpetuò ſollicitatum, à motu rectilineo retrahitur, et in curvam detorquetur; prout conſpicere licet in corporibus prope ſuperficiem telluris projectis. Curvam inſuper generari niſi motu puncti directionem ſuam perpetuò mutantis concipere non licet. Quoniam igitur et curva et ſemita corporis vi centripetâ vique projectili agitati ſimili prorſus modo generantur, patet quòd ab iiſdem mediis, quibuſcum curvarum proprietates deteguntur, determinari etiam poſſunt leges virium quarum actione corpora in curvas detorquentur; et proinde, ſi ope primarum ac ultimarum rationum curvarum proprietates commodè inveſtigari poſſint, neceſſe eſt ut concedatur Newtono doctrinam hanc ad virium centripetarum leges effectusque determinandos applicare.

LEMMA

LEMMA I.

SECTIO PRIMA.

Quantitates, ut et quantitatum rationes, quæ ad æqualitatem tempore quovis finito [b] *conſtanter tendunt, et ante finem temporis illius propius ad invicem accedunt quàm pro datâ quávis differentiâ, fiunt ultimò æquales.*

SI negas; fiant ultimò inæquales, et ſit earum ultima differentia *D*. Ergo nequeunt propius ad æqualitatem accedere quam pro datâ differentiâ *D*: contra hypotheſin. [c]

LEM-

[b] 2. Quantitates ad æqualitatem tendere dicuntur quarum differentia, mutatâ utcunque quantitatum magnitudine, ita variatur, ut minorem perpetuò rationem habeat ad quantitates ipſas.

3. Fieri poteſt, ut quantitates ad æqualitatem tendant, et tamen non fiant ultimò æquales. Ex. gr. Areæ dantur hyperbolicæ, quæ in infinitum protenſæ nunquam in tempore finito dato rectangulo æquales fiunt: ſumatur rectangulum hoc dato rectangulo majus; et differentia inter aream hyperbolicam perpetuò auctam et hoc rectangulum perpetuò minorem habet rationem ad aream ipſam hyperbolicam, nunquam vero minor evadet quantitate datâ quæ aſſignari poteſt: hæ igitur quantitates, quamvis ad æqualitatem tendunt, nunquam fiunt æquales.

[c] 4. Variari fingantur quantitates ſecundum hanc legem, nimirum ut earum differentia ſemper decreſcens capi poſſit, ut quæ ad quantitates ipſas habeat rationem perpetuò minorem ratione quâvis quæ aſſignari poteſt; velocitates, quibuſcum hæ quantitates generari incipiunt, ſunt æquales. Si enim velocitates in primo momento ponantur inæquales, tum quantitates his velocitatibus deſcriptæ erunt etiam inæquales, et proinde, talis aſſignari poteſt differentia, quæ non habeat ad quantitates ipſas rationem quâvis aſſignabili minorem; quod hypotheſi contradicit.

5. Quoniam veritas hujuſce Lemmatis ſtabilitur deducendo contrariam quamvis hypotheſin ad abſurdum, parum differt ratiocinandi forma ab eâ, quâ uſi ſunt veteres; Newtonus vero, hoc Lemmate, quaſi axiomate vel principio quodam fundamentali, innixus, methodo directâ in ſequentibus utitur, quorum demonſtrationes ad hoc ſemper revocantur, et quaſi in eo continentur.

6. Abs re forſan non erit hujuſce Lemmatis ſenſum exemplis quibuſdam ſimpliciſſimis illuſtrare.

Ex. I.

TAB. II. FIG. 9.

Ex puncto *A* in diametro *BD* circuli *BCD* ducatur linea quævis *AC*, quæ circa punctum *A* verſus *AB* immotam revolvatur, et punctum *C* in peripheriâ

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3




Fig. 4





Fig. 5.






Fig. 6




Fig. 8




Fig. 7

pheriâ circuli inveniatur. Patet [El. iii. 7.] lineam AC augeri donec tandem ad lineam AB perveniat. — Hæ quantitates AB et AC [ſecundùm hoc Lemma] tempore finito ad æqualitatem tendunt, et ante finem temporis illius propius ad invicem accedunt quàm pro datâ quâvis differentiâ, ideoque ſunt ultimò æquales. — Tempus finitum eſt tempus motûs puncti C ad punctum B; per verbum ultimò intelligitur ipſius C ad B appulſus; et proportio AC ad AB in hoc momento eſt ultima harum quantitatum ratio; *i. e.* ratio æqualitatis.

Ex. II. Similiter, ſi punctum E in diametro BD productâ ſumatur, et jungantur E et C puncta; linea EC dum punctum C verſus B moveatur diminuitur [El. iij. 8.]; eadem vero eſt concluſio ut priùs: ſcilicet ratio EC ad EB eſt ultimò ratio æqualitatis.

Ex. III. Circuli diametro BD immotâ manente, ad eam appropinquet linea FG, quæ parallela ei ducitur, et motu ſibi parallelo fertur. Tali motu augetur FG [El. iij. 15.]; ad æqualitatem igitur cum BD tendit, et ante finem temporis finiti propius ad eam accedit quàm pro datâ quâvis differentiâ, ideoque FG ac BD fiunt ultimò æquales.

Tria hæc exempla ad quantitates ſolummodo attinent; Lemma vero de rationibus quantitatum ad æqualitatem tendentibus loquitur, et idcirco ſequentia duo ad hoc illuſtrandum adhibeantur.

Ex. IV. Datis poſitione rectis HI, HK, LMN, et à puncto O in lineâ LN ductâ rectâ lineâ OPQ, ratio QO ad PO major eſt quàm ratio LO ad MO: ſi autem linea OPQ circa punctum O revolvatur, et ad lineam OL appropinquet, manifeſtum eſt rationem QO ad PO diminui, ideoque nullam aſſignari poſſe rationem majorem illâ quam fert OL ad OM, quantulacunque ſit inter eas differentia, quin linea OQ ad OL eo uſque accedat, ut ratio OQ ad OP fiat tandem aſſignatâ illâ minor; — Ideoque LO ad MO eſt ultima ratio lineæ OQ ad lineam OP. Tab. II. Fig. 10.

Ex. V. Iiſdem manentibus ratio trianguli QLO ad triangulum PMO major eſt quàm ratio duplicata lineæ LO ad lineam MO; ob acceſſum verò OQ ad OL ut priùs, ratio triangulorum ad rationem illam duplicatam perpetuò accedit; et ratio duplicata OL ad OM eſt ultima ratio trianguli OLQ ad triangulum OMP.

Si in his quinque exemplis lineam eandem motu contrario ferri, et ex limitibus iiſdem motum ſuum incipere concipiamus, rationes illæ, quæ modò ultimæ fuerunt, mutato verbo primæ vocantur. — Ex. Gr. Si linea OQ à lineâ OL recedat, et ex tali receſſu naſcantur prædicta triangula, ratio duplicata LO ad MO eſt prima naſcentium triangulorum ratio. De cæteris ſimiliter:

Sectio Prima.

LEMMA II.

Tab. II. Fig. 11. *Si in figurâ quâvis* AacE, *rectis* Aa, AE *et curvâ* acE *comprehensâ, inscribantur parallelogramma quotcunque* Ab, Bc, Cd, &c. *sub basibus* AB, BC, CD, &c. *æqualibus, et lateribus* Bb, Cc, Dd, &c. *figuræ lateri* Aa *parallelis contenta; et compleantur parallelogramma* aKbl, bLcm, cMdn, &c. *Dein horum parallelogrammorum latitudo minuatur, et numerus augeatur in infinitum: dico quòd ultimæ rationes, quas habent ad se invicem figura inscripta* AKbLcMdD, *circumscripta* Aalbmcndo E, *et curvilinea* AabcdE, *sunt rationes æqualitatis.*

Nam figuræ inscriptæ et circumscriptæ differentia est summa parallelogrammorum *Kl*, *Lm*, *Mn*, *Do*, hoc est (ob æquales omnium bases) rectangulum sub unius basi *Kb* et altitudinum summa *Aa*, id est, rectangulum *ABla*. [d] Sed hoc rectangulum, eo quod latitudo ejus *AB* in infinitum minuitur, fit minus quovis dato. Ergo (per lemma 1.) figura inscripta et circumscripta, et multo magis figura curvilinea intermedia, fiunt ultimo æquales. Q.E.D.

LEMMA III.

Tab. II. Fig. 11. *Eædem rationes ultimæ sunt etiam rationes æqualitatis, ubi parallelogrammorum latitudines* AB, BC, CD, &c. *sunt inæquales, et omnes minuuntur in infinitum.*

Sit enim *AF* æqualis latitudini maximæ, et compleatur parallelogrammum *FAaf*. Hoc erit majus quam differentia figuræ in-

Tab. II. Fig. 11. [d] 7. Patet vero, quòd basi *AB* diminutâ, rectangulum *ABla* diminuitur: Si bases *AB*, *BC*, *CD*, *DE* bisecentur in ϵ, γ, δ, ε, differentia inter figuras inscriptas et circumscriptas erit rectangulum Aϵλα; cumque hoc rectangulum Aϵλα minorem perpetuò habet proportionem ad figuras ipsas, hæ fi-

inſcriptæ et figuræ circumſcriptæ; at latitudine ſua *AF* in infinitum diminuta, minus fiet dato quovis rectangulo. Q.E.D. [e] SECTIO PRIMA.

LEMMA IV.

Si in duabus figuris AacE, PprT, *inſcribantur (ut ſupra) duæ parallelogrammorum ſeries, ſitque idem amborum numerus, et ubi latitudines in infinitum diminuuntur, rationes ultimæ parallelogrammorum in una figura ad parallelogramma in altera, ſingulorum ad ſingula, ſint eædem; dico quod figuræ duæ* AacE, PprT, *ſunt ad invicem in eadem illa ratione.* TAB. II. FIG. 12.

Etenim ut ſunt parallelogramma ſingula ad ſingula, ita (componendo) fit ſumma omnium ad ſummam omnium, et ita figura ad figuram; exiſtente nimirum figura priore (per lemma III.) ad ſummam priorem, et figura poſteriore ad ſummam poſteriorem in ratione æqualitatis. Q.E.D.

Corol. Hinc ſi duæ cujuſcunque generis quantitates in eundem partium numerum utcunque dividantur; et partes illæ, ubi numerus earum augetur et magnitudo diminuitur in infinitum, datam obtineant rationem ad invicem, prima ad primam, ſecunda ad ſecundam, cæteræque ſuo ordine ad cæteras: erunt tota ad invicem in eadem illa data ratione. Nam ſi in lemmatis hujus figuris ſumantur parallelogramma inter ſe ut partes, ſummæ partium ſemper erunt ut ſummæ parallelogrammorum; atque ideo, ubi

guræ ad æqualitatem tendunt [2]. Continuâ vero biſectione linearum *AB*, *BC*, &c. differentia hæc minor fit quovis dato rectangulo. Ergo (per lemma 1, &c.)

[e] 8. Si chordæ *ab*, *bc*, *cd*, *dE* duci concipiantur, et inſcribi trapezia, *AabB*, *BbcC*, &c. porro ſi tangentes ducantur ad puncta *a*, *b*, *c*, *d*, *E*, figura inſcripta et circumſcripta, et multo magis figura curvilinea intermedia, erunt etiam in ratione æqualitatis. In hoc verò caſu continuâ baſium *AB*, *BC*, *CD* biſectione, figura inſcripta eò augetur, et figura circumſcripta eò diminuitur, ut plus quàm dimidium differentiæ perpetuò auferatur: ideoque per El. x. 1.] differentia earum tandem minor erit quantitate quâvis datâ.

SECTIO PRIMA.

ubi partium et parallelogrammorum numerus augetur et magnitudo diminuitur in infinitum, in ultima ratione parallelogrammi ad parallelogrammum, id eſt (per hypotheſin) in ultima ratione partis ad partem.

LEMMA V.

Similium figurarum latera omnia, quæ ſibi mutuo reſpondent, ſunt proportionalia, tam curvilinea quam rectilinea; et areæ ſunt in duplicata ratione laterum. [f]

LEMMA VI.

TAB. II. FIG. 13.

Si arcus quilibet poſitione datus ACB *ſubtendatur chorda* AB, *et in puncto aliquo* A, *in medio curvaturæ continuæ* [g] *tangatur a recta utrinque producta* AD; *dein puncta*

TAB. II. FIG. 12.

[f] 9. Si parallelogramma in lemmate iv. non ſint numero ſolummodo æqualia, ſed ſint etiam ſimilia, tum ſimiles erunt figuræ $AacE$, $PprT$; eandemque habebunt ad invicem rationem quam rectangula ipſa; *i. e.* rationem laterum duplicatam.

[g] 10. In hoc ſupponere videtur Newtonus, nullam eſſe contrariam curvæ flexuram; nec eſſe punctum A cuſpidem; in quibus caſibus curvatura vel infinitè minor eſt, vel infinitè major curvaturâ circuli. Curvæ autem continuæ generantur motu puncti directionem ſuam continuò mutantis, et ſunt ubique verſus eandem partem cavæ. — Circulus nempe eſt curva continua: inter circulum vero et aliam quamvis curvam continuam hoc intereſt, quòd circuli curvatura, ceu ejus à tangente flexura ubique eadem eſt; in aliis autem curvis modo major fit, modo minor. Cum autem diverſorum circulorum à tangente flexura diverſa ſit, curvaturam curvarum circulorum ope exprimunt geometræ. Neque eſt hæc ratiocinandi methodus aut reprehenſibilis, aut conceptu difficilis. Deſcribi poſſunt circuli numero infiniti, qui eandem lineam tangentem, idemque contactûs punctum habent: duci etiam poteſt curva, ita ut ab eâdem rectâ lineâ in puncto eodem tangatur: patet circulos hos omnes curvam illam in puncto contactûs tangere, diverſoſque habere cum curvâ contactûs vel magis vel minus intimi gradus: Ideoque, prout ex rectis lineis, quæ numero infinitæ per idem curvæ punctum tranſeunt, illa ſolummodo curvam tangit, quæ ita ducitur, ut nulla alia recta inter curvam et tangentem duci queat, quin curvam ſecet; ita quoque, ex prædictis circulis, is eſt curvaturæ circulus, qui tam intimè curvam tangit, ut nullus alius per contactûs punctum deſcribi poſſit, qui tranſit inter circulum et curvam; alii verò

punĉta A, B *ad invicem accedant et coëant*; *dico quod angulus* BAD, *ſub chorda et tangente contentus, minuetur in infinitum et ultimo evaneſcet.* SECTIO PRIMA.

Nam ſi angulus ille non evaneſcit, continebit arcus *ACB* cum tangente *AD* angulum rectilineo æqualem, et propterea curvatura ad punctum *A* non erit continua, contra hypotheſin.

LEMMA VII.

Iiſdem poſitis; *dico quod ultima ratio arcus, chordæ, et tangentis ad invicem eſt ratio æqualitatis.* [h]

Nam

verò omnes circuli vel intra vel extra circulum curvaturæ neceſſariò cadunt: et prout recta linea, quæ curvam tangit, cum curvâ illâ coincidere nequit, ita circulus curvaturæ cum curvâ non coincidit.

His præmiſſis, lemmatis veritas, quæ à Newtono ſubobſcurè deduci videtur, vel forſan ex præconceſſo ſequenti lemmate profluere, facillimè ex naturâ circuli patet. Nam ſi curvatura curvæ finita eſt, et quæ per circulum menſuratur, deſcribi poteſt alius circulus *ABC*, qui cadet intra et circulum curvaturæ et curvam: angulus autem *BAD*, inter chordam *AB* et tangentem *AD* contentus, æqualis eſt angulo *ACB* in alterno ſegmento, et angulus *ACB*, evaneſcente arcu *AB*, evaneſcit: idem in curvâ obtinet à fortiori. TAB. II. FIG. 14.

Hinc etiam lemma obtinet, non ſolum in curvis finitæ curvaturæ, ſed à fortiori in omnibus illis, in quibus curvatura infinitè minor eſt curvaturâ circuli.

[h] 11. Sit *AD* linea finita, ducaturque *dr* lineæ *DR* parallela, occurrens *AB*, *AR* productis in *b* et *r*: erit *AB*: *AD*:: *Ab*: *Ad* [El. vi. 2.]. Transferatur punctum *B* ad *C*, ducanturque *RCE*, et chorda *AC*; et ratio variabilis chordæ et tangentis fiet ratio *AC* ad *AE*. A puncto *d* ut priùs ducatur *dp* ipſi *ER* parallela, occurrens *AC*, *AR* productis in *c* et *p*; eritque *AC*: *AE*:: *Ac*: *Ad*. Tandem cum angulus ſub chordâ et tangente contentus minor fiat quovis angulo rectilineo [Lem. vi.], ratio variabilis *Ac* ad *Ad* accedit propius ad rationem æqualitatis quàm pro datâ quâvis differentiâ; ideoque iis proportionales chorda et tangens ſunt ultimò æquales. Quoniam vero arcui *AC* in triangulo *ACE* contento ſimilis deſcribi queat arcus *Ac* in ſimili triangulo *Acd*; cumque ultimò arcus inter *Ac* et *Ad* intermedius fiat æqualis *Ac* vel *Ad*; arcus quoque *Ac* evaneſcet chordæ vel tangenti æqualis. Q. E. D. TAB. II. FIG. 15.

[12] Hæc propoſitio, circuli ope hoc modo illuſtrari poteſt. — Si à puncto *B* agatur utcunque ſubtenſa *Bd*, efficiens angulum quemlibet finitum *BDA* TAB. II. FIG. 14.

SECTIO PRIMA.

Nam dum punctum *B* ad punctum *A* accedit, intelligantur ſemper *AB* et *AD* ad puncta longinqua *b* ac *d* produci, et ſecanti *BD* parallela agatur *bd*. Sitque arcus *Acb* ſemper ſimilis arcui *ACB*. Et punctis *A*, *B* coëuntibus, angulus *dAb*, per lemma ſuperius, evaneſcet; ideoque rectæ ſemper finitæ *Ab*, *Ad*, et arcus intermedius *Acb* coincident, et propterea æquales erunt. Unde et hiſce ſemper proportionales rectæ *AB*, *AD*, et arcus intermedius *ACB* evaneſcent, et rationem ultimam habebunt æqualitatis. Q.E.D.

TAB. II. FIG. 16.

Corol. 1. Unde ſi per *B* ducatur tangenti parallela *BF*, rectam quamvis *AF* per *A* tranſeuntem perpetuo ſecans in *F*, hæc *BF* ultimo ad arcum evaneſcentem *ACB* rationem habebit æqualitatis, eo quod completo parallelogrammo *AFBD* rationem ſemper habet æqualitatis ad *AD*.

Corol. 2. Et ſi per *B* et *A* ducantur plures rectæ *BE*, *BD*, *AF*, *AG*, ſecantes tangentem *AD* et ipſius parallelam *BF*; ratio ultima abſciſſarum omnium *AD*, *AE*, *BF*, *BG*, chordæque et arcus *AB* ad invicem erit ratio æqualitatis.

Corol. 3. Et propterea hæ omnes lineæ, in omni de rationibus ultimis argumentatione, pro ſe invicem uſurpari poſſunt.

LEMMA VIII.

TAB. II. FIG. 13.

Si rectæ datæ AR, BR *cum arcu* ACB, *chorda* AB *et tangente* AD, *triangula tria* RAB, RACB, RAD *conſtituunt, dein puncta* A, B *accedunt ad invicem: dico quod ultima forma triangulorum evaneſcentium eſt ſimilitudinis, et ultima ratio æqualitatis.*

Nam *BDA* cum tangente *AD*, et ducatur linea *AC* ſubtenſæ *BD* parallela, ſimilia erunt triangula *CAB*, *ABD*; quare *AB*, *AD* et $\overline{CB+BA}$ ſunt ad invicem ut *CA*, *CB* et $\overline{CB+BA}$. Coëat jam punctum *B* cum *A*, eruntque *CA*, *CB* et $\overline{CB}+\overline{BA}$ in ratione æqualitatis, ideoque *AB*, *AD* et *AD* + *BD* ſunt ultimò æquales. Quare à fortiori *AB*, *AD* et arcus *AB* ſunt ultimò in æqualitatis ratione.

Nam dum punctum *B* ad punctum *A* accedit, intelligantur ſemper *AB*, *AD*, *AR* ad puncta longinqua *b*, *d* et *r* produci, ipſique *RD* parallela agi *r b d*, et arcui *ACB* ſimilis ſemper ſit arcus *A c b*, Et coëuntibus punctis *A*, *B*, angulus *b A d* evaneſcet, et propterea triangula tria ſemper [1] finita *r A b*, *r A c b*, *r A d* coincident, ſuntque eo nomine ſimilia et æqualia. Unde et hiſce ſemper ſimilia et proportionalia *R A B*, *R A C B*, *R A D* fient ultimo ſibi invicem ſimilia et æqualia. Q. E. D.

Corol. Et hinc triangula illa, in omni de rationibus ultimis argumentatione, pro ſe invicem uſurpari poſſunt.

LEMMA IX.

Si recta AE *et curva* ABC *poſitione datæ ſe mutuo ſecent in angulo dato* A, *et ad rectam illam in alio dato angulo ordinatim applicentur* BD, CE, *curvæ occurrentes in* B, C, *dein puncta* B, C *ſimul accedant ad punctum* A: *dico quod areæ triangulorum* ABD, ACE *erunt ultimo ad invicem in duplicata ratione laterum.*

Tab. II. Fig. 17.

Etenim dum puncta *B*, *C* accedunt ad punctum *A*, intelligatur ſemper *AD* produci ad puncta longinqua *d* et *e*, ut ſint *A d*, *A e* ipſis *AD*, *AE* proportionales, et erigantur ordinatæ *db*, *ec* ordinatis *DB*, *EC* parallelæ quæ occurrant ipſis *AB*, *AC* productis in *b* et *c*. Duci intelligatur, tum curva *A b c* ipſi *ABC* ſimilis, tum recta *A g*, quæ tangat curvam utramque in *A*, et ſecet ordinatim applicatas *DB*, *EC*, *db*, *ec* in *F*, *G*, *f*, *g*. Tum manente longitudine *A e* coëant puncta *B*, *C* cum puncto *A*; et angulo *c A g* evaneſcente, coincident areæ curvilineæ *A b d*, *A c e* cum rectilineis *A f d*, *A g e*; ideoque (per lemma v.) erunt in duplicata ratione laterum *A d*, *A e*: Sed his areis proportionales ſemper ſunt areæ *ABD*, *ACE*, et his lateribus latera *AD*, *AE*. Ergo et areæ *ABD*,

[1] 13. Veritas hujuſce lemmatis ex coincidentiâ triangulorum nequaquam pendet, ex lemmate vero ſuperiori, et El. i. 8, ſatis patet.

Sectio Prima.

ABD, *ACE* ſunt ultimo in duplicata ratione laterum *AD*, *AE*. Q.E.D.

LEMMA X.

Spatia quæ corpus urgente quacunque vi finita deſcribit, ſive vis illa determinata et immutabilis ſit, ſive eadem continuo augeatur vel continuo diminuatur, ſunt ipſo motus initio in duplicata ratione temporum.

Tab. II. Fig. 17.

Exponantur tempora per lineas *AD*, *AE*, et velocitates genitæ per ordinatas *DB*, *EC*; [k] et ſpatia his velocitatibus deſcripta, erunt ut areæ *ABD*, *ACE* his ordinatis deſcriptæ, hoc eſt, ipſo motus initio (per lemma IX) in duplicata ratione temporum *AD*, *AE*. Q.E.D.

Corol. 1. Et hinc facile colligitur, quod corporum ſimiles ſimilium figurarum partes temporibus proportionalibus deſcribentium errores, qui viribus quibuſvis æqualibus ad corpora ſimiliter applicatis generantur, et menſurantur per diſtantias corporum a figurarum ſimilium locis illis, ad quæ corpora eadem temporibus iiſdem proportionalibus ſine viribus iſtis pervenirent, ſunt ut quadrata temporum in quibus generantur quam proxime. [l]

Corol. 2.

Tab. II. Fig. 18.

[k] 14. Hoc illuſtrare licet ſequenti methodo. Deſcribatur area *DABC* motu lineæ *Dc*, ſibi ipſi parallelo et uniformi: et in eodem tempore deſcribatur linea *PQ* motu uniformi puncti *a*, et repreſentetur velocitas puncti *Q* per lineam *DC*: patet, aream *DABC* et lineam *PQ* in eâdem ratione variari [El. vi. 1.]. Variari fingatur longitudo lineæ moventis *Dc*, et ob variatam puncti *Q* in eâdem ratione velocitatem, eorum effectus in eâdem variantur ratione. Per motum ipſius *D* ad *A*, longitudine *Dc* mutatâ, deſcribitur area *Dcba*, ſpatium igitur à puncto *Q* percurſum, ſeu longitudinem lineæ *PQ* per aream à lineâ *DC* deſcriptam licet exprimere. Cum enim areæ deſcribuntur perpetuo linearum fluxu, lineæque perpetuo punctorum fluxu, ſi velocitas quâcum area creſcit æquetur velocitati puncti moventis, cujus motu linea deſcribitur, rationes linearum, quæ à motu puncti deſcribuntur, accuratè per arearum rationes exprimuntur.

Tab. II. Fig. 19.

[l] 15. Sint lineæ *AD*, *ad*, motu uniformi deſcriptæ in temporibus quibuſvis, agant vires his directionibus perpendiculares, quæ corpora detorqueant in curvas *AB*, *ab*, et quoniam eadem eſt directio virium perturbatricium, idem

Corol. 2. Errores autem qui viribus proportionalibus ad ſimiles figurarum ſimilium partes ſimiliter applicatis generantur, ſunt ut vires et quadrata temporum conjunctim.

Corol. 3. Idem intelligendum eſt de ſpatiis quibuſvis quæ corpora urgentibus diverſis viribus deſcribunt. Hæc ſunt, ipſo motus initio, ut vires et quadrata temporum conjunctim.

Corol. 4. Ideoque vires ſunt ut ſpatia, ipſo motus initio, deſcripta directe et quadrata temporum inverſe.

Corol. 5. Et quadrata temporum ſunt ut deſcripta ſpatia directe et vires inverſe.

LEMMA XI.

Subtenſa evaneſcens anguli contactus, in curvis omnibus curvaturam finitam ad punctum contactus habentibus, eſt ultimo in ratione duplicata ſubtenſæ arcus contermini.

Caſ. 1. Sit arcus ille AB, tangens ejus AD, ſubtenſa anguli contactus ad tangentem perpendicularis BD, ſubtenſa arcus AB. Huic ſubtenſæ AB et tangenti AD perpendiculares erigantur AG, BG, concurrentes in G; dein accedant puncta D, B, G, ad puncta d, b, g, ſitque I interſectio linearum BG, AG ultimo facta ubi puncta D, B accedunt uſque ad A. Manifeſtum eſt quod diſtantia GI minor eſſe poteſt quam aſſignata quævis †. Eſt autem (ex

Tab. III. Fig. 20.

na-

idem evenire debet ac ſi corpus datum datâ vi acceleratrici ſollicitatum ſpatia diverſa temporibus diverſis deſcriberet, hoc eſt, erunt ſpatia vel errores DB, db in temporum ratione duplicatâ: ſumantur alia quævis tempora et erunt errores RK, rk in eâdem temporum ratione duplicatâ. Corpore vero ad B pervento motus Bk reſolvi poteſt in motus BL, BT, quorum ſi BT directio mutetur ut fiat BP, corpus ad finem temporis verſabitur in Q, et error QR non erit ad errorem rk ut priùs in ratione temporis duplicatâ, et proinde neceſſe eſt ut anguli applicationis maneant iidem ſi errores temporis quadrato proportionales eſſe vellemus.

PROPOSITIO.

† 16. — Poſito quòd rectangulum $BD \times DG$ ſit ſemper æquale AD^2, et quòd punctum G deſcribat curvam GgI, tranſeatque ultimò per I; circulus, cujus chorda eſt AI et tangens AD, eandem habebit curvaturam quàm curva AbB in loco A.

Tab. III. Fig. 21.

Dem. Oc-

SECTIO PRIMA.

natura circulorum per puncta ABG, Abg tranſeuntium) AB *quad.* æquale $AG \times BD$, et Ab *quad.* æquale $Ag \times bd$; ideoque ratio

DEM. Occurrat linea DG circulo in C et E; et per naturam circuli erit Rect. $CD \times DE = DA^2 =$ Rect. $BD \times DG$ [per Hyp.]; unde eſt $CD : BD :: DG : DE$; tranſeat primò GgI extra circulum, erit ſemper CD major quàm BD, et tranſibit curva AbB extra circulum AcC: circulus autem, cujus chorda minor eſt quàm AI, tranſibit infra circulum AcC: et circulus, cujus chorda major eſt quàm AI, tranſibit extra curvam AbB; nam fit ut priùs $qD : BD :: DG : D\mathcal{Q}$, et quoniam eſt chorda Ai major quàm AI, DG non occurrere poteſt cum AI, quin fiat $D\mathcal{Q}$ major quàm DG, et BD major quam qD: nullus igitur circulus tranſire poteſt inter curvam AbB et circulum AcC; et proinde eandem habent curvaturam.

Si tranſeat IgG intra circulum curvaturæ, eodem argumento patet, quòd BD major ſit quàm CD, quòd curva AbB tranſeat infra circulum AcC, et quòd nullus deſcribi poſſit circulus, qui non tranſit vel intra vel extra tam circulum AcC, quàm curvam AbB.

TAB. III. FIG. 22.

Cor. 1. — Sequitur circulum atque curvam eò propius ad coincidentiam accedere quò minor eſt angulus GIE. — Sit enim Am alia quævis curva, cujus tangens eſt AD, et ſit rectangulum $mD \times Dg$ ſemper æquale AD^2, curva Am eandem habebit curvaturam in puncto A quam circulus AC; tranſeat punctum g inter IG et IE, et quoniam eſt $Dm \times Dg = AD^2 = DB \times DG$, fit $Dm : BD :: DG : Dg$, ergo Dm major eſt quàm DB: eodem modo patet, eſſe $Dm : DC :: DE : Dg$, et Dm minorem eſſe quàm DC; punctum igitur m tranſit neceſſariò intra circulum AC et curvam AB. Exinde patet, diverſos eſſe gradus contactûs pro diverſo angulo GIE, ſi angulus ille finitus eſſe ſupponatur. Sit autem angulus GIE ejuſdem generis cum angulo inter tangentem et circulum contento, vel habeat curva GI eandem curvaturam cum circulo, et ſic deinceps; erit in ſingulis his caſibus contactus curvæ AB cum circulo AC indefinitè propior quàm priùs.

TAB. III. FIG. 23.

Cor. 2. Si linea AI ſit curvæ GI aſymptotus, quò major eſt AI diameter circuli, eò propius accedit circulus ad curvam AB: quoniam autem linea AI indefinitè producta nunquam attingat curvam GI, circulus cujus diameter eſt AIG nunquam habebit eandem curvaturam cum curvâ AB. In hoc caſu diameter curvaturæ indefinitè magna eſt, vel curvatura indefinitè minor eſſe dicitur quàm curvatura circuli; uti accidit in vertice parabolæ cubicalis, et in omni curvâ in quâ abſciſſa eſt ut dignitas ordinatæ quæ major eſt quàm quadratum.

Cor. 3. Tranſeat GI per punctum A; erit AI diameter curvaturæ indefinitè parva; et curvatura indefinitè major eſſe dicitur quàm curvatura circuli: hujus exemplum habemus in vertice parabolæ ſemicubicalis, et in omni curvâ in quâ ſubtenſa eſt ut dignitas ordinatæ quadrato minor.

pag. 26

TAB II

Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 11.





Fig. 12.






Fig. 13.




Fig. 15.




Fig. 14.




Fig. 16.




Fig. 19.




Fig. 17.






Fig. 18.





P Q

ratio *AB quad.* ad *Ab quad.* componitur ex rationibus *AG* ad *Ag* et *BD* ad *bd*. Sed quoniam *GI* aſſumi poteſt minor longitudine quavis aſſignata, fieri poteſt ut ratio *AG* ad *Ag* minus differat a ratione æqualitatis quam pro differentia quavis aſſignata, ideoque ut ratio *AB quad.* ad *Ab quad.* minus differat a ratione *BD* ad *bd* quam pro differentia quavis aſſignata. Eſt ergo, per lemma 1, ratio ultima *AB quad.* ad *Ab quad.* eadem cum ratione ultima *BD* ad *bd*. Q.E.D.

Caſ. 2. Inclinetur jam *BD* ad *AD* in angulo quovis dato, et eadem ſemper erit ratio ultima *BD* ad *bd* quæ prius, ideoque eadem ac *AB quad.* ad *Ab quad.* Q.E.D.

Caſ. 3. Et quamvis angulus *D* non detur, ſed recta *BD* ad datum punctum convergat, vel alia quacunque lege conſtituatur; tamen anguli *D*, *d* communi lege conſtituti ad æqualitatem ſemper vergent et propius accedent ad invicem quam pro differentia quavis aſſignata, ideoque ultimo æquales erunt, per lem. 1. et propterea lineæ *BD*, *bd* ſunt in eadem ratione ad invicem ac prius. Q.E.D.

Corol. 1. Unde cum tangentes *AD*, *Ad*, arcus *AB*, *Ab*, et eorum ſinus *BC*, *bc* fiant ultimo chordis *AB*, *Ab* æquales; erunt etiam illorum quadrata ultimo ut ſubtenſæ *BD*, *bd*.

Corol. 2. Eorundem quadrata ſunt etiam ultimo ut ſunt arcuum ſagittæ, quæ chordas biſecant et ad datum punctum convergunt. Nam ſagittæ illæ ſunt ut ſubtenſæ *BD*, *bd*.

Corol. 3. Ideoque ſagitta eſt in duplicata ratione temporis quo corpus data velocitate deſcribit arcum.

Corol. 4. Triangula rectilinea *ADB*, *Adb* ſunt ultimo in triplicata ratione laterum *AD*, *Ad*, inque ſeſquiplicata laterum *DB*, *db*; utpote in compoſita ratione laterum *AD* et *DB*, *Ad* et *db* exiſtentia. Sic et triangula *ABC*, *Abc* ſunt ultimo in triplicata ratione laterum *BC*, *bc*. Rationem vero ſeſquiplicatam voco triplicatæ ſubduplicatam, quæ nempe ex ſimplici et ſubduplicata componitur.

Sectio Prima.

Corol. 5. Et quoniam DB, db ſunt ultimo parallelæ et in duplicata ratione ipſarum AD, Ad: erunt areæ ultimæ curvilineæ ADB, Adb (ex natura parabolæ) duæ tertiæ partes triangulorum rectilineorum ADB, Adb; et ſegmenta AB, Ab partes tertiæ eorundem triangulorum. Et inde hæ areæ et hæc ſegmenta erunt in triplicata ratione tum tangentium AD, Ad, tum chordarum et arcuum AB, Ab.

Scholium.

Cæterum in his omnibus ſupponimus angulum contactus nec infinite majorem eſſe angulis contactuum, quos circuli continent cum tangentibus ſuis, nec iiſdem infinite minorem; hoc eſt, curvaturam ad punctum A nec infinite parvam eſſe nec infinite magnam, ſeu intervallum AI finitæ eſſe magnitudinis. Capi enim poteſt DB ut AD^3: quo in caſu circulus nullus per punctum A inter tangentem AD et curvam AB duci poteſt, proindeque angulus contactus erit infinite minor circularibus. Et ſimili argumento ſi fiat DB ſucceſſive ut AD^4, AD^5, AD^6, AD^7, &c. habebitur ſeries angulorum contactus pergens in infinitum, quorum quilibet poſterior eſt infinite minor priore. Et ſi fiat BD ſucceſſive ut AD^2, $AD^{\frac{1}{2}}$, $AD^{\frac{4}{3}}$, $AD^{\frac{5}{4}}$, $AD^{\frac{6}{5}}$, $AD^{\frac{7}{6}}$, &c. habebitur alia ſeries infinita angulorum contactus, quorum primus eſt ejuſdem generis cum circularibus, ſecundus infinite major, et quilibet poſterior infinite major priore. Sed et inter duos quoſvis ex his angulis poteſt ſeries utrinque in infinitum pergens angulorum intermediorum inſeri, quorum quilibet poſterior erit infinite major minorve priore. Ut ſi inter terminos AD^2 et AD^1 inſeratur ſeries $AD^{\frac{13}{6}}$, $AD^{\frac{11}{5}}$, $AD^{\frac{9}{4}}$, $AD^{\frac{7}{3}}$, $AD^{\frac{5}{2}}$, $AD^{\frac{8}{3}}$, $AD^{\frac{11}{4}}$, $AD^{\frac{14}{5}}$, $AD^{\frac{17}{6}}$, &c. Et rurſus inter binos quoſvis angulos hujus ſeriei inſeri poteſt ſeries nova angulorum intermediorum ab invicem infinitis intervallis differentium. Neque novit natura limitem [m].

Quæ

Tab. III. Fig. 24.

* [m] 17. Si curvæ AB, AC, et recta AD ſe mutuò contingant in loco A, actâque ſecundùm quamcunque legem rectâ DBC, fuerit DB, vel univerſaliter, vel ſaltem evaneſcens, ut AD^m, et CD ut AD^n, exiſtente m majore quàm n: dico angulum contactûs BAD infinitè minorem fore angulo CAD, et idcirco nullam

Quæ de curvis lineis deque ſuperficiebus comprehenſis demonſtrata ſunt, facile applicantur ad ſolidorum ſuperficies, curvas et contenta. Præmiſi vero hæc lemmata, ut effugerem tædium deducendi longas demonſtrationes, more veterum geometrarum, ad abſurdum. Contractiores enim redduntur demonſtrationes per methodum indiviſibilium. Sed quoniam durior eſt indiviſibilium hypotheſis, et propterea methodus illa minus geometrica cenſetur; malui demonſtrationes rerum ſequentium ad ultimas quantitatum evaneſcentium ſummas et rationes, primaſque naſcentium, id eſt, ad limites ſummarum et rationum deducere; et propterea limitum illorum demonſtrationes qua potui brevitate præmittere. His enim idem præſtatur quod per methodum indiviſibilium; et principiis demonſtratis jam tutius utemur. Proinde in ſequentibus, ſi quando quantitates tanquam ex particulis conſtantes conſideravero, vel ſi pro rectis uſurpavero lineolas curvas; nolim indiviſibilia, ſed evaneſcentia diviſibilia, non ſummas et rationes partium determinatarum, ſed ſummarum et rationum limites ſemper intelligi; vimque talium demonſtrationum ad methodum præcedentium lemmatum ſemper revocari.

Objectio eſt, quod quantitatum evaneſcentium nulla ſit ultima proportio; quippe quæ, antequam evanuerunt, non eſt ultima, ubi evanuerunt, nulla eſt. Sed et eodem argumento æque contendi poſſet nullam eſſe corporis ad certum locum, ubi motus finiatur, pervenientis velocitatem ultimam: hanc enim, antequam corpus attingit locum, non eſſe ultimam, ubi attingit, nullam eſſe.

lam lineam curvam ejuſdem generis cum AC duci poſſe inter curvam AB et tangentem ſuam AD.

Eſto enim $BD = \frac{AD^m}{p}$, et $CD = \frac{AD^n}{q}$, poſitis p et q finitis et conſtantibus, erit BD ad CD ut $\frac{AD^m}{p}$ ad $\frac{AD^n}{q}$, vel ut AD^m ad $AD^n \times \frac{p}{q}$, vel ut AD^{m-n} ad $\frac{p}{q}$. Evaneſcat jam AD et ſimul AD^{m-n}, et BD jam erit ad CD ut quantitas evaneſcens AD^{m-n} ad quantitatem finitam $\frac{p}{q}$, vel ut finitum ad infinitum: Eſt itaque ſubtenſa evaneſcens BD infinitè minor ſubtenſâ evaneſcente CD, et propterea angulus BAD angulo CAD. Q. E. D.

SECTIO PRIMA.

eſſe. Et reſponſio facilis eſt: Per velocitatem ultimam intelligi eam, qua corpus movetur, neque antequam attingit locum ultimum et motus ceſſat, neque poſtea, ſed tunc cum attingit; id eſt, illam ipſam velocitatem quacum corpus attingit locum ultimum et quacum motus ceſſat. Et ſimiliter per ultimam rationem quantitatum evaneſcentium, intelligendam eſſe rationem quantitatum, non antequam evaneſcunt, non poſtea, ſed quacum evaneſcunt. Pariter et ratio prima naſcentium eſt ratio quacum naſcuntur. Et ſumma prima et ultima eſt quacum eſſe (vel augeri aut minui) incipiunt et ceſſant. Extat limes quem velocitas in fine motus attingere poteſt, non autem tranſgredi. Hæc eſt velocitas ultima. Et par eſt ratio limitis quantitatum et proportionum omnium incipientium et ceſſantium. Cumque hic limes ſit certus et definitus, problema eſt vere geometricum eundem determinare. Geometrica vero omnia in aliis geometricis determinandis ac demonſtrandis legitime uſurpantur.

Contendi etiam poteſt, quod ſi dentur ultimæ quantitatum evaneſcentium rationes, dabuntur et ultimæ magnitudines: et ſic quantitas omnis conſtabit ex indiviſibilibus, contra quam *Euclides* de incommenſurabilibus, in libro decimo elementorum, demonſtravit. Verum hæc objectio falſæ innititur hypotheſi. Ultimæ rationes illæ quibuſcum quantitates evaneſcunt, revera non ſunt rationes quantitatum ultimarum, ſed limites ad quos quantitatum ſine limite decreſcentium rationes ſemper appropinquant; et quas propius aſſequi poſſunt quam pro data quavis differentia, nunquam vero tranſgredi, neque prius attingere quam quantitates diminuuntur in infinitum. Res clarius intelligetur in infinite magnis. Si quantitates duæ quarum data eſt differentia augeantur in infinitum, dabitur harum ultima ratio, nimirum ratio æqualitatis, nec tamen ideo dabuntur quantitates ultimæ ſeu maximæ quarum iſta eſt ratio. In ſequentibus igitur, ſiquando facili rerum conceptui conſulens dixero quantitates quam minimas, vel evaneſcentes, vel ultimas; cave intelligas quantitates magnitudine determinatas, ſed cogita ſemper diminuendas ſine limite.

SECTIO SECUNDA.

SECTIO II.

De inventione virium centripetarum.

PROPOSITIO I. THEOREMA I.

Areas, quas corpora in gyros acta radiis ad immobile centrum virium ductis describunt, et in planis immobilibus consistere, et esse temporibus proportionales.

Dividatur tempus in partes æquales, et prima temporis parte describat corpus vi insita rectam AB. Idem secunda temporis parte, si nil impediret, recta pergeret ad c, (per leg. I.) describens lineam Bc æqualem ipsi AB; adeo ut radiis AS, BS, cS ad centrum actis, confectæ forent æquales areæ ASB, BSc. Verum ubi corpus venit ad B, agat vis centripeta impulsu unico sed magno, efficiatque ut corpus de recta Bc declinet et pergat in recta BC. Ipsi BS parallela agatur cC, occurrens BC in C; et completa secunda temporis parte, corpus (per legum corol. 1.) reperietur in C, in eodem plano cum triangulo ASB. Junge SC; et triangulum SBC, ob parallelas SB, Cc, æquale erit triangulo SBc, atque ideo etiam triangulo SAB. Simili argumento si vis centripeta successive agat in C, D, E, &c. faciens ut corpus singulis temporis particulis singulas describat rectas CD, DE, EF, &c. jacebunt hæ omnes in eodem plano; triangulum SCD triangulo SBC, et SDE ipsi SCD, et SEF ipsi SDE æquale erit. Æqualibus igitur temporibus æquales areæ in plano immoto describuntur: et componendo, sunt arearum summæ quævis $SADS$, $SAFS$ inter se, ut sunt tempora descriptionum. Augeatur jam numerus et minuatur latitudo triangulorum in infinitum; et eorum ultima perimeter ADF erit linea curva [8]: ideoque vis centripeta, qua corpus a tangente hujus curvæ perpetuo retrahitur, aget indefinenter; areæ vero quævis descriptæ $SADS$, $SAFS$ temporibus descriptionum semper proportionales, erunt iisdem temporibus in hoc casu proportionales. Q.E.D.

TAB. III. FIG. 25.

Corol. 1.

SECTIO SECUNDA.

Corol. 1. Velocitas corporis in centrum immobile attracti eſt in ſpatiis non reſiſtentibus reciproce ut perpendiculum a centro illo in orbis tangentem rectilineam demiſſum. Eſt enim velocitas in locis illis A, B, C, D, E, ut ſunt baſes æqualium triangulorum AB, BC, CD, DE, EF; et hæ baſes ſunt reciproce ut perpendicula in ipſas demiſſa [n].

Corol. 2. Si arcuum duorum æqualibus temporibus in ſpatiis non reſiſtentibus ab eodem corpore ſucceſſive deſcriptorum chordæ AB, BC compleantur in parellogrammum $ABCV$, et hujus diagonalis BV in ea poſitione quam ultimo habet ubi arcus illi in infinitum diminuuntur, producatur utrinque; tranſibit eadem per centrum virium.

Corol. 3. Si arcuum æqualibus temporibus in ſpatiis non reſiſtentibus deſcriptorum chordæ AB, BC, ac DE, EF compleantur in parallelogramma $ABCV$, $DEFZ$; vires in B et E ſunt ad invicem in ultima ratione diagonalium BV, EZ, ubi arcus iſti in infinitum diminuuntur. Nam corporis motus BC et EF componuntur (per legum corol. 1.) ex motibus Bc, BV et Ef, EZ: atqui BV et EZ, ipſis Cc et Ff æquales, in demonſtratione propoſitionis hujus generabantur ab impulſibus vis centripetæ in B et E, ideoque ſunt his impulſibus proportionales.

Corol. 4. Vires quibus corpora quælibet in ſpatiis non reſiſtentibus a motibus rectilineis retrahuntur ac detorquentur in orbes curvos ſunt inter ſe ut arcuum æqualibus temporibus deſcriptorum ſagittæ illæ quæ convergunt ad centrum virium, et chordas biſecant ubi arcus illi in infinitum diminuuntur. Nam hæ ſagittæ ſunt ſemiſſes diagonalium, de quibus egimus in corollario tertio.

Corol. 5. Ideoque vires eædem ſunt ad vim gravitatis, ut hæ ſagittæ ad ſagittas horizonti perpendiculares arcuum parabolicorum, quos projectilia eodem tempore deſcribunt.

Corol. 6.

[n] 18. Triangula prædicta non ſunt in diverſis orbitis neceſſariò æqualia; quoniam vero baſes diverſorum triangulorum ſint ut areæ directè, et ut perpendicula in ipſas demiſſa inversè; erunt idcirco velocitates, quæ per has baſes repreſentantur, univerſaliter ut areæ triangulorum directè, et ut perpendicula inversè.

Corol. 6. Eadem omnia obtinent per legum corol. v. ubi plana, in quibus corpora moventur, una cum centris virium, quæ in ipſis ſita ſunt, non quieſcunt, ſed moventur uniformiter in directum.

PROPOSITIO II. THEOREMA. II.

Corpus omne, quod movetur in linea aliqua curva in plano deſcripta, et radio ducto ad punctum vel immobile, vel motu rectilineo uniformiter progrediens, deſcribit areas circa punctum illud temporibus proportionales, urgetur a vi centripeta tendente ad idem punctum [°].

Caſ. 1. Nam corpus omne, quod movetur in linea curva, detorquetur de curſu rectilineo per vim aliquam in ipſum agentem (per leg. 1.) Et vis illa, qua corpus de curſu rectilineo detorquetur, et cogitur triangula quam minima *SAB*, *SBC*, *SCD*, &c. circa punctum immobile *S* temporibus æqualibus æqualia deſcribere, agit in loco *B* ſecundum lineam parallelam ipſi *cC* (per prop. XL. lib. 1. elem. et leg. 11.) hoc eſt, ſecundum lineam *BS*; et in loco *C* ſecundum lineam ipſi *dD* parallelam, hoc eſt, ſecundum lineam *SC*, &c. Agit ergo ſemper ſecundum lineas tendentes ad punctum illud immobile *S*. Q. E. D.

Tab. III. Fig. 25.

Caſ. 2. Et, per legum corollarium quintum, perinde eſt, ſive quieſcat ſuperficies, in qua corpus deſcribit figuram curvilineam, ſive moveatur eadem una cum corpore, figura deſcripta, et puncto ſuo *S* uniformiter in directum.

Corol. 1. In ſpatiis vel mediis non reſiſtentibus, ſi areæ non ſunt temporibus proportionales, vires non tendunt ad concurſum radiorum; ſed inde declinant in conſequentia, ſeu verſus plagam in quam

[°] 19. Hinc facilè colligitur, vires, quibus planetæ primarii perpetuò retrahuntur à motibus rectilineis, et in orbibus ſuis retinentur, reſpicere ſolem: ex obſervationibus enim conſtat, planetas primarios, paulo celeriùs in periheliis ac tardiùs in apheliis moventes, radiis ad ſolem ductis areas temporibus proportionales percurrere.

SECTIO SECUNDA.

quam fit motus, ſi modo arearum deſcriptio acceleratur: ſin retardatur, declinant in antecedentia [p].

Corol. 2. In mediis etiam reſiſtentibus, ſi arearum deſcriptio acceleratur, virium directiones declinant a concurſu radiorum verſus plagam in quam fit motus.

PROPOSITIO III. THEOREMA III.

Corpus omne, quod radio ad centrum corporis alterius utcunque moti ducto, deſcribit areas circa centrum illud temporibus proportionales, urgetur vi compoſita ex vi centripeta tendente ad corpus illud alterum, et ex vi omni acceleratrice qua corpus illud alterum urgetur [q].

Patet a priori.

PROPOSITIO IV. THEOREMA IV.

Corporum, quæ diverſos circulos æquabili motu deſcribunt, vires centripetas ad centra eorundem circulorum tendere; et eſſe inter ſe, ut ſunt arcuum ſimul deſcriptorum quadrata applicata ad circulorum radios.

Tendunt hæ vires ad centra circulorum per prop. II. et corol. 2. prop. I. et ſunt inter ſe ut arcuum æqualibus temporibus quam minimis deſcriptorum ſinus verſi per corol. 4. prop. I. hoc eſt, ut quadrata

TAB. III. FIG. 26.

[p] 20. Sequitur ex demonſtratione quòd, cum areæ ſint temporibus proportionales, cC parallela ſit lineæ SB, verſuſque centrum dirigatur. Si augeatur area compleaturque parallelogrammum $xcBv$, (ſecundùm legum corol. 11.) patet lineam cx, eique parallelam Bv, à centro S verſus plagam in quam fit motus declinare: Si diminuatur area; cy, eique parallela Bu à centro S in antecedentia declinat.

[q] 21. Hinc ſequitur, vim quâ luna perpetuò retrahitur à motu rectilineo, et in orbe ſuo retinetur, reſpicere terram. Conſtat enim, ex motu ejus apparente cum diametro apparente collato, lunam, radio ad centrum terræ ducto, aream tempori proportionalem deſcribere. Idem intellige de planetis qui Saturnum et Jovem comitantur.

quadrata arcuum eorundum ad diametros circulorum applicata per lem. vii. et propterea, cum hi arcus ſint ut arcus temporibus quibuſvis æqualibus deſcripti, et diametri ſint ut eorum radii; vires erunt ut arcuum quorumvis ſimul deſcriptorum quadrata applicata ad radios circulorum. Q. E. D.

Corol. 1. Cum arcus illi ſint ut velocitates corporum, vires centripetæ erunt in ratione compoſita ex duplicata ratione velocitatum directe, et ratione ſimplici radiorum inverſe [r].

Corol. 2. Et, cum tempora periodica ſint in ratione compoſita ex ratione radiorum directe, et ratione velocitatum inverſe; vires centripetæ ſunt in ratione compoſita ex ratione radiorum directe, et ratione duplicata temporum periodicorum inverſe [s].

Corol. 3. Unde ſi tempora periodica æquentur, et propterea velocitates ſint ut radii; erunt etiam vires centripetæ ut radii: et contra [t].

Corol. 4. Si et tempora periodica et velocitates ſint in ratione ſubduplicata

[r] 22. Sit C vis centripeta, V velocitas, P tempus periodicum, et R radius; erit $C = \frac{V^2}{R}$. Attamen notandum eſt, cum fingatur eſſe $C = \frac{V^2}{R}$, intelligi quatuor quantitates proportionales; vel vim in unâ orbitâ eſſe ad vim in quâvis aliâ in harum quantitatum ratione, ſcilicet eſſe $C : c :: \frac{V^2}{R} : \frac{v^2}{r}$; nam quoniam quantitatum rationes omnes gradus variationis admittunt, earum exponentes methodo æquationum comparare licet, et exinde novæ rationes breviter eruentur.

[s] 23. Tempus periodicum eſt ut peripheria circuli, vel ut radius directè, et ut velocitas inversè; unde $PP = \frac{RR}{VV}$, $\frac{1}{P^2} = \frac{V^2}{R^2}$, et $\frac{R}{P^2} = \frac{V^2}{R} = C$.

[t] 24. Sit P data quantitas, quoniam $P = \frac{R}{V}$, data erit $\frac{R}{V}$, et proinde $V = R$, $V^2 = R^2$, et $\frac{V^2}{R} = R = C$. Vel ſi P^2 ſit data, erit $\frac{R}{P^2} = R = C$ ut priùs.

Contra ſit $C = R$, erit $\frac{R}{P^2} = R$; unde data eſt P^2.

Sectio Secunda.

ſubduplicata radiorum; æquales erunt vires centripetæ inter ſe: et contra [v]

Corol. 5. Si tempora periodica ſint ut radii, et propterea velocitates æquales; vires centripetæ erunt reciproce ut radii: et contra [u].

Corol. 6. Si tempora periodica ſint in ratione ſeſquiplicata radiorum, et propterea velocitates reciproce in radiorum ratione ſubduplicata; vires centripetæ erunt reciproce ut quadrata radiorum: et contra [x].

Corol. 7. Et univerſaliter, ſi tempus periodicum ſit ut radii R poteſtas quælibet R^n, et propterea velocitas reciproce ut radii poteſtas R^{n-1}; erit vis centripeta reciproce ut radii poteſtas R^{2n-1}: et contra [y].

Corol. 8. Eadem omnia de temporibus, velocitatibus, et viribus, quibus corpora ſimiles figurarum quarumcunque ſimilium, centraque

[v] 25. Sit P vel $\frac{R}{V} = \sqrt{R}$, erit $V = \sqrt{R}$, et $\frac{V^2}{R} = \frac{R}{R} = 1 = C$, quæ proinde eſt data quantitas. Vel ſi ſit $P = \sqrt{R}$, erit $\frac{R}{P^2} = \frac{R}{R} = 1 = C$, ut priùs. Contra ſit C vel $\frac{R}{P^2}$ data quantitas, erit $P^2 = R$, et $P = \sqrt{R}$.

[u] 26. Sit P vel $\frac{R}{V} = R$, adeoque V data, erit $\frac{V^2}{R} = \frac{1}{R} = C$. Vel ſi ſit $P = R$, erit $\frac{R}{P^2} = \frac{R}{R^2} = \frac{1}{R} = C$, ut priùs. Contra, ſit C vel $\frac{R}{P^2} = \frac{1}{R}$ erit $P = R$.

[x] 27. Sit P^2 vel $\frac{R^2}{V^2} = R^3$, adeoque $V^2 = \frac{1}{R}$, erit $\frac{V^2}{R} = \frac{1}{R^2} = C$. Vel ſi ſit $P^2 = R^3$, erit $\frac{R}{P^2} = \frac{R}{R^3} = \frac{1}{R^2} = C$, ut priùs. Contra, ſit C vel $\frac{R}{P^2} = \frac{1}{R^2}$, erit $P^2 = R^3$.

[y] 28. Sit P vel $\frac{R}{V} = R^n$, adeoque $\frac{1}{V} = R^{n-1}$, et $V = \frac{1}{R^{n-1}}$, erit $V^2 = \frac{1}{R^{2n-2}}$, et $\frac{V^2}{R} = \frac{1}{R^{2n-1}} = C$. Vel ſi ſit $P = R^n$, erit $P^2 = R^{2n}$, et $\frac{R}{P^2} = \frac{R}{R^{2n}} = \frac{1}{R^{2n-1}} = C$, ut priùs. Contra, ſit C vel $\frac{R}{P^2} = \frac{1}{R^{2n-1}}$, erit $\frac{1}{P^2} = \frac{1}{R^{2n}}$, et $P = R^n$.

que in figuris illis ſimiliter poſita habentium, partes deſcribunt, conſequuntur ex demonſtratione præcedentium ad hoſce caſus applicata. Applicatur autem ſubſtituendo æquabilem arearum deſcriptionem pro æquabili motu, et diſtantias corporum a centris pro radiis uſurpando [z].

Corol. 9. Ex eadem demonſtratione conſequitur etiam; quod arcus, quem corpus in circulo data vi centripeta uniformiter revolvendo tempore quovis deſcribit, medius eſt proportionalis inter diametrum

[z] 29. Lem. Chordæ curvaturæ figurarum omnium ſimilium, ſimiliter poſitæ, ſunt proportionales lineis quibuſcunque homologis in his figuris. Dem. Sint AB, ab ſimiles et quàm minimæ partes figurarum curvilinearum; et ſint AV, av chordæ curvaturæ ſimiliter inclinatæ tangentibus AD, ad, et ducantur BD, bd, parallelæ chordis AV, av: per naturam ſimilium figurarum erit $BD : DA :: bd : da$; eſt autem (16) $BD : DA :: DA : AV$, et $bd : da :: da : av$; ergo $DA : AV :: da : av$. Tab. III. Fig. 27.

30. Deſcribant jam corpora duo ſimiles orbitas AB, ab viribus centripetis ad centra S, s ſimiliter poſita tendentibus, vel ita ut angulus BAS ſit æqualis angulo bas, et SA ſit ad sa, ut lineæ quævis homologæ in figuris ſimilibus; et erit (per lem.) $SA : sa :: AV : av$; vires autem centripetæ in locis A, a ſunt ut ſagittæ BD, bd arcuum ſimul deſcriptorum, hoc eſt ut $\frac{BA^2}{AV}$ ad $\frac{ba^2}{av}$, vel ut $\frac{BA^2}{AS}$ ad $\frac{ba^2}{as}$.

31. Vires centripetæ in his locis ſunt etiam ut quadrata velocitatum directè, et ut diſtantiæ inversè: velocitates enim ſunt ut arcus quam minimi ſimul deſcripti.

32. Vires centripetæ ſunt etiam ut diſtantiæ directè, et quadrata temporum periodicorum inversè. Sint enim AB, ab arcus quàm minimi ſimileſque diverſis temporibus T, t deſcripti; et quoniam ſimiles ſimilium arearum partes SAB, sab ſint ad areas totas in eâdem ratione, erunt tempora T, t ut tempora tota periodica P, p. Sint V, v velocitates in arcubus quàm minimis AB, ab; et quoniam velocitates ſunt ut ſpatia illa directè, et ut tempora inversè, erit $V^2 : v^2 :: \frac{AB^2}{T^2} : \frac{ab^2}{t^2} :: \frac{AS^2}{T^2} : \frac{as^2}{t^2}$; unde eſt $\frac{V^2}{AS} : \frac{v^2}{as}$ (hoc eſt vis in loco A ad vim in loco a) $:: \frac{AS}{T^2} : \frac{as}{t^2}$ hoc eſt $:: \frac{AS}{P^2} : \frac{as}{p^2}$. Ex jam demonſtratis deducuntur cætera corollaria in ſimilibus orbitis eodem modo ac in circulis.

SECTIO SECUNDA.

diametrum circuli, et deſcenſum corporis eadem data vi eodemque tempore cadendo confectum [a].

PRO-

TAB. III. FIG. 28.

[a] 33. * Datâ vi centripetâ, deſcenſus S erit ut quadratum temporis T, hoc eſt, ob uniformem corporis motum, ut quadratum arcûs AB, vel ut $\frac{AB^2}{AE}$; unde ſi in caſu aliquo particulari, conſtiterit longitudines S et $\frac{AB^2}{AE}$ æquales eſſe, ſemper æquales erunt. Tangat recta AD circulum in A, agaturque ſubtenſa BD diametro AE parallela, et ſi arcus AB ponatur indefinitè parvus, erit ſubtenſa $BD = \frac{AB^2}{AE}$. Sed in hoc caſu eſt etiam BD æqualis ſpatio S: nam tempore quàm minimo t conſiderari poteſt vis centripeta tanquam agens ſecundùm rectas diametro AE parallelas: quare in illo caſu, ubi arcus AB infinitè parvus eſt, longitudines S et $\frac{AB^2}{AE}$ æquales ſunt; ergo æquales erunt univerſaliter.

34. Velocitas quâ circulus deſcribitur æqualis eſt velocitati quam corpus acquireret cadendo per dimidium radium, ſi modo vi centripetâ conſtanti urgeretur æquali vi in circulo: ſit enim AL ſpatium per quod corpus cadere debet ut acquirat velocitatem in circulo, ſit AF arcus eodem tempore deſcriptus cum hâc velocitate, et erit $AF = 2AL$, ſed $AF^2 = AL \times AE = 4AL^2$, et proinde $AE = 4AL$, et $AL = \frac{AE}{4}$.

PROBLEMA

35. * Referat S ſpatium à gravi è quiete demiſſo, tempore unius minuti ſecundi deſcriptum, D diametrum terræ, et ſeponatur omnis ex aëre reſiſtentia; quæritur quantâ cum velocitate projectile aliquod ex editiore in terræ ſuperficie loco, et ſecundùm rectam horizonti parallelam emittendum ſit, ut fiat planeta ſecundarius.

Pone factum, et arcus ſingulis minutis ſecundis deſcriptus, medius erit proportionalis inter diametrum D et ſpatium S. Innoteſcunt et D et S ex notis terræ magnitudine, et longitudine penduli ad minuta ſecunda oſcillantis. Emittatur itaque projectile tantâ cum velocitate, quantâ ſufficiat ad longitudinem $\sqrt{DS}$ ſpatio unius minuti ſecundi uniformiter percurrendam, et ſolvetur problema.

36. *Cor.* Si deſideretur tempus periodicum, dicendum eſt, ut $\sqrt{DS}$ ad totum terræ ambitum, ita tempus unius minuti ſecundi, ad tempus quæſitum.

37. *Schol.* Ambitus telluris eſt 123249600 pedum Pariſienſium; unde diameter ejus D eſt eorundem pedum ferè 39231600; ſed et ſpatium S ad eandem menſuram exactum, eſt $15\frac{1}{4}$ pedum; ergo prodit tandem $\sqrt{DS}$ pedum Gallicorum

pag. 38

TAB. III




Fig. 20




Fig. 21.




Fig. 22.




Fig. 23




Fig. 24.




Fig. 25.




Fig. 27.




Fig. 26

Fig. 28.

Sectio Secunda.

PROPOSITIO V. THEOREMA V.

Si corpus in ſpatio non reſiſtente circa centrum immobile in orbe quocunque revolvatur, et arcum quemvis jamjam naſcentem tempore quam minimo deſcribat, et ſagitta arcus duci intelligatur, quæ chordam biſecet, et producta tranſeat per centrum virium: erit vis centripeta in medio arcus, ut ſagitta directe et tempus bis inverſe. [b]

Nam ſagitta dato tempore eſt ut vis (per corol. 4. prop. I.) et augendo tempus in ratione quavis, ob auctum arcum in eadem ratione ſagitta augetur in ratione illa duplicata (per corol. 2 et 3, lem. xi.) ideoque eſt ut vis ſemel et tempus bis. Subducatur duplicata ratio temporis utrinque, et fiet vis ut ſagitta directe et tempus bis inverſe. Q.E.D.

Idem facile demonſtratur etiam per corol. 4. lem. x.

Tab. IV. Fig. 30.

Corol. 1. Si corpus *P* revolvendo circa centrum *S* deſcribat lineam curvam *APQ*; tangat vero recta *ZPR* curvam illam in puncto

licorum 24326, Anglicorum 25982, hoc eſt, milliarium Anglicorum 4,92083. Tanta itaque debet eſſe velocitas projectilis, quanta ſufficiat ad ſpatium 5 ferè milliarium tempore minuti unius ſecundi uniformiter percurrendum; unde tempus periodicum projectilis erit unius horæ, 24 minutorum primorum, 27 ſecundorum. Ex his autem manifeſtum eſt quòd ſi terra noſtra revolutiones ſingulas circa proprium axem ſpatio unius horæ, 24 minutorum primorum, 27 ſecundorum perageret, partes omnes juxta æquatorem ſitæ gravitatem ſuam omnino amitterent. Quòd ſi terra incitatiore adhuc provolveretur motu, aër omnis et aqua et partes omnes juxta æquatorem, terræ non adhærentes, in ſpatia circumjacentia penitus avolarent, et ibi orbitas ellipticas umbilicos alteros in centro telluris habentes, motu ſuo deſcriberent, ut in ſequentibus luculentiùs conſtabit.

[b] 38. Deſcribantur arcus Qq, Kk in eodem tempore t viribus diverſis c, C; et erit $PC : PR :: c : C$ [per cor. 4. prop. 1]. Deſcribantur arcus Kk, Mm iiſdem viribus in temporibus diverſis t, T, et erit $PR : PL :: Kk^2 : Mm^2 :: t^2 : T^2$, ob æquabilem motum per arcus evaneſcentes Kk, Mm; his rationibus compoſitis, fiet $PC : PL :: c \times t^2 : C \times T^2$, *i.e.* ſagittæ ſunt ut vires et quadrata temporum. Eadem valet demonſtratio ſi ſumantur ſagittæ PC, PL in orbitis diverſis.

Tab. IV. Fig. 29.

Sectio Secunda.

puncto quovis P, et ad tangentem ab alio quovis curvæ puncto Q agatur QR distantiæ SP parallela, ac demittatur QT perpendicularis ad distantiam illam SP: vis centripeta erit reciproce ut solidum $\frac{SP\ quad. \times QT\ quad.}{QR}$; si modo solidi illius ea semper sumatur quantitas, quæ ultimo fit, ubi coeunt puncta P et Q [c]. Nam QR æqualis est sagittæ dupli arcus QP, in cujus medio est P, et duplum trianguli SQP sive $SP \times QT$, tempori, quo arcus iste duplus describitur, proportionale est; ideoque pro temporis exponente scribi potest.

Corol. 2. Eodem argumento vis centripeta est reciproce ut solidum $\frac{SY q \times QP q}{QR}$, si modo SY perpendiculum sit a centro virium in orbis tangentem PR demissum. Nam rectangula $SY \times QP$ et $SP \times QT$ æquantur.

Corol. 3. Si orbis vel circulus est, vel circulum concentrice tangit, aut concentrice secat, id est, angulum contactus aut sectionis cum circulo quam minimum continet, eandem habens curvaturam eundemque radium curvaturæ ad punctum P; et si PV chorda sit circuli hujus a corpore per centrum virium acta: erit vis centripeta reciproce ut solidum $SY q \times PV$. Nam PV est $\frac{QP q}{QR}$. [d]

Corol. 4.

[c] 39. Sumatur linea, quæ tertia proportionalis est lineis QR, QT, patet $\frac{QT^2}{QR}$ huic lineæ æqualem esse; ideoque quantitatem $\frac{SP^2 \times QT^2}{QR}$ esse solidum: neque evanescentibus QT, QR solidum hoc evanescit; nam linea, quæ ipsis QR, QT evanescentibus tertia est proportionalis, finita est; ideoque solidum quod conficitur ex hâc lineâ in SP^2 ductâ est etiam finita quantitas.

Tab. IV. Fig. 31.

[d] 40. Ex naturâ circuli patet triangula QRP, QPV similia esse; ideoque $QR : QP :: QP : PV = \frac{QP^2}{QR}$.

41. Hinc etiam patet solidum $\frac{SP^2 \times QT^2}{QR}$ coëuntibus punctis P, Q esse finitum, quoniam æquale est areæ finitæ SY^2 ductæ in lineam finitam PV.

Corol. 4. Iiſdem poſitis, eſt vis centripeta ut velocitas bis directe, et chorda illa inverſe. Nam velocitas eſt reciproce ut perpendiculum SY per corol. 1. prop. 1. [c].

Corol. 5. Hinc ſi detur figura quævis curvilinea APQ, et in ea detur etiam punctum S, ad quod vis centripeta perpetuo dirigitur, inveniri poteſt lex vis centripetæ, qua corpus quodvis P a curſu rectilineo perpetuo retractum in figuræ illius perimetro detinebitur, eamque revolvendo deſcribet. Nimirum computandum eſt vel ſolidum $\frac{SPq \times QTq}{QR}$, vel ſolidum $SYq \times PV$ huic vi reciproce

[c] 42. Notatu dignum eſt formulas vis centripetæ à Newtono inventas in corollariis 1. 2. 3. non applicari poſſe ad inveniendas vires centripetas in orbitis diverſis, ni areæ, in æqualibus temporibus deſcriptæ, æquales ponantur in hiſce orbitis; ſubſtituuntur enim areæ pro temporibus: et proinde hoc corollarium, quatenus à Newtono demonſtratur, non applicari poteſt in comparandis inter ſe viribus centripetis in orbitis diverſis; ponuntur enim areæ temporibus proportionales, et velocitates reciprocè ut perpendicula: attamen ex principiis generalibus ſequenti methodo deduci poteſt. Vis centripeta eſt ſemper ut ſagitta directè, et tempus bis inverſè, vel ut $\frac{QR}{T^2}$; T eſt ut ſpatium PQ directè et velocitas V inverſè, ergo eſt T^2 ut $\frac{QP^2}{V^2}$, et $\frac{QR}{T^2}$ ut $\frac{QR \times V^2}{QP^2}$ (ſubſtituendo $\frac{QP^2}{PV}$ pro QR) $= \frac{QP^2 \times V^2}{PV \times QP^2} = \frac{V^2}{PV}$.

43. Theorema. Velocitas quâ curva quælibet PQ deſcribitur, æqualis eſt velocitati, quam acquireret corpus cadendo per quartam partem chordæ curvaturæ PV per centrum virium S tranſeuntis, ſi modo vi centripetâ conſtanti continuò urgeretur æquali illi quâ corpus in puncto P agitatur. Dem. Velocitas, quam corpus hâc vi uniformiter acceleratum per ſpatium RQ cadendo acquireret, eſt ad velocitatem quâcum arcus PQ deſcribitur ut $2RQ$ ad PQ; ſit PL ſpatium per quod corpus cadere debet, ut velocitatem quâcum PQ deſcribitur, acquirat; et erit RQ ad PL ut quadratum velocitatis in Q acquiſitæ, ad quadratum velocitatis quâcum deſcribitur PQ, vel ut $4RQ^2$ ad PQ^2, et proinde $PL = \frac{PQ^2 \times RQ}{4RQ^2} = \frac{PQ^2}{4RQ} = \frac{PV}{4}$. Tab. IV. Fig. 32.

44. * Ex corollario tertio ſequitur vim centripetam eſſe reciprocè, ut ſolidum $\frac{SY^3 \times R}{SP}$, poſito quòd R ſit æqualis PC radio curvaturæ. Nam ob ſimilia triangula VPF, SPY, eſt $SP : SY :: PF$ vel $2R : PV = \frac{SY \times 2R}{SP}$, et proinde $SY^2 \times PV = \frac{SY^3 \times 2R}{SP}$, hoc eſt ob datum 2, ut $\frac{SY^3 \times R}{SP}$. Tab. IV. Fig. 31.

Sectio Secunda.

proce proportionale. Ejus rei dabimus exempla in problematis ſequentibus.

PROPOSITIO VI. PROBLEMA I.

Gyretur corpus in circumferentia circuli, requiritur lex vis centripetæ tendentis ad punctum quodcunque datum.

Tab. IV. Fig. 33.

Eſto circuli circumferentia $VQPA$; punctum datum, ad quod vis ceu ad centrum ſuum tendit, S; corpus in circumferentia latum P; locus proximus, in quem movebitur Q; et circuli tangens ad locum priorem PRZ. Per punctum S ducatur chorda PV; et acta circuli diametro VA, jungatur AP; et ad SP demittatur perpendiculum QT, quod productum occurrat tangenti PR in Z; ac denique per punctum Q agatur LR, quæ ipſi SP parallela ſit, et occurrat tum circulo in L, tum tangenti PZ in R. Et ob ſimilia triangula ZQR, ZTP, VPA; erit RP *quad.* hoc eſt QRL ad QT *quad.* ut AV *quad.* ad PV *quad.* Ideoque $\frac{QRL \times PV\ quad.}{AV\ quad.}$ æquatur QT *quad.* Ducantur hæc æqualia in $\frac{SP\ quad.}{QR}$, et punctis P & Q coeuntibus ſcribatur PV pro RL. Sic fiet $\frac{SP\ quad. \times PV\ cub.}{AV\ quad.}$ æquale $\frac{SP\ quad. \times QT\ quad}{QR}$. Ergo (per corol. 1. et 5. prop. v.) vis centripeta eſt reciproce ut $\frac{SPq \times PV\ cub.}{AV\ quad.}$; id eſt (ob datum AV *quad.*) reciproce ut quadratum diſtantiæ ſeu altitudinis SP et cubus chordæ PV conjunctim. Q. E. I. [f]

Idem aliter.

Ad tangentem PR productam demittatur perpendiculum SY: et ob ſimilia triangula SYP, VPA; erit AV ad PV ut SP ad SY:

[f] 45. Si virium centrum extra peripheriam circuli locetur, et duci intelligantur lineæ à centro illo circulum tangentes, corpus in concavâ orbitæ parte verſatum urgebitur vi centripetâ ad centrum illud tendente: urgebitur vero vi repulſivâ dum motus peragat in orbitæ partibus quarum convexitas virium centro obvertitur. Attamen notandum eſt, quamquam ex formulis prædictis lex vis centripetæ vel repulſivæ recte exponatur, corpus vi centripetâ in circuli circumferentia latum, ſi unquam ad contactûs puncta pervenerit, non amplius in circulo

SY: ideoque $\frac{SP \times PV}{AV}$ æquale SY, et $\frac{SP\ quad. \times PV\ cub.}{AV\ quad.}$ æquale $SY\ quad. \times PV$. Et propterea (per. corol. 3. et 5. prop. v.) vis centripeta eſt reciproce ut $\frac{SP q \times PV\ cub.}{AV q}$, hoc eſt, ob datum AV reciproce ut $SP q \times PV\ cub.$ Q. E. I.

Corol. 1. Hinc ſi punctum datum S, ad quod vis centripeta ſemper tendit, locetur in circumferentia hujus circuli, puta ad V; erit vis centripeta reciproce ut quadrato-cubus altitudinis SP.

Corol. 2. Vis, qua corpus P in circulo $APTV$ circum virium centrum S revolvitur, eſt ad vim, qua corpus idem P in eodem circulo et eodem tempore periodico circum aliud quodvis virium centrum R revolvi poteſt, ut $RP\ quad. \times SP$ ad cubum rectæ SG, quæ a primo virium centro S ad orbis tangentem PG ducitur, et diſtantiæ corporis à ſecundo virium centro parallela eſt. Nam per conſtructionem hujus propoſitionis vis prior eſt ad vim poſteriorem ut $RP q \times PT\ cub.$ ad $SP q \times PV\ cub.$ id eſt, ut $SP \times RP q$ ad $\frac{SP\ cub. \times PV\ cub.}{PT\ cub.}$ [g], ſive (ob ſimilia triangula PSG, TPV) ad $SG\ cub.$

Tab. IV. Fig. 34.

Corol. 3. Vis, qua corpus P in orbe quocunque circum virium centrum S revolvitur, eſt ad vim, qua corpus idem P in eodem orbe eodemque tempore periodico circum aliud quodvis virium centrum R revolvi poteſt, ut $SP \times RPq$, contentum utique ſub diſtantia corporis a primo virium centro S et quadrato diſtantiæ ejus a ſecundo virium centro R, ad cubum rectæ SG, quæ a primo virium centro S ad orbis tangentem PG ducitur, et corporis a ſecundo virium centro diſtantiæ RP parallela eſt. Nam vires in hoc orbe ad ejus punctum quodvis P eædem ſunt ac in circulo ejuſdem curvaturæ. PRO-

culo poſſe moveri, etiamſi vis centripeta in repulſivam verti fingatur: accedet enim ad centrum, vel recedet in infinitum, ut perpendentibus luculenter conſtabit.

[g] 46. Quoniam datur tempus periodicum, daturque area tota per hypotheſin, areæ in æqualibus temporibus deſcriptæ neceſſariò æquales erunt; ſunt enim univerſaliter ut areæ totæ directè, et ut tempora periodica inverſè;

SECTIO SECUNDA.

PROPOSITIO VII. PROBLEMA II.

Moveatur corpus in ſemicirculo PQA: *ad hunc effectum requiritur lex vis centripetæ tendentis ad punctum adeo longinquum* S, *ut lineæ omnes* PS, RS *ad id ductæ, pro parallelis haberi poſſint.*

TAB. IV. FIG. 35.

A ſemicirculi centro *C* agatur ſemidiameter *CA* parallelas iſtas perpendiculariter ſecans in *M* et *N*, et jungatur *CP*. Ob ſimilia triangula *CPM*, *PZT* et *RZQ* eſt *CPq* ad *PMq* ut *PRq* ad *QTq*, et ex natura circuli *PRq* æquale eſt rectangulo $QR \times \overline{RN + QN}$, ſive coeuntibus punctis *P* et Q rectangulo $QR \times 2\,PM$. Ergo eſt *CPq* ad *PM quad.* ut $QR \times 2\,PM$ ad *QT quad.* ideoque $\frac{QT\ quad.}{QR}$ æquale $\frac{2\,PM\ cub.}{CP\ quad.}$, et $\frac{QT\ quad. \times SP\ quad.}{QR}$ æquale $\frac{2\,PM\ cub. \times SP\ quad.}{CP\ quad.}$. Eſt ergo (per corol. 1. et 5. prop. v.) vis centripeta reciproce ut $\frac{2\,PM\ cub. \times SP\ quad.}{CP\ quad.}$, hoc eſt, (neglecta ratione determinata $\frac{2\,SP\ quad.}{CP\ quad.}$) reciproce ut *PM cub.* Q.E.I.

Idem facile colligitur etiam ex propoſitione præcedente.

Scholium.

[h] Et argumento haud multum diſſimili corpus invenietur moveri in ellipſi, vel etiam in hyperbola vel parabola, vi centripeta, quæ ſit

quare vires centripetæ ſunt reciprocè ut quadrata diſtantiarum, et cubi chordarum conjunctim; ideoque vis prior ad vim poſteriorem, &c. (42).

TAB. IV. FIG. 37.

[h] 47. LEM. Si à conicæ ſectionis puncto *P* ducatur tangenti perpendicularis *PA* axi occurrens in *A*, diameter curvaturæ *PO* per PA^3 diviſa eadem manet tangentis poſitione utcunque mutatâ. DEM. Nam ſit *CD* diameter conjugata ipſi *CP*, quæ producta occurrat *PO* in *F*; et erit in ellipſi et hyperbolâ $PA \times PF$ data quantitas [Hamilton, Con. Sec. Lib. II. Prop. xxii.] et proinde *PA* ut $\frac{1}{PF^2}$; eſt etiam *CD* ut $\frac{1}{PF}$ [Ham. L. IV. P. I.], et proinde eſt *PA* ut *CD*, PA^2 ut CD^2, et $\frac{PA^2}{PF}$ vel ei proportionale PA^3 ut $\frac{CD^2}{PF} = \frac{PO}{2}$

[Ham.

fit reciproce ut cubus ordinatim applicatæ ad centrum virium maxime longinquum tendentis.

PROPOSITIO VIII. PROBLEMA III.

Gyretur corpus in ſpirali PQS *ſecante radios omnes* SP, SQ, *&c.* [i] *in angulo dato; requiritur lex vis centripetæ tendentis ad centrum ſpiralis.*

Tab. IV. Fig. 40.

Detur [Ham. L. v. P. xviii. Cor.]; et exinde ſequitur, eſſe PA^3 ut PO, et $\frac{PO}{PA^3}$ datam quantitatem.

In ellipſi creſcente focorum diſtantiâ manet PA^3 ut PO; et proinde ſi hæc diſtantia infinita evadat, vel mutetur ellipſis in parabolam, erit etiamnum PA^3 ut PO.

48. Sit jam BPZ ſectio quævis conica, cujus axis eſt BA, et vis centripeta ad punctum adeo longinquum tendat, ut lineæ omnes PS, RS, pro parallelis haberi poſſint, ſintque ad axem perpendiculares. Sit PA perpendicularis tangenti PT, et ad axem producta; PO diameter circuli curvaturæ, et PV chorda ejus per centrum virium tranſeuns: ob ſimilia triangula eſt $QT^2 : QP^2 :: PM^2 : PA^2$, ergo $QT^2 = \frac{QP^2 \times PM^2}{PA^2}$, et $\frac{QT^2}{QR} = \frac{QP^2 \times PM^2}{QR \times PA^2} = PV \times \frac{PM^2}{PA^2}$: ſed eſt $PA : PM :: PO : PV = \frac{PO \times PM}{PA}$, quo ſubſtituto fit $\frac{PM^3 \times PO}{PA^3} = \frac{QT^2}{QR}$, quod ob datum SP^2 eſt reciprocè ut vis; eſt autem $\frac{PO}{PA^3}$ data quantitas per Lem. ideoque manet vis ut $\frac{1}{PM^3}$.

Tab. IV. Fig. 36.

[i] 49. Revolvatur radius SL circa centrum S motu uniformi, dum punctum P à centro illo recedit velocitate quæ ſemper proportionalis eſt diſtantiæ: Curva, à puncto P deſcripta, ſecat omnes radios in angulo dato. Nam ſint radii ST, SR, SP, &c. viciniſſimi, et ad æquales ab invicem diſtantias; patet hoſce radios eſſe in progreſſione geometricâ; eſt enim $qR : aT :: SP : SR$: ſed $qR : aT :: qR + SP : aT + SR :: SR : ST$; ergo eſt $SP : SR :: SR : ST$; ſunt autem anguli PSR, RST æquales per hyp. et proinde triangula PSR, RST ſimilia ſunt, et angulus SRP æqualis angulo STR.

Tab. IV. Fig. 38. et 39.

50. Si deſcribatur circulus circa centrum S radio ST, arcus circuli rationes radiorum ſpiralis menſurabunt: ſint enim arcus quilibet TL, LO, OW, &c. inter ſe æquales, et ducantur SL, SO, SW, &c. quoniam ST, SR, SP, &c. ſunt in ratione geometricâ, ratio ST ad SP eſt duplicata ipſius ST ad SR; ſed eſt etiam TO duplus ipſius TL: ſimiliter, ratio ST ad SM eſt triplicata ipſius ST ad SR, et eſt etiam TW triplus ipſius TL, et ſic deinceps; hinc curva hæc ſpiralis logarithmica nominatur.

51. Si

SECTIO SECUNDA.

TAB. IV. FIG. 40.

Detur angulus indefinite parvus $PS\mathcal{Q}$, et ob datos omnes angulos dabitur ſpecie figura $SPR\mathcal{Q}\mathcal{T}$. Ergo datur ratio $\frac{\mathcal{Q}\mathcal{T}}{\mathcal{Q}R}$, eſtque $\frac{\mathcal{Q}\mathcal{T}\ quad.}{\mathcal{Q}R}$ ut $\mathcal{Q}\mathcal{T}$, hoc eſt (ob datam ſpecie figuram illam) ut SP.

[k] Mutetur jam utcunque angulus $PS\mathcal{Q}$, et recta $\mathcal{Q}R$ angulum contactus $\mathcal{Q}PR$ ſubtendens mutabitur (per lemma xi.) in duplicata ratione ipſius PR vel $\mathcal{Q}\mathcal{T}$. Ergo manebit $\frac{\mathcal{Q}\mathcal{T}\ quad.}{\mathcal{Q}R}$ eadem quæ prius, hoc eſt ut SP. Quare $\frac{\mathcal{Q}\mathcal{T}q \times SPq}{\mathcal{Q}R}$ eſt ut SP *cub.* ideoque (per corol. 1. et 5. prop. v.) vis centripeta eſt reciproce ut cubus diſtantiæ SP. Q.E.I.

Idem aliter.

[l] Perpendiculum $S\Upsilon$ in tangentem demiſſum, et circuli ſpiralem concentrice ſecantis chorda PV ſunt ad altitudinem SP in datis rationibus; ideoque SP *cub.* eſt ut $S\Upsilon q \times PV$, hoc eſt (per corol. 3. et 5. prop. v.) reciproce ut vis centripeta.

PRO-

[k] 51. Si angulus $PS\mathcal{Q}$ angulo pSq non ſit æqualis, fiat angulus $PSL = pSq$, eritque $qt : qr :: LM : LN$, et $\frac{qt}{qr} = \frac{LM}{LN}$, et $\frac{qt^2}{qr} : \frac{LM^2}{LN} :: qt : LM :: Sp : SP$; ſed ob ſimilia triangula $LM^2 : \mathcal{Q}\mathcal{T}^2 :: LP^2 : \mathcal{Q}P^2 :: LN : \mathcal{Q}R$, ideoque $\frac{LM^2}{LN} = \frac{\mathcal{Q}\mathcal{T}^2}{\mathcal{Q}R}$, et proinde $\frac{qt^2}{qr} : \frac{\mathcal{Q}\mathcal{T}^2}{\mathcal{Q}R} :: Sp : SP$.

[l] 52. LEM. Chorda curvaturæ PV per centrum S ſpiralis logarithmicæ tranſeuntis æqualis eſt $2\,SP$. Sint enim puncta P, $\mathcal{Q}$ ad invicem viciniſſima; lineæ Pr, $\mathcal{Q}$r perpendiculares ad curvam in his punctis occurrent in centro curvaturæ r: à rectis angulis r$P\mathcal{Q}$, r$\mathcal{Q}L$, ſubducantur anguli æquales $SP\mathcal{Q}$, $S\mathcal{Q}L$, et erit angulus rPC æqualis angulo $C\mathcal{Q}S$, æquantur vero anguli verticales ad C, ergo eſt angulus $\mathcal{Q}SP = \mathcal{Q}rP$; angulus $\mathcal{Q}$rP ad centrum circuli æqualis eſt duplo angulo $\mathcal{Q}VP$ ad peripheriam, et proinde eſt $PV : PS :: 2 : 1$.

53. Subſtituendo $2\,SP$ pro PV, et SP pro $S\Upsilon$, fit ſolidum $S\Upsilon^2 \times PV$ proportionale $2\,SP^3$, et proinde eſt vis centripeta ut $\frac{1}{SP^3}$.

TAB. IV




Fig. 29.




Fig. 30.




Fig. 31.




Fig. 32




Fig. 33.




Fig. 34.




Fig. 35




Fig. 36.




Fig. 37.




Fig. 38




Fig. 39.




Fig. 40.

PROPOSITIO IX. PROBLEMA IV.

Gyretur corpus in ellipſi: requiritur lex vis centripetæ tendentis ad centrum ellipſeos.

Sunto CA, CB ſemiaxes ellipſeos; GP, DK diametri aliæ conjugatæ; PF, $\mathcal{Q}T$ perpendicula ad diametros; $\mathcal{Q}v$ ordinatim applicata ad diametrum GP; et ſi compleatur parallelogrammum $\mathcal{Q}v\,PR$, erit (ex conicis)† rectangulum $Pv\,G$ ad $\mathcal{Q}v$ *quad.* ut PC *quad.* ad CD *quad.* et (ob ſimilia triangula $\mathcal{Q}vT$, PCF) $\mathcal{Q}v$ *quad.* eſt ad $\mathcal{Q}T$ *quad.* ut PC *quad.* ad PF *quad.* et conjunctis rationibus, rectangulum $Pv\,G$ ad $\mathcal{Q}T$ *quad.* ut PC *quad.* ad CD *quad.* et PC *quad.* ad PF *quad.* id eſt, $v\,G$ ad $\frac{\mathcal{Q}T\ quad.}{Pv}$ ut PC *quad.* ad $\frac{CDq \times PFq}{PCq}$. Tab. V. Fig. 41.

Scribe $\mathcal{Q}R$ pro Pv, et $BC \times CA$ pro $CD \times PF$‡, nec non (punctis P et $\mathcal{Q}$ coëuntibus) $2\,PC$ pro $v\,G$, et ductis extremis et mediis in ſe mutuo fiet $\frac{\mathcal{Q}T\ quad. \times PCq}{\mathcal{Q}R}$ æquale $\frac{2\,BCq \times CAq}{PC}$. Eſt ergo (per corol. 5. prop. v.) vis centripeta reciproce ut $\frac{2\,BCq \times CAq}{PC}$; id eſt (ob datum $2\,BCq \times CAq$) reciproce ut $\frac{1}{PC}$; hoc eſt, directe ut diſtantia PC. Q.E.I.

Idem aliter.

[m] In recta PG ab altera parte puncti T ſumatur punctum u ut Tu ſit æqualis ipſi Tv; deinde cape uV, quæ ſit ad $v\,G$ ut eſt DC *quad.*

54. Velocitas in ſpirali logarithmicâ æqualis eſt velocitati, quâcum corpus eâdem vi centripeta ad eandem diſtantiam circulum deſcriberet. Patet enim diametrum hujuſce circuli æqualem eſſe chordæ PV [per lem.]; unde velocitates in his orbitis æquales ſunt (43).

[m] 55. Aliter. Ex conicis, $Pv \times v\,G : \mathcal{Q}v^2 :: PC^2 : CD^2$, unde ductis extremis et mediis in ſe mutuo, et ſubſtitutis $\mathcal{Q}R$ pro Pv, et $2\,PC$ pro $v\,G$, fit $\mathcal{Q}R$

† Ham. Con. Sec. L. I. P. xxxi. Cor. 1. ‡ Ham. L. IV. P. 1.

SECTIO SECUNDA.

quad. ad PC *quad.* Et quoniam ex conicis eſt Qv *quad.* ad PvG ut DC *quad.* ad PC *quad.* erit Qv *quad.* æquale $Pv \times uV$. Adde rectangulum uPv utrinque, et prodibit quadratum chordæ arcus PQ æquale rectangulo VPv; ideoque circulus, qui tangit ſectionem conicam in P et tranſit per punctum Q, tranſibit etiam per punctum V. Coëant puncta P et Q, et ratio uV ad vG, quæ eadem eſt cum ratione DCq ad PCq, fiet ratio PV ad PG ſeu PV ad $2PC$; ideoque PV æqualis erit $\frac{2DCq}{PC}$. Proinde vis, qua corpus P in ellipſi revolvitur, erit reciproce ut $\frac{2DCq}{PC}$ in PFq (per corol. 3. prop. V.) hoc eſt (ob datum $2DCq$ in PFq) directe ut PC. Q.E.I.

Corol. 1.

$QR \times 2PC \times CD^2 = Qv^2 \times PC^2$, ceu $\frac{2CD^2}{PC} = \frac{Qv^2}{QR} = PV$; quare $PV \times PF^2 = \frac{2CD^2 \times PF^2}{PC}$, et ob datum $2CD^2 \times PF^2$, eſt vis centripeta inverſe ut $\frac{1}{PC}$, ceu ut PC directe.

56. LEM. Cum diameter curvaturæ PO ſit ad chordam PV ut PC ad PF, erit $PO = \frac{PV \times PC}{PF}$, ſed $PV = \frac{2CD^2}{PC}$, ergo $PO = \frac{2CD^2}{PF}$, et conſequenter radius circuli $Pr = \frac{CD^2}{PF}$.

57. Hinc Prob. IV. aliter ſolvitur, nam in formulâ $\frac{CP}{Pr \times PF^3}$, ſubſtituatur $\frac{CD^2}{PF}$ pro Pr, et fit vis centripeta ut $\frac{CP \times PF}{CD^2 \times PF^3} = \frac{CP}{CD^2 \times PF^2}$, hoc eſt, ob conſtantem $CD^2 \times PF^2$ directe ut CP.

58. COR. Velocitas in ellipſi eſt ad velocitatem in circulo ad eandem diſtantiam, ut ſemidiameter conjugata CD ad diſtantiam CP. Eſt enim velocitas prior ad poſteriorem, in ratione ſubduplicatâ chordæ curvaturæ PV ad diametrum circuli $2CP$ (43), hoc eſt, ut $\sqrt{\frac{2CD^2}{PC}} : \sqrt{2PC} :: \sqrt{2CD^2} : \sqrt{2PC^2} :: CD : PC$.

TAB. V. FIG. 42.

59. Cor. 2. Hinc velocitas in ellipſi æqualis eſt velocitati in circulo in quatuor illis locis, in quibus diametri conjugatæ æquales ſunt. Æquales vero diametri conjugatæ ſequenti methodo inveniuntur: ſint Aa, Bb axes, ducantur

[n] *Corol.* 1. Eſt igitur vis ut diſtantia corporis a centro ellipſeos : et viciſſim, ſi vis ſit ut diſtantia, movebitur corpus in ellipſi centrum habente in centro virium, aut forte in circulo, in quem utique ellipſis migrare poteſt.

[o] *Corol.* 2. Et æqualia erunt revolutionum in ellipſibus univerſis circum centrum idem factarum periodica tempora. Nam tempora illa in ellipſibus ſimilibus æqualia ſunt (per corol. 3. et 8. prop. iv.) in ellipſibus autem communem habentibus axem majorem ſunt ad

tur BA, Ba, et patet ex conicis lineam CP, quæ biſecat BA in O, æqualem eſſe lineæ CD, quæ biſecat Ba in n: patet præterea BA et ab, Ba et Ab eſſe inter ſe parallelas, ideoque CP, CD eſſe diametros conjugatas.

60. Quoniam velocitas in ellipſi eſt ad velocitatem in circulo ad eandem diſtantiam, ut ſemidiameter conjugata ad diſtantiam, et velocitas in hoc circulo ad velocitatem in quâvis aliâ ellipſi ad eandem diſtantiam, ut diſtantia illa ad conjugatam diametrum in ellipſi poſteriori, erunt velocitates in his ellipſibus, datâ diſtantiâ, ut ſemidiametri conjugatæ.

[n] 61. Projiciatur corpus à puncto P datâ cum velocitate, ſecundùm datam directionem PY, et ſit vis centripeta in directâ ſimplici ratione diſtantiæ à centro C; ſi PY ſit ad PC perpendicularis, et velocitas projectionis æqualis velocitati quam corpus P acquireret cadendo per $\frac{1}{2}PC$, vi in P perpetuò agente, orbita erit circulus cujus centrum eſt C. Si vero alia ſit velocitas, vel ſi PY non ſit ad PC perpendicularis, ob datas vim atque velocitatem in puncto P datur chorda curvaturæ PV; inveniatur media proportionalis inter CP et $\frac{PV}{2}$, et huic æquales ponatur CD parallela ipſi PY, et diametris conjugatis CD, CP deſcribatur ellipſis : patet per Prop. x. hanc ellipſin deſcribi poſſe, cum vi quæ eſt ut diſtantia : patet præterea velocitatem, lineam directionis, ac vim in hâc ellipſi, eaſdem eſſe ac in orbitâ quam P deſcribit; quare corpus P neceſſariò moveri incipiet, eodem modo ac corpus revera in ellipſi movetur: proximum igitur punctum eſt punctum in ellipſi, et velocitas, linea directionis, et vis, eædem ſunt in hoc puncto ac in ellipſi, corpora igitur eodem modo pergent moveri in proximo arcu, et ſic deinceps. Tab. V. Fig. 43.

[o] 62. *Aliter*. Tempus periodicum eſt ut area tota, vel ut rectangulum ſub axibus directe, et ut area dato tempore deſcripta inversè, *i. e.* ut $\frac{CD \times PF}{QP \times PF} = \frac{CD}{QP}$; ſed eſt $\frac{QP^2}{QR} = PV = \frac{2CD^2}{CP}$; ergo eſt $QP^2 = \frac{2CD^2 \times QR}{CP}$; QR, vel vis centripeta eſt per hypotheſin ut CP, quare QP^2 eſt ut CD^2, QP ut CD, et $\frac{CD}{QP}$ data quantitas. Tab. V. Fig. 41.

SECTIO SECUNDA.

ad invicem ut ellipſion areæ totæ directe, et arearum particulæ ſimul deſcriptæ inverſe; id eſt, ut axes minores directe, et corporum velocitates in verticibus principalibus inverſe; hoc eſt, ut axes illi minores directe, et ordinatim applicatæ ad idem punctum axis communis inverſe; et propterea (ob æqualitatem rationum directarum et inverſarum) in ratione æqualitatis.

Scholium.

Si ellipſis centro in infinitum abeunte vertatur in parabolam, corpus movebitur in hac parabola; et vis ad centrum infinite diſtans jam tendens evadet æquabilis. Hoc eſt theorema *Galilæi*. Et ſi coni ſectio parabolica (inclinatione plani ad conum ſectum mutata) vertatur in hyperbolam, movebitur corpus in hujus perimetro vi attractiva in repulſivam verſa. [P] Et quemadmodum in circulo

TAB. V. FIG. 44.

[P] 63. *Sunto AP, Ap duæ lineæ curvæ communem habentes verticem A, abſciſſamque communem AQ; ea vero ſit harum curvarum indoles, ut actâ communi ordinatâ QpP, ordinata QP ſit ſemper ad ordinatam Qp in datâ ratione. Revolvantur jam in his figuris duo corpora P et p vi centripetâ tendente ad punctum quodvis S in abſciſsâ communi AQ eâve productâ conſtitutum; ſintque corporum P, p tempora periodica æqualia: dico, vim centripetam in loco P fore ad vim centripetam in loco p, ut diſtantia SP ad diſtantiam Sp. Primò enim cùm tempora periodica æquentur, areæ ſimul deſcriptæ erunt ut areæ totæ harum figurarum, hoc eſt, in ratione QP ad Qp. Jam vero figura mixtilinea APQ erit ad figuram mixtilineam ApQ, ut QP ad Qp; et triangulum SPQ erit ad triangulum SpQ etiam in ratione QP ad Qp; ergo, componendo, erit area mixtilinea ASP ad aream ASp ut QP ad Qp: quare, quo tempore radius SP percurrit aream ASP, radius Sp percurret aream ASp; adeoque ſi corpora P et p ſimul exeant de loco A, ſimul pervenient ad ordinatam communem QpP. Quare motus corporum P et p ſecundùm rectas ipſi AS parallelas agentes, æquales erunt. Porro cum QP ſemper ſit ad Qp in datâ ratione, motus et motuum mutationes, et vires mutantes ſecundùm rectas ipſi QP parallelas agentes, ſemper erunt in datâ ratione QP ad Qp. Referat jam SP vim centripetam corporis P in loco quovis P, et reſolvi poteſt vis SP in vires QP, QS; ergo vis centripeta corporis p exprimi debet per rectam Sp; quare vis centripeta in loco P eſt ad vim centripetam in loco p, ut diſtantia SP ad diſtantiam Sp. Q.E.D.

Servatis ordinatarum QP, Qp longitudinibus, mutetur jam angulus SQp ne ordinatæ QP, Qp amplius jaceant in eâdem rectâ; et applicari poteſt præcedens demonſtratio ad hunc caſum, ſimiliter atque ad priorem; hoc eſt, corpora

circulo vel ellipſi ſi vires tendunt ad centrum figuræ in abſciſſa poſitum; hæ vires augendo vel diminuendo ordinatas in ratione quacunque data, vel etiam mutando angulum inclinationis ordinatarum ad abſciſſam, ſemper augentur vel diminuuntur in ratione diſtantiarum a centro, ſi modo tempora periodica maneant æqualia; ſic etiam in figuris univerſis ſi ordinatæ augeantur vel diminuantur in ratione quacunque data, vel angulus ordinationis utcunque mutetur, manente tempore periodico; vires ad centrum quodcunque in abſciſſa poſitum tendentes in ſingulis ordinatis augentur vel diminuuntur in ratione diſtantiarum a centro.

PROPOSITIO X. THEOREMA VI.

Poſito quod vis centripeta proportionalis ſit altitudini ſeu diſtantiæ locorum a centro, dico quod cadentium tempora, velocitates et ſpatia deſcripta ſunt arcubus, arcuumque ſinibus rectis et ſinibus verſis reſpective proportionales [q].

Corol. 1.

corpora P et p ſimul pervenient ad ordinatas QP, Qp, et vis centripeta in loco P erit ad vim centripetam in loco p adhuc ut diſtantia SP ad diſtantiam Sp. Q. E. D.

[q] 64. Si corpus non cadat perpendiculariter, deſcribet ellipſin [Cor. i. p. ix.] centrum habentem in centro virium. Sit ARP ellipſis illa, et centrum ejus S: ſuper hujus ſemiaxe majori AS deſcribatur quadrans circuli ADE, et per corpus decidens tranſeat recta CPD ad AS perpendicularis, actiſque DS, PS, erit area ASD areæ ASP, ideoque etiam tempori proportionalis. Manente ſemiaxe AS minuatur perpetuò latitudo ellipſeos, et ſemper manebit area ASD tempori proportionalis: minuatur latitudo illa in infinitum, et orbe ARP jam coincidente cum AS, deſcendet corpus in rectâ AS, et area ACD, ceu arcus AD evadet tempori proportionalis. Ducatur jam cd parallela et quàm proxima ipſi CD, et velocitas quâ deſcribitur lineola Cc erit ut ſpatium directè et tempus inverſè, vel ut $\frac{Cc}{Dd}$, *i. e.* ut $\frac{Dr}{Dd}$, actâ Dr parallelâ Cc, vel, ob ſimilia triangula, ut $\frac{CD}{SD}$, et ob datum SD ut ſinus rectus CD. Patet vero corpus deſcribere ſinum verſum AC. Tab. V. Fig. 45.

SECTIO SECUNDA.

Corol. 1. Hinc æqualia ſunt tempora, quibus corpus unum de loco *A* cadendo pervenit ad centrum *S*, et corpus aliud revolvendo deſcribit arcum quadrantalem *ADE*.

Corol. 2. Proinde æqualia ſunt tempora omnia quibus corpora de locis quibuſvis ad uſque centrum cadunt. Nam revolventium tempora omnia periodica (per corol. 3. prop. IV.) æquantur [r].

PROPOSITIO XI. PROBLEMA V.

Poſita cujuſcunque generis vi centripeta, et conceſſis figurarum curvilinearum quadraturis, requiritur corporis recta aſcendentis vel deſcendentis tum velocitas in locis ſingulis, tum tempus quo corpus ad locum quemvis perveniet : Et contra.

TAB. V. FIG. 46.

De loco quovis *A* in recta *ADEC* cadat corpus *E*, deque loco ejus *E* erigatur ſemper perpendicularis *EG*, vi centripetæ in loco illo ad centrum *C* tendenti proportionalis : Sitque *BFG* linea curva quam punctum *G* perpetuo tangit. Coincidat autem *EG* ipſo motus initio cum perpendiculari *AB*, et erit corporis velocitas in loco quovis *E* ut recta, quæ poteſt aream curvilineam *ABGE*. Q.E.I.

In *EG* capiatur *EM* rectæ, quæ poteſt aream *ABGE*, reciproce proportionalis, et ſit *VLM* linea curva, quam punctum *M* perpetuo tangit, et cujus aſymptotos eſt recta *AB* producta ; et erit tempus, quo corpus cadendo deſcribit lineam *AE*, ut area curvilinea *ABTVME*. Q.E.I.

Etenim in recta *AE* capiatur linea quam minima *DE* datæ longitudinis, ſitque *DLF* locus lineæ *EMG*, ubi corpus verſabatur in *D*; et ſi ea ſit vis centripeta, ut recta, quæ poteſt aream *ABGE*, ſit ut deſcendentis velocitas, erit area ipſa in duplicata ratione velocitatis, id eſt, ſi pro velocitatibus in *D* et *E*, ſcribantur V et V + I,

[r] 65. Si linea *AS* in ſemicycloidem vulgarem permutetur, manente longitudine, et lege vis centripetæ, patet tempora et velocitates eodem modo repreſentari poſſe ſive corpus in curvâ cycloidali, ſive in lineâ rectâ deſcendat ; et proinde tempora omnia, quibus corpora à locis quibuſvis ad punctum infimum deſcendunt, eſſe æqualia : vires enim acceleratrices ſunt directè ut diſtantiæ ab hoc puncto.

V + I, erit area $ABFD$ ut VV, et area $ABGE$ ut VV+2VI+II, et diviſim area $DFGE$ ut 2VI+II, ideoque $\frac{DFGE}{DE}$ ut $\frac{2VI+II}{DE}$, id eſt, ſi primæ quantitatum naſcentium rationes ſumantur, longitudo DF ut quantitas $\frac{2VI}{DE}$, ideoque etiam ut quantitatis hujus dimidium $\frac{I \times V}{DE}$. Eſt autem tempus, quo corpus cadendo deſcribit lineolam DE, ut lineola illa directe et velocitas V inverſe, eſtque vis ut velocitatis incrementum I directe et tempus inverſe, ideoque ſi primæ naſcentium rationes ſumantur, ut $\frac{I \times V}{DE}$, hoc eſt ut longitudo DF. Ergo vis ipſi DF vel EG proportionalis facit ut corpus ea cum velocitate deſcendat, quæ ſit ut recta quæ poteſt aream $ABGE$. Q. E. D. [s].

Porro cum tempus, quo quælibet longitudinis datæ lineola DE deſcribatur, ſit ut velocitas inverſe, ideoque inverſe ut linea recta quæ poteſt aream $ABFD$; ſitque DL, atque ideo area naſcens $DLME$, ut eadem linea recta inverſe: erit tempus ut area $DLME$, et ſumma omnium temporum ut ſumma omnium arearum, hoc eſt (per corol. lem. IV.) tempus totum quo linea AE deſcribitur ut area tota $ATVME$. Q. E. D.

Corol. 1. Si P ſit locus, de quo corpus cadere debet, ut urgente aliqua uniformi vi centripeta nota (qualis vulgo ſupponitur gravitas) velocitatum acquirat in loco D æqualem velocitati, quam corpus aliud vi quacunque cadens acquiſivit eodem loco D, et in perpendiculari DF capiatur DR, quæ ſit ad DF ut vis illa uniformis ad vim alteram in loco D, et compleatur rectangulum $PDRQ$, eique

[s] 66. Propoſitionis hujuſce tantummodo converſam Newtonus demonſtrare videtur; ex demonſtratis vero facillimè ipſius propoſitionis veritas deduci poteſt. Probatur nimirum, poſito quòd quadratum velocitatis areæ proportionale ſit, vim ipſam per lineam DF repreſentari; ſi igitur, lineâ DF vim repreſentante, velocitatis quadratum non ſit ut area $ABFD$, repreſentari fingatur quadratum velocitatis per aream $ABKD$ majorem vel minorem areâ $ABFD$, et prodibit ex Newtoni demonſtratis vis ut linea DK, quæ major eſt vel minor lineâ DF, contra hypotheſin. TAB. V. FIG. 47.

Sectio Secunda.

que æqualis abſcindatur area $ABFD$; erit A locus de quo corpus alterum cecidit. Namque completo rectangulo $DRSE$, cum ſit area $ABFD$ ad aream $DFGE$ ut VV ad 2VI, ideoque ut $\frac{1}{2}$ V ad I, id eſt, ut ſemiſſis velocitatis totius ad incrementum velocitatis corporis vi inæquabili cadentis; et ſimiliter area $PQRD$ ad aream $DRSE$ ut ſemiſſis velocitatis totius ad incrementum velocitatis corporis uniformi vi cadentis; ſintque incrementa illa (ob æqualitatem temporum naſcentium) ut vires generatrices, id eſt, ut ordinatim applicatæ DF, DR, ideoque ut areæ naſcentes $DFGE$, $DRSE$; erunt ex æquo areæ totæ $ABFD$, $PQRD$ ad invicem ut ſemiſſes totarum velocitatum, et propterea, ob æqualitatem velocitatum, æquantur.

Corol. 2. Unde ſi corpus quodlibet de loco quocunque D data cum velocitate vel ſurſum vel deorſum projiciatur, et detur lex vis centripetæ, invenietur velocitas ejus in alio quovis loco e, erigendo ordinatam eg, et capiendo velocitatem illam ad velocitatem in loco D ut eſt recta quæ poteſt rectangulum $PQRD$ area curvilinea $DFge$ vel auctum, ſi locus e eſt loco D inferior, vel diminutum, ſi is ſuperior eſt, ad rectam quæ poteſt rectangulum ſolum $PQRD$.

Corol. 3. Tempus quoque innoteſcet erigendo ordinatam em reciproce proportionalem lateri quadrato ex $PQRD +$ vel $- DFge$, et capiendo tempus quo corpus deſcripſit lineam De ad tempus quo corpus alterum vi uniformi cecidit a P, et cadendo pervenit ad D, ut area curvilinea $DLme$ ad rectangulum $2PD \times DL$. Namque tempus quo corpus vi uniformi deſcendens deſcripſit lineam PD eſt ad tempus quo corpus idem deſcripſit lineam PE in ſubduplicata ratione PD ad PE, id eſt (lineola DE jamjam naſcente) in ratione PD ad $PD + \frac{1}{2} DE$ ſeu $2PD$ ad $2PD + DE$, et diviſim, ad tempus quo corpus idem deſcripſit lineolam DE ut $2PD$ ad DE, ideoque ut rectangulum $2PD \times DL$ ad aream $DLME$; eſtque tempus quo corpus utrumque deſcripſit lineolam DE ad tempus quo corpus alterum inæquabili motu deſcripſit lineam De, ut area $DLME$ ad aream $DLme$, et ex æquo tempus primum ad tempus ultimum ut rectangulum $2PD \times DL$ ad aream $DLmc$.

PRO-

PROPOSITIO XII. THEOREMA VII.

Si corpus, cogente vi quacunque centripeta, moveatur utcunque, et corpus aliud recta aſcendat vel deſcendat, ſintque eorum velocitates in aliquo æqualium altitudinum caſu æquales, velocitates eorum in omnibus æqualibus altitudinibus erunt æquales.

Deſcendat corpus aliquod ab A per D, E, ad centrum C, et moveatur corpus aliud a V in linea curva $VIKk$. Centro C intervallis quibuſvis deſcribantur circuli concentrici DI, EK rectæ AC in D et E, curvæque VIK in I et K, occurrentes. Jungatur IC occurrens ipſi KE in N; et in IK demittatur perpendiculum NT; ſitque circumferentiarum circulorum intervallum DE vel IN quam minimum, et habeant corpora in D et I velocitates æquales. Quoniam diſtantiæ CD, CI æquantur, erunt vires centripetæ in D et I æquales. Exponantur hæ vires per æquales lineolas DE, IN; et ſi vis una IN (per legum corol. II.) reſolvatur in duas NT et IT, vis NT, agendo ſecundum lineam NT corporis curſui ITK perpendicularem, nil mutabit velocitatem corporis in curſu illo, ſed retrahet ſolummodo corpus a curſu rectilineo, facietque ipſum de orbis tangente perpetuo deflectere, inque via curvilinea $ITKk$ progredi. In hoc effectu producendo vis illa tota conſumetur: vis autem altera IT, ſecundum corporis curſum agendo, tota accelerabit illud, ac dato tempore quam minimo accelerationem generabit ſibi ipſi proportionalem. Proinde corporum in D et I accelerationes æqualibus temporibus factæ (ſi ſumantur linearum naſcentium DE, IN, IK, IT, NT rationes primæ) ſunt ut lineæ DE, IT: temporibus autem inæqualibus ut lineæ illæ et tempora conjunctim. Tempora autem quibus DE et IK deſcribuntur, ob æqualitatem velocitatum ſunt ut viæ deſcriptæ DE et IK, ideoque accelerationes, in curſu corporum per lineas DE et IK, ſunt ut DE et IT, DE et IK conjunctim, id eſt ut DE *quad.* et $IT \times IK$ *rectangulum*. Sed

Tab. V. Fig. 48.

SECTIO SECUNDA.

rectangulum $IT \times IK$ æquale eſt IN *quadrato*, hoc eſt, æquale DE *quad.* et propterea accelerationes in tranſitu corporum a D et I ad E et K æquales generantur. Æquales igitur ſunt corporum velocitates in E et K: et eodem argumento ſemper reperientur æquales in ſubſequentibus æqualibus diſtantiis. Q. E. D.

Sed et eodem argumento corpora æquivelocia et æqualiter a centro diſtantia, in aſcenſu ad æquales diſtantias æqualiter retardabuntur. Q. E. D.

Corol. 1. Hinc ſi corpus vel oſcilletur pendens a filo, vel impedimento quovis politiſſimo et perfecte lubrico cogatur in linea curva moveri, et corpus aliud recta aſcendat vel deſcendat, ſintque velocitates eorum in eadem quacunque altitudine æquales: erunt velocitates eorum in aliis quibuſcunque æqualibus altitudinibus æquales. Namque corporis penduli filo vel impedimento vaſis abſolute lubrici idem præſtatur quod vi tranſverſa NT. Corpus eo non retardatur, non acceleratur, ſed tantum cogitur de curſu rectilineo diſcedere.

Corol. 2. Hinc etiam ſi quantitas P ſit maxima a centro diſtantia, ad quam corpus vel oſcillans vel in trajectoria quacunque revolvens, deque quovis trajectoriæ puncto, ea quam ibi habet velocitate ſurſum projectum aſcendere poſſit; ſitque quantitas A diſtantia corporis a centro in alio quovis orbitæ puncto, et vis centripeta ſemper ſit ut ipſius A dignitas quælibet A^{n-1}, cujus index $n-1$ eſt numerus quilibet n unitate diminutus; velocitas corporis in omni altitudine A erit ut $\sqrt{P^n - A^n}$, atque ideo datur. Namque velocitas recta aſcendentis ac deſcendentis (per prop. XI.) eſt in hac ipſa ratione.

TAB. V. FIG. 46.

Ex tribus noviſſimis propoſitionibus ſequentia facillime deducuntur.

67. Si cadat corpus à loco A verſus centrum virium C, et vis centripeta ſit conſtans; patet aream $ABGE$ eſſe rectangulum; et quadratum velocitatis ob datam altitudinem ut baſis AE. Exinde ſequitur velocitatem acquiſitam in hoc caſu eſſe in ſubduplicatâ ratione ſpatii deſcripti.

TAB. V. FIG. 49.

68. Si cadat corpus à loco A verſus centrum virium C, et vis centripeta ſit in directâ ſimplici ratione diſtantiæ ab hoc centro, atque erigantur ſemper perpendiculares AB, EG proportionales diſtantiis AC, EC, erunt puncta C, G, B, in eâdem rectâ lineâ: dividatur jam trapezium $ABGE$, in triangula AEB, EBG,

EBG, et erit area ejus ut $AB \times AE + EG \times AE$, ſeu ut $AC \times AE + EC \times AE = \overline{AC + EC} \times AE = ED^2$, ſi ED ſit ſinus rectus circuli, centro C et radio CA deſcripti; eſt igitur velocitas in E acquiſita ut rectus ſinus ED.

69. Hinc patet, quòd ſi corpus vi agitatum quæ variatur in directâ ratione diſtantiæ rectà à peripheriâ circuli ad centrum deſcendat, acquiret illud velocitatem illam quâ in circulo movetur; ſit enim AB vis centripeta in loco A, ſitque AE æqualis dimidio radio circuli AD, et compleatur rectangulum $ABRE$, patet velocitatem in circulo AD eſſe ut radix quadratica areæ $ABRE$ (34): erigantur perpetuò perpendicula EG quæ ſunt ad AB, ut diſtantiæ EC ad AC, et compleatur triangulum ABC; erit area ejus æqualis areæ rectanguli $ABRE$, unde (per cor. 1. prop. XI) C locus eſt ad quem deſcendet corpus, ut acquirat velocitatem æqualem velocitati in circulo.

70. Hinc etiam determinari poteſt altitudo ad quam corpus aſcendet ſi ſurſum projiciatur à loco A eâ cum velocitate quâ circulus deſcribitur, et interea agitetur vi quæ eſt in directâ ratione diſtantiæ à centro: iiſdem enim poſitis, erigatur ſemper perpendicularis ab, quæ ſit ad AB, ut aC ad AC, et compleatur trapezium $abBA$ æquale rectangulo $ABRE$, erit a altitudo ad quam corpus aſcendet (per cor. 1. prop. XI.) eſt autem area trianguli Cab ad aream trianguli CAB ut 2 ad 1 (per Hyp.), et ob ſimilia triangula ut Ca^2 ad CA^2, unde eſt $Ca : CA :: \sqrt{2} : 1$.

71. Ex his datur etiam altitudo ad quam corpus aſcendet, ſi ſurſum projiciatur à puncto quovis in ellipſi eâdem velocitate quâ peripheria ejus vi ad centrum tendente deſcribitur, poſito quòd in aſcenſu ſuo agitetur vi quæ variatur in directâ ratione diſtantiæ. Patet enim (ex prop. XII.) corpus à diverſis orbitæ cujuſvis punctis hoc modo projectum, ad eandem ſemper altitudinem à centro virium aſcendere: determinetur altitudo in caſu illo in quo velocitas æqualis eſt velocitati in circulo ad eandem diſtantiam, et data erit in omni alio. Inveniantur igitur æquales conjugatæ ſemidiametri CD, CK (59), et erit altitudo Cd ad CD ut $\sqrt{2}$ ad 1. (70). Tab. V. Fig. 50.

72. Altitudo Cd, ad quam corpus rectà projectum aſcendit, æqualis eſt lineæ BA quæ jungit vertices axium. Nam (ex conicis) eſt rectangulum $DEG : BE^2 :: DC^2 : CK^2$, ſed $DC^2 = CK^2$, ergo rect. $DEG = BE^2$, ſed rect. $DEG = CD^2 - CE^2$ (per El. II. 5.) ergo $BE^2 = CD^2 - CE^2$, et $CD^2 = BE^2 + CE^2 = 2BE^2$, quare $2CD^2 = 4BE^2 = BA^2$, unde $BA : CD :: \sqrt{2} : 1$, et $BA = Cd$.

73. Ex his ſequitur circulum altitudinis tranſire per puncta interſectionum tangentium illarum quæ per vertices axium ellipſis ducuntur.

Sectio Tertia.

SECTIO III.

De motu corporum in conicis ſectionibus excentricis.

PROOEMIUM.

Qui phyſicam tractandam ſuſceperunt, ad tres fere claſſes revocari poſſunt. Extiterunt enim, qui ſingulis rerum ſpeciebus qualitates ſpecificas et occultas tribuerint; ex quibus deinde corporum ſingulorum operationes, ignota quadam ratione, pendere voluerunt. In hoc poſita eſt ſumma doctrinæ ſcholaſticæ, ab *Ariſtotele* et Peripateticis derivatæ: Affirmant utique ſingulos effectus ex corporum ſingularibus naturis oriri; at unde ſint illæ naturæ non docent; nihil itaque docent. Cumque toti ſint in rerum nominibus, non in ipſis rebus; ſermonem quendam philoſophicum cenſendi ſunt adinveniſſe, philoſophiam tradidiſſe non ſunt cenſendi.

Alii ergo melioris diligentiæ laudem conſequi ſperarunt rejecta vocabulorum inutili farragine. Statuerunt itaque materiam univerſam homogeneam eſſe, omnem vero formarum varietatem, quæ in corporibus cernitur, ex particularum componentium ſimpliciſſimis quibuſdam et intellectu facillimis affectionibus oriri. Et recte quidem progreſſio inſtituitur a ſimplicioribus ad magis compoſita, ſi particularum primariis illis affectionibus non alios tribuunt modos, quam quos ipſa tribuit natura. Verum ubi licentiam ſibi aſſumunt, ponendi quaſcunque libet ignotas partium figuras et magnitudines, incertoſque ſitus et motus; quin et fingendi fluida quædam occulta, quæ corporum poros liberrime permeent, omnipotente prædita ſubtilitate, motibuſque occultis agitata; jam ad ſomnia delabuntur, neglecta rerum conſtitutione vera: quæ ſane fruſtra petenda eſt ex fallacibus conjecturis, cum vix etiam per certiſſimas obſervationes inveſtigari poſſit. Qui ſpeculationum ſuarum fundamentum deſumunt ab hypotheſibus; etiamſi deinde ſecundum leges mechanicas accuratiſſime

TAB. V




Fig. 41.




Fig. 42.




Fig. 43.




Fig. 44.




Fig. 46.




Fig. 47.




Fig. 45.



Fig. 48.




Fig. 49.




Fig. 50.

ratiſſime procedant; fabulam quidem elegantem ſorte et venuſtam, fabulam tamen concinnare dicendi ſunt.

Relinquitur adeo tertium genus, qui philoſophiam ſcilicet experimentalem profitentur. Hi quidem ex ſimpliciſſimis quibus poſſunt principiis rerum omnium cauſas derivandas eſſe volunt: nihil autem principii loco aſſumunt, quod nondum ex phænomenis comprobatum fuerit. Hypotheſes non comminiſcuntur, neque in phyſicam recipiunt, niſi ut quæſtiones de quarum veritate diſputetur. Duplici itaque methodo incedunt, analytica et ſynthetica. Naturæ vires legeſque virium ſimpliciores ex ſelectis quibuſdam phænomenis per analyſin deducunt, ex quibus deinde per ſyntheſin reliquorum conſtitutionem tradunt. Hæc illa eſt philoſophandi ratio longe optima, quam præ cæteris merito amplectendum cenſuit celeberrimus auctor noſter. Hanc ſolam utique dignam judicavit in qua excolenda atque adornanda operam ſuam collocaret. Hujus igitur illuſtriſſimum dedit exemplum, mundani nempe ſyſtematis explicationem e theoria gravitatis feliciſſime deductam. Gravitatis virtutem univerſis corporibus ineſſe, ſuſpicati ſunt vel finxerunt alii: primus ille et ſolus ex apparentiis demonſtrare potuit, et ſpeculationibus egregiis firmiſſimum ponere fundamentum.

Ut argumenti ſumatur exordium a ſimpliciſſimis et proximis; diſpiciamus pauliſper qualis ſit in terreſtribus natura gravitatis, ut deinde tutius progrediamur ubi ad corpora cæleſtia, longiſſime a ſedibus noſtris remota, perventum fuerit. Convenit jam inter omnes philoſophos, corpora univerſa circumterreſtria gravitare in terram. Nulla dari corpora vere levia, jamdudum confirmavit experientia multiplex. Quæ dicitur levitas relativa, non eſt vera levitas, ſed apparens ſolummodo; et oritur a præpollente gravitate corporum contiguorum.

Porro, ut corpora univerſa gravitent in terram, ita terra viciſſim in corpora æqualiter gravitat; gravitatis enim actionem eſſe mutuam et utrinque æqualem, ſic oſtenditur. Diſtinguatur terræ totius moles in binas quaſcunque partes vel æquales vel utcunque inæquales: jam ſi pondera partium non eſſent in ſe mutuo æqualia;

SECTIO TERTIA.

cederet pondus minus majori, et partes conjunctæ pergerent recta moveri ad infinitum, verſus plagam in quam tendit pondus majus: omnino contra experientiam. Itaque dicendum erit, pondera partium in æquilibrio eſſe conſtituta: hoc eſt, gravitatis actionem eſſe mutuam et utrinque æqualem.

Pondera corporum, æqualiter a centro terræ diſtantium, ſunt ut quantitates materiæ in corporibus. Hoc utique colligitur ex æquali acceleratione corporum omnium, e quiete per ponderum vires cadentium: nam vires quibus inæqualia corpora æqualiter accelerantur, debent eſſe proportionales quantitatibus materiæ movendæ. Jam vero corpora univerſa cadentia æqualiter accelerari, ex eo patet, quod in vacuo *Boyliano* temporibus æqualibus æqualia ſpatia cadendo deſcribunt, ſublata ſcilicet aëris reſiſtentia: accuratius autem comprobatur per experimenta pendulorum.

Vires attractivæ corporum, in æqualibus diſtantiis, ſunt ut quantitates materiæ in corporibus. Nam cum corpora in terram et terra viciſſim in corpora momentis æqualibus gravitent; terræ pondus in unumquodque corpus, ſeu vis qua corpus terram attrahit, æquabitur ponderi corporis ejuſdem in terram. Hoc autem pondus erat ut quantitas materiæ in corpore: itaque vis qua corpus unumquodque terram attrahit, ſive corporis vis abſoluta, erit ut eadem quantitas materiæ.

Oritur ergo et componitur vis attractiva corporum integrorum ex viribus attractivis partium: ſiquidem aucta vel diminuta mole materiæ, oſtenſum eſt, proportionaliter augeri vel diminui ejus virtutem. Actio itaque telluris ex conjunctis partium actionibus conflari cenſenda erit; atque adeo corpora omnia terreſtria ſe mutuo trahere oportet viribus abſolutis, quæ ſint in ratione materiæ trahentis. Hæc eſt natura gravitatis apud terram: videamus jam qualis ſit in cælis.

Corpus omne perſeverare in ſtatu ſuo vel quieſcendi vel movendi uniformiter in directum, niſi quatenus a viribus impreſſis cogitur ſtatum illum mutare; naturæ lex eſt ab omnibus recepta philoſophis. Inde vero ſequitur, corpora quæ in curvis moventur, atque

adeo

adeo de lineis rectis orbitas ſuas tangentibus jugiter abeunt, vi aliqua perpetuo agente retineri in itinere curvilineo. Planetis igitur in orbibus curvis revolventibus neceſſario aderit vis aliqua, per cujus actiones repetitas indefinenter a tangentibus deflectantur.

Jam illud concedi æquum eſt, quod mathematicis rationibus colligitur et certiſſime demonſtratur; corpora nempe omnia, quæ moventur in linea aliqua curva in plano deſcripta, quæque radio ducto ad punctum vel quieſcens vel utcunque motum deſcribunt areas circa punctum illud temporibus proportionales, urgeri a viribus quæ ad idem punctum tendent. Cum igitur in confeſſo ſit apud aſtronomos, planetas primarios circum ſolem, ſecundarios vero circum ſuos primarios, areas deſcribere temporibus proportionales; conſequens eſt ut vis illa, qua perpetuo detorquentur a tangentibus rectilineis et in orbitis curvilineis revolvi coguntur, verſus corpora dirigatur quæ ſita ſunt in orbitarum centris. Hæc itaque vis non inepte vocari poteſt, reſpectu quidem corporis revolventis, centripeta; reſpectu autem corporis centralis, attractiva; a quacunque demum cauſa oriri fingatur.

Quin et hæc quoque concedenda ſunt, et mathematice demonſtrantur: Si corpora plura motu æquabili revolvantur in circulis concentricis, et quadrata temporum periodicorum ſint ut cubi diſtantiarum a centro communi; vires centripetas revolventium fore reciproce ut quadrata diſtantiarum *.

Similiter ſi corpora plura in ellipſibus diverſis circa centrum virium commune revolvantur et quadrata temporum periodicorum ſint ut cubi mediocrium à centro virium diſtantiarum, in hac ſectione geometrice demonſtratur vires centripetas tendentes ad hoc centrum

* Phænomenon 1. *Planetarum quinque primariorum, et vel ſolis circa terram vel terræ circa ſolem tempora periodica, ſtellis fixis quieſcentibus, eſſe in ratione ſeſquiplicatâ mediocrium diſtantiarum à ſole.*

Hæc à Keplero inventa ratio in confeſſo eſt apud omnes. Eadem utique ſunt tempora periodica, eædemque orbium dimenſiones, ſive ſol circa terram ſive terra circa ſolem revolvatur, ac de menſurâ quidem temporum periodicorum convenit inter aſtronomos univerſos, magnitudines autem orbium Keplerus et Bullialdus omnium diligentiſſime ex obſervationibus determinarunt: et diſtantiæ

Sectio Tertia.

centrum in communi omnium ellipſium foco locatum, eſſe reciproce in duplicata ratione diſtantiarum. Hoc autem nunc pro conceſſo habeatur.

Ex

diſtantiæ mediocres quæ temporibus periodicis reſpondent, non differunt ſenſibiliter à diſtantiis quas illi invenerunt, ſuntque inter ipſas ut plurimum intermediæ; uti in tabulâ ſequente videre licet.

Planetarum ac telluris tempora periodica circa ſolem reſpectu fixarum, in diebus et partibus decimalibus diei.

☽	♃	♂	♁	♀	☿
10759,275.	4332,514.	686,9785.	365,2565.	224,6176.	87,9692.

Planetarum ac telluris diſtantiæ mediocres à ſole.

	☽	♃	♂	♁	♀	☿
Secund. Kep.	951000.	519650.	152350.	100000.	72400.	38806.
Secund. Bull.	954198.	522520.	152350.	100000.	72398.	38585.
Sec. temp. per.	954006.	520096.	152369.	100000.	72333.	38710.

De diſtantiis Mercurii et Veneris à ſole diſputandi non eſt locus, cum hæ per eorum elongationes à ſole determinentur.

De diſtantiis etiam ſuperiorum planetarum à ſole tollitur omnis diſputatio per eclipſes ſatellitum Jovis. Etenim per eclipſes illas determinatur poſitio umbræ quam Jupiter projicit, et eo nomine habetur Jovis longitudo heliocentrica. Ex longitudinibus autem heliocentricâ et geocentricâ inter ſe collatis determinatur diſtantia Jovis.

Phæn. 2. *Tempora periodica Planetarum circumjovialium, ſtellis fixis quieſcentibus, eſſe in ratione ſeſquiplicatâ diſtantiarum ab ipſius centro.*

Orbes horum Planetarum non differunt ſenſibiliter à circulis Jovi concentricis. Eorum vero tempora periodica eſſe in ſeſquiplicatâ ratione ſemidiametrorum orbium conſentiunt aſtronomi; idem etiam ex tabulâ ſequente manifeſtum eſt.

Satellitum Jovialium tempora periodica

$1^d.18^h.27'.34''$. $3^d.13^h.13'.42''$. $7^d.3^h.42'.36''$. $16^d.16^h.32'.9''$.

Diſtantiæ Satellitum à centro Jovis.

Ex obſervationibus	1	2	3	4	
Borelli	$5\frac{2}{3}$	$8\frac{2}{3}$	14	$24\frac{2}{3}$	Semidiam. Jovis.
Townlei per microm.	5,52	8,78	13,47	24,72	
Caſſini per teleſcop.	5	8	13	23	
Caſſini per eclip. ſatell.	$5\frac{2}{3}$	9	$14\frac{23}{60}$	$25\frac{3}{10}$	
Ex tem p. Period.	5,667	9,017	14,384	25,299	

Phæn. 3.

Ex iis quæ hactenus dicta ſunt, conſtat planetas in orbitis ſuis retineri per vim aliquam in ipſos perpetuo agentem: conſtat vim illam dirigi ſemper verſus orbitarum centra: conſtat hujus efficaciam augeri in acceſſu ad centrum, diminui in receſſu ab eodem: et augeri quidem in eadem proportione qua diminuitur quadratum diſtantiæ, diminui eadem proportione qua diſtantiæ quadratum augetur. Videamus jam, comparatione inſtituta inter planetarum vires centripetas et vim gravitatis, annon ejuſdem forte ſint generis. Ejuſdem vero generis erunt, ſi deprehendantur hinc et inde leges eædem, eædemque affectiones. Primo itaque lunæ, quæ nobis proxima eſt, vim centripetam expendamus.

Spatia rectilinea, quæ a corporibus e quiete demiſſis dato tempore ſub ipſo motus initio deſcribuntur, ubi a viribus quibuſcunque urgentur, proportionalia ſunt ipſis viribus: hoc utique conſequitur ex ratiociniis mathematicis. Erit igitur vis centripeta lunæ in orbita ſua revolventis, ad vim gravitatis in ſuperficie terræ, ut ſpatium quod tempore quam minimo deſcriberet luna deſcendendo per vim centripetam verſus terram, ſi circulari omni motu privari fingeretur, ad ſpatium quod eodem tempore quam minimo deſcribit grave corpus in vicinia terræ, per vim gravitatis ſuæ cadendo. Horum ſpatiorum prius æquale eſt arcus a luna per idem tempus deſcripti ſinui verſo, quippe qui lunæ tranſlationem de tangente, factam a vi centripeta, metitur; atque adeo computari poteſt ex datis tum lunæ tempore periodico, tum diſtantia ejus a centro terræ. Spatium poſterius invenitur per experimenta pendulorum, quemadmodum docuit

Phæn. 3. *Tempora periodica Planetarum circumſaturniorum, ſtellis fixis quieſcentibus, eſſe in ratione ſeſquiplicatâ diſtantiarum ab ipſius centro.*

Caſſinus utique ex obſervationibus ſuis diſtantias eorum à centro Saturni et periodica tempora hujuſmodi eſſe ſtatuit.

Satellitum Saturniorum tempora periodica.

$1^d.21^h.18'.27''$. $2^d.17^h.41'.22''$. $4^d.12^h.25'.12''$. $15^d.22^h.41'.14''$. $79^d.7^h.48'.00''$.

Diſtantiæ Satellitum à centro Saturni in ſemidiametris annuli.

Ex obſerv.	$1\frac{12}{25}$	$2\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	8.	24.
Ex temp. per.	1,93.	2,47.	3,45.	8.	23,35.

SECTIO TERTIA.

docuit *Hugenius*. Inito itaque calculo†, ſpatium prius ad ſpatium poſterius, ſeu vis centripeta lunæ in orbita ſua revolventis ad vim gravitatis in ſuperficie terræ, erit ut quadratum ſemidiametri terræ, ad orbitæ ſemidiametri quadratum. Eandem habet rationem, per ea quæ ſuperius oſtenduntur, vis centripeta lunæ in orbita ſua revolventis ad vim lunæ centripetam prope terræ ſuperficiem. Vis itaque centripeta prope terræ ſuperficiem æqualis eſt vi gravitatis. Non ergo diverſæ ſunt vires, ſed una atque eadem: ſi enim diverſæ eſſent, corpora viribus conjunctis duplo celerius in terram caderent quam ex vi ſola gravitatis. Conſtat igitur vim illam centripetam, qua luna perpetuo de tangente vel trahitur vel impellitur et in orbita retinetur, ipſam eſſe vim gravitatis terreſtris ad lunam uſque pertingentem. Et rationi quidem conſentaneum eſt ut ad ingentes diſtantias illa ſeſe virtus extendat, cum nullam ejus ſenſibilem imminutionem, vel in altiſſimis montium cacuminibus, obſervare licet. Gravitat itaque luna in terram: quin et actione mutua, terra viciſſim in lunam æqualiter gravitat: id quod abunde quidem confirmatur in hac philoſophia, ubi agitur de maris æſtu et æquinoctiorum præceſſione, ab actione tum lunæ tum ſolis in terram oriundis. Hinc et illud tandem edocemur, qua nimirum lege vis gravitatis decreſcat in majoribus a tellure

† Colligitur hoc ex calculo per corollarium nonum propoſitionis quartæ confecto. Nam arcus illius, quem luna tempore unius minuti primi, medio ſuo motu, ad diſtantiam ſexaginta ſemidiametrorum terreſtrium deſcribat, ſinus verſus eſt pedum Pariſienſium $15\frac{1}{12}$ circiter, vel magis accuratè pedum 15. dig. 1. et lin. $1\frac{4}{9}$. Unde cum vis illa accedendo ad terram augeatur in duplicatâ diſtantiæ ratione inversâ, ideoque ad ſuperficiem terræ major ſit partibus 60×60 quam ad lunam; corpus, vi illa in regionibus noſtris cadendo, deſcribere deberet ſpatio minuti unius primi pedes Pariſienſes $60 \times 60 \times 15\frac{1}{12}$, et ſpatio minuti unius ſecundi pedes $15\frac{1}{12}$, vel magis accuratè pedes 15. dig. 1. et lin. $1\frac{4}{9}$. Et eâdem vi gravia reverâ deſcendunt in terram. Nam penduli, in latitudine Lutetiæ Pariſiorum ad ſingula minuta ſecunda oſcillantis longitudo eſt pedum trium Pariſienſium et linearum $8\frac{1}{2}$, ut obſervavit Hugenius. Et altitudo, quam grave tempore minuti unius ſecundi cadendo deſcribit, eſt ad dimidiam longitudinem penduli hujus in duplicatâ ratione circumferentiæ circuli ad diametrum ejus (ut indicavit etiam Hugenius): ideoque eſt pedum Pariſienſium 15. dig. 1. lin. $1\frac{7}{9}$: et propterea vis quâ luna in orbe ſuo retinetur, ſi deſcendatur in ſuperficiem terræ, æqualis evadit vi gravitatis apud nos, ideoque eſt illa ipſa vis quam nos gravitatem dicere ſolemus.

lure diſtantiis. Nam cum gravitas non diverſa ſit a vi centripeta lunari, hæc vero ſit reciproce proportionalis quadrato diſtantiæ; diminuetur et gravitas in eadem ratione.

Progrediamur jam ad planetas reliquos. Quoniam revolutiones primariorum circa ſolem et ſecundariorum circa Jovem et Saturnum ſunt phænomena generis ejuſdem ac revolutio lunæ circa terram, quoniam porro demonſtratum eſt vires centripetas primariorum dirigi verſus centrum ſolis, ſecundariorum verſus centra Jovis et Saturni, quemadmodum lunæ vis centripeta verſus terræ centrum dirigitur; adhæc, quoniam omnes illæ vires ſunt reciproce ut quadrata diſtantiarum a centris, quemadmodum vis lunæ eſt ut quadratum diſtantiæ a terra: concludendum erit eandem eſſe naturam univerſis. Itaque ut luna gravitat in terram, et terra viciſſim in lunam, ſic etiam gravitabunt omnes ſecundarii in primarios ſuos et primarii viciſſim in ſecundarios; ſic et omnes primarii in ſolem, et ſol viciſſim in primarios.

Igitur ſol in planetas univerſos gravitat et univerſi in ſolem. Nam ſecundarii dum primarios ſuos comitantur, revolvuntur interea circum ſolem una cum primariis. Eodem itaque argumento, utriuſque generis planetæ gravitant in ſolem, et ſol in ipſos.

Solis virtutem attractivam quoquoverſum propagari ad ingentes uſque diſtantias, et ſeſe diffundere ad ſingulas circumjecti ſpatii partes, apertiſſime colligi poteſt ex motu cometarum; qui ab immenſis intervallis profecti feruntur in viciniam ſolis, et nonnunquam adeo ad ipſum proxime accedunt, ut globum ejus, in periheliis ſuis verſantes, tantum non contingere videantur. Horum theoriam ab aſtronomis antehac fruſtra quæſitam, noſtro tandem ſeculo feliciter inventam et per obſervationes certiſſime demonſtratam, præſtantiſſimo noſtro auctori debemus. Patet igitur cometas in ſectionibus conicis umbilicos in centro ſolis habentibus moveri, et radiis ad ſolem ductis areas temporibus proportionales deſcribere. Ex hiſce vero phænomenis manifeſtum eſt et mathematice comprobatur, vires illas, quibus cometæ retinentur in orbitis ſuis, reſpicere ſolem et eſſe reciproce ut quadrata diſtantiarum ab ipſius centro. Gravitant itaque cometæ in ſolem: atque adeo ſolis vis attractiva non tantum ad corpora planetarum in da-

SECTIO TERTIA.

tis diſtantiis et in eodem fere plano collocata, ſed etiam ad cometas in diverſiſſimis cælorum regionibus et in diverſiſſimis diſtantiis poſitos pertingit.

Concluſiones præcedentes huic innituntur axiomati, quod a nullis non recipitur philoſophis; effectuum ſcilicet ejuſdem generis, quorum nempe quæ cognoſcuntur proprietates eædem ſunt, eaſdem eſſe cauſas et eaſdem eſſe proprietates quæ nondum cognoſcuntur. Quis enim dubitat, ſi gravitas ſit cauſa deſcenſus lapidis in *Europa*, quin eadem ſit cauſa deſcenſus in *America?* Si gravitas mutua fuerit inter lapidem et terram in *Europa*; quis negabit mutuam eſſe in *America?* Si vis attractiva lapidis et terræ componatur, in *Europa*, ex viribus attractivis partium; quis negabit ſimilem eſſe compoſitionem in *America?* Si attractio terræ ad omnia corporum genera et ad omnes diſtantias propagetur in *Europa*; quidni pariter propagari dicamus in *America?* In hac regula fundatur omnis philoſophia: quippe qua ſublata nihil affirmare poſſimus de univerſis. Conſtitutio rerum ſingularum innoteſcit per obſervationes et experimenta: inde vero non niſi per hanc regulam de rerum univerſarum naturâ judicamus.

Jam cum gravia ſint omnia corpora, quæ apud terram vel in cœlis reperiuntur, de quibus experimenta vel obſervationes inſtituere licet; omninò dicendum erit, gravitatem corporibus univerſis competere. Et quemadmodum nulla concipi debent corpora, quæ non ſint extenſa, mobilia et impenetrabilia; ita nulla concipi debere, quæ non ſint gravia. Corporum extenſio, mobilitas, et impenetrabilitas non niſi per experimenta, innoteſcunt; eodem plane modo gravitas innoteſcit. Corpora omnia de quibus obſervationes habemus, extenſa ſunt et mobilia et impenetrabilia: et inde concludimus corpora univerſa, etiam illa de quibus obſervationes non habemus, extenſa eſſe et mobilia et impenetrabilia. Ita corpora omnia ſunt gravia, de quibus obſervationes habemus: et inde concludimus corpora univerſa, etiam illa de quibus obſervationes non habemus, gravia eſſe. Si quis dicat corpora ſtellarum inerrantium non eſſe gravia, quandoquidem eorum gravitas nondum

dum eſt obſervata; eodem argumento dicere licebit neque extenſa eſſe, nec mobilia, nec impenetrabilia, cum hæ fixarum affectiones nondum ſint obſervatæ. Quid opus eſt verbis? inter primarias qualitates corporum univerſorum vel gravitas habebit locum; vel extenſio, mobilitas, et impenetrabilitas non habebunt. Et natura rerum vel recte explicabitur per corporum gravitatem, vel non recte explicabitur per corporum extenſionem, mobilitatem, et impenetrabilitatem.

Sunt qui gravitatem præter naturam eſſe dicunt, et miraculum perpetuum vocant. Itaque rejiciendam eſſe volunt, cùm in phyſicâ præternaturales cauſæ locum non habeant. Huic ineptæ prorſus objectioni diluendæ, quæ et ipſa philoſophiam ſubruit univerſam, vix operæ pretium eſt immorari. Vel enim gravitatem corporibus omnibus inditam eſſe negabunt: quod tamen dici non poteſt: vel eo nomine præter naturam eſſe affirmabunt, quod ex aliis corporum affectionibus atque ideò ex cauſis mechanicis originem non habeat. Dantur certè primariæ corporum affectiones; quæ quoniam ſunt primariæ, non pendent ab aliis. Viderint igitur annon et hæ omnes ſint pariter præter naturam, eoque pariter rejiciendæ: viderint vero qualis ſit deinde futura philoſophia.

Nonnulli ſunt quibus hæc tota phyſica cœleſtis vel ideò minùs placet, quòd cum *Carteſii* dogmatibus pugnare et vix conciliari poſſe videatur. His ſua licebit opinione frui; ex æquo autem agant oportet: non ergo denegabunt aliis eandem libertatem quam ſibi concedi poſtulant. Newtonianam itaque philoſophiam, quæ nobis verior habetur, retinere et amplecti licebit, et cauſas ſequi per phænomena comprobatas, potiùs quam fictas et nondum comprobatas. Ad veram philoſophiam pertinet, rerum naturas ex cauſis verè exiſtentibus derivare: eas verò leges quærere, quibus voluit ſummus Opifex hunc mundi pulcherrimum ordinem ſtabilire; non eas quibus potuit, ſi ita viſum fuiſſet. Rationi enim conſonum eſt, ut à pluribus cauſis, ab invicem nonnihil diverſis, idem poſſit effectus proficiſci: hæc autem vera erit cauſa, ex qua verè atque actu proficiſcitur; reliquæ locum non habent in philo-

SECTIO TERTIA.

ſophiâ verâ. In horologiis automatis idem indicis horarii motus vel ab appenſo pondere vel ab intus concluſo elatere oriri poteſt. Quod ſi oblatum horologium reverà ſit inſtructum pondere; ridebitur qui fingit elaterem, et ex hypotheſi ſic præproperè confictâ motum indicis explicare ſuſcipiet: oportuit enim internam machinæ fabricam penitiùs perſcrutari, ut ita motûs propoſiti principium verum exploratum habere poſſet. Idem vel non abſimile feretur judicium de philoſophis illis, qui materiâ quâdam ſubtiliſſimâ cœlos eſſe repletos, hanc autem in vortices indefinenter agi voluerunt. Nam à phænomenis vel accuratiſſimè ſatisfacere poſſent ex hypotheſibus ſuis; veram tamen philoſophiam tradidiſſe, et veras cauſas motuum cœleſtium inveniſſe nondum dicendi ſunt; niſi vel has reverà exiſtere, vel ſaltem alias non exiſtere demonſtraverint. Igitur ſi oſtenſum fuerit, univerſorum corporum attractionem habere verum locum in rerum naturâ; quinetiam oſtenſum fuerit, quâ ratione motus omnes cœleſtes abinde ſolutionem recipiant; vana fuerit et meritò deridenda objectio, ſi quis dixerit eoſdem motus per vortices explicari debere, etiamſi id fieri poſſe vel maximè conceſſerimus. Non autem concedimus: nequeunt enim illo pacto phænomena per vortices explicari; quod ab auctore noſtro abundè quidem et clariſſimis rationibus evincitur; ut ſomnis plùs æquò indulgeant oporteat, qui ineptiſſimo figmento refarciendo, noviſque porrò commentis ornando infelicem operam addicunt.

Si corpora planetarum et cometarum circa ſolem deferantur à vorticibus; oportet corpora delata et vorticum partes proxime ambientes eadem velocitate eademque cursûs determinatione moveri, et eandem habere denſitatem vel eandem vim inertiæ pro mole materiæ. Conſtat verò planetas et cometas, dùm verſantur in iiſdem regionibus cœlorum, velocitatibus variis variâque cursûs determinatione moveri. Neceſſariò itaque ſequitur, ut fluidi cœleſtis partes illæ, quæ ſunt ad eaſdem diſtantias à ſole, revolvantur eodem tempore in plagas diverſas cum diverſis velocitatibus: etenim aliâ opus erit directione et velocitate, ut tranſire poſſint planetæ; aliâ,

aliâ, ut tranſire poſſint cometæ. Quod cùm explicari nequeat; vel fatendum erit, univerſa corpora cœleſtia non deferri à materia vorticis; vel dicendum erit, eorundem motus repetendos eſſe non ab uno eodemque vortice, ſed à pluribus qui ab invicem diverſi ſint, idemque ſpatium ſoli circumjectum pervadant.

Si plures vortices in eodem ſpatio contineri, et ſeſe mutuo penetrare motibuſque diverſis revolvi ponantur; quoniam hi motus debent eſſe conformes delatorum corporum motibus, qui ſunt ſummè regulares, et peraguntur in ſectionibus conicis nunc valdè eccentricis, nunc ad circulorum proximè formam accedentibus; jure quærendum erit, qui fieri poſſit, ut iidem integri conſerventur nec ab actionibus materiæ occurſantis per tot ſæcula quicquam perturbentur. Sanè ſi motus hi fictitii ſunt magis compoſiti et difficiliùs explicantur, quam veri illi motus planetarum et cometarum; fruſtrà mihi videntur in philoſophiam recipi: omnis enim cauſa debet eſſe effectu ſuo ſimplicior. Conceſſa fabularum licentia, affirmaverit aliquis planetas omnes et cometas circumcingi atmoſphæris, ad inſtar telluris noſtræ; quæ quidem hypotheſis rationi magis conſentanea videbitur quam hypotheſis vorticum. Affirmaverit deinde has atmoſphæras, ex naturâ ſuâ, circa ſolem moveri et ſectiones conicas deſcribere; qui ſanè motus multò faciliùs concipi poteſt, quàm conſimilis motus vorticum ſe invicem permeantium. Denique planetas ipſos et cometas circa ſolem deferri ab atmoſphæris ſuis credendum eſſe ſtatuat, et ob repertas motuum cœleſtium cauſas triumphum agat. Quiſquis autem hanc fabulam rejiciendam eſſe putet, idem et alteram fabulam rejiciet: nam ovum non eſt ovo ſimilius, quàm hypotheſis atmoſphærarum hypotheſi vorticum.

Summa rei huc tandem redit: cometarum ingens eſt numerus; motus eorum ſunt ſummè regulares, et eaſdem leges cum planetarum motibus obſervant. Moventur in orbibus conicis, hi orbes ſunt valdè admodum eccentrici. Feruntur undique in omnes cœlorum partes, et planetarum regiones liberrimè pertranſeunt, et ſæpè contrà ſignorum ordinem incedunt. Hæc phænomena certiſſimè

SECTIO TERTIA.

tiſſimè confirmantur ex obſervationibus aſtronomicis: et per vortices nequeunt explicari. Imò, ne quidem cum vorticibus planetarum conſiſtere poſſunt. Cometarum motibus omninò locus non erit; niſi materia illa fictitia penitus è cœlis amoveatur.

Si enim planetæ circùm ſolem à vorticibus devehuntur; vorticum partes, quæ proximè ambiunt unumquemque planetam, ejuſdem denſitatis erunt ac planeta; uti ſuprà dictum eſt. Itaque materia illa omnis quæ contigua eſt orbis magni perimetro, parem habebit ac tellus denſitatem: quæ verò jacet intrà orbem magnum atque orbem Saturni, vel parem vel majorem habebit. Nam ut conſtitutio vorticis permanere poſſit, debent partes minùs denſæ centrum occupare, magis denſæ longiùs à centro abire. Cum enim planetarum tempora periodica ſint in ratione ſeſquiplicata diſtantiarum à ſole, oportet partium vorticis periodos eandem rationem ſervare. Inde verò ſequitur, vires centrifugas harum partium fore reciprocè ut quadrata diſtantiarum. Quæ igitur majore intervallo diſtant à centro, nituntur ab eodem recedere minore vi: unde ſi minùs denſæ fuerint, neceſſe eſt ut cedent vi majori, quâ partes centro propiores aſcendere conantur. Aſcendent ergo denſiores, deſcendent minus denſæ, et locorum fiet invicem permutatio; donec ita fuerit diſpoſita atque ordinata materia fluida totius vorticis, ut conquieſcere jam poſſit in æquilibrio conſtituta. Si bina fluida, quorum diverſa eſt denſitas, in eodem vaſe continentur; utique futurum eſt ut fluidum, cujus major eſt denſitas, majore vi gravitatis infimum petat locum: et ratione non abſimili omninò dicendum eſt, denſiores vorticis partes majore vi centrifugâ petere ſupremum locum. Tota igitur illa et multò maxima pars vorticis, quæ jacet extrà telluris orbem, denſitatem habebit atque adeò vim inertiæ pro mole materiæ, quæ non minor erit quàm denſitas et vis inertiæ telluris: inde verò cometis trajectis orietur ingens reſiſtentia, et valde admodum ſenſibilis; ne dicam, quæ motum eorundem penitùs ſiſtere atque abſorbere poſſe meritò videatur. Conſtat autem ex motu cometarum prorsùs regulari, nullam ipſos reſiſtentiam pati quæ vel minimùm ſentiri poteſt; atque

atque adeò neutiquam in materiam ullam incurſare, cujus aliqua ſit vis reſiſtendi, vel proinde cujus aliqua ſit denſitas ſeu vis inertiæ. Nam reſiſtentia mediorum oritur vel ab inertia materiæ fluidæ, vel à defectu lubricitatis. Quæ oritur à defectu lubricitatis, admodum exigua eſt; et ſanè vix obſervari poteſt in fluidis vulgò notis, niſi valdè tenacia fuerint ad inſtar olei et mellis. Reſiſtentia quæ ſentitur in aëre, aqua, hydrargyro, et hujuſmodi fluidis non tenacibus ferè tota eſt prioris generis; et minui non poteſt per ulteriorem quemcunque gradum ſubtilitatis, manente fluidi denſitate vel vi inertiæ, cui ſemper proportionalis eſt hæc reſiſtentia.

Corpora progrediendo motum ſuum fluido ambienti paulatim communicant, et communicando amittunt, amittendo autem retardantur. Eſt itaque retardatio motui communicato proportionalis; motus vero communicatus, ubi datur corporis progredientis velocitas, eſt ut fluidi denſitas; ergo retardatio ſeu reſiſtentia erit ut eadem fluidi denſitas; neque ullo pacto tolli poteſt, niſi à fluido ad partes corporis poſticas recurrente reſtituatur motus amiſſus. Hoc autem dici non poterit, niſi impreſſio fluidi in corpus ad partes poſticas æqualis fuerit impreſſioni corporis in fluidum ad partes anticas, hoc eſt, niſi velocitas relativa qua fluidum irruit in corpus à tergo, æqualis fuerit velocitati quâ corpus irruit in fluidum, id eſt, niſi velocitas abſoluta fluidi recurrentis duplo major fuerit quam velocitas abſoluta fluidi propulſi; quod fieri nequit. Nullo igitur modo tolli poteſt fluidorum reſiſtentia, quæ oritur ab eorundem denſitate et vi inertiæ. Itaque concludendum erit; fluidi cœleſtis nullam eſſe vim inertiæ, cùm nulla ſit vis reſiſtendi: nullam eſſe vim quâ motus communicetur, cùm nulla ſit vis inertiæ: nullam eſſe vim quâ mutatio quælibet vel corporibus ſingulis vel pluribus inducatur, cùm nulla ſit vis quâ motus communicetur; nullam eſſe omninò efficaciam, cum nulla ſit facultas mutationem quamlibet inducendi. Quidni ergo hanc hypotheſin, quæ fundamento planè deſtituitur, quæque naturæ rerum explicandæ ne minimùm quidem inſervit, ineptiſſimam vocare liceat et philoſopho prorsûs indignam. Qui cœlos materiâ fluidâ repletos eſſe volunt,

hanc

Sectio Tertia.

hanc verò non inertem eſſe ſtatuunt: hi verbis tollunt vacuum, re ponunt. Nam cum hujuſmodi materia fluida ratione nullâ ſecerni poſſit ab inani ſpatio; diſputatio tota fit de rerum nominibus, non de naturis. Quod ſi aliqui ſint adeò uſque dediti materiæ, ut ſpatium à corporibus vacuum nullo pacto admittendum credere velint; videamus quo tandem oporteat illos pervenire.

Vel enim dicent hanc, quam confingunt, mundi per omnia pleni conſtitutionem ex voluntate Dei profectam eſſe, propter eum finem, ut operationibus naturæ ſubſidium preſens haberi poſſet ab æthere ſubtiliſſimo cuncta permeante et implente; quod tamen dici non poteſt, ſiquidem jam oſtenſum eſt ex cometarum phænomenis, nullam eſſe hujus ætheris efficaciam: vel dicent ex voluntate Dei profectam eſſe, propter finem aliquem ignotum; quod neque dici debet, ſiquidem diverſa mundi conſtitutio eodem argumento pariter ſtabiliri poſſet: vel denique non dicent ex voluntate Dei profectam eſſe, ſed ex neceſſitate quâdam naturæ. Tandem igitur delabi oportet in fæces ſordidas gregis impuriſſimi. Hi ſunt qui ſomniant fato univerſa regi, non providentia; materiam ex neceſſitate ſuâ ſemper et ubique extitiſſe, infinitam eſſe et æternam. Quibus poſitis; erit etiam undiquaque uniformis: nam varietas formarum cum neceſſitate omninò pugnat. Erit etiam immota: nam ſi neceſſariò moveatur in plagam aliquam determinatam cum determinata aliqua velocitate; pari neceſſitate movebitur in plagam diverſam cum diverſa velocitate, in plagas autem diverſas, cum diverſis velocitatibus, moveri non poteſt; oportet igitur immotam eſſe. Neutiquam profectò potuit oriri mundus, pulcherrima formarum et motuum varietate diſtinctus, niſi ex liberrimâ voluntate cuncta providentis et gubernantis Dei.

Ex hoc igitur fonte promanarunt illæ omnes quæ dicuntur naturæ leges: in quibus multa ſanè ſapientiſſimi conſilii, nulla neceſſitatis apparent veſtigia. Has proinde non ab incertis conjecturis petere, ſed obſervando atque experiendo addiſcere debemus. Qui verè phyſicæ principia legeſque rerum, ſola mentis vi et interno rationis lumine fretum, invenire ſe poſſe confidit; hunc oportet

vel ſtatuere mundum ex neceſſitate fuiſſe, legeſque propoſitas ex eadem neceſſitate ſequi; vel ſi per voluntatem Dei conſtitutus ſit ordo naturæ, ſe tamen, homuncionem miſellum, quod optimum factu ſit perſpectum habere. Sana omnis et vera Philoſophia fundatur in phænomenis rerum: quæ ſi nos vel invitos et reluctantes ad hujuſmodi principia deducunt, in quibus clariſſimè cernuntur conſilium optimum et dominium ſummum ſapientiſſimi et potentiſſimi Entis; non erunt hæc ideò non admittenda principia, quod quibuſdam forſan hominibus minus grata ſunt futura. His vel miracula vel qualitates occultæ dicantur, quæ diſplicent: verum nomina malitiosè indita non ſunt ipſis rebus vitio vertenda; niſi illud fateri tandem velint, utique debere philoſophiam in atheiſmo fundari. Horum hominum gratiâ non erit labefactanda philoſophia, ſiquidem rerum ordo non vult immutari.

Obtinebit igitur apud probos et æquos judices præſtantiſſima philoſophandi ratio, quæ fundatur in experimentis et obſervationibus. Huic verò, dici vix poterit, quanta lux accedat, quanta dignitas, ab hoc opere præclaro illuſtriſſimi noſtri auctoris; cujus eximiam ingenii felicitatem, difficillima quæque problemata enodantis, et ad ea porrò pertingentis ad quæ nec ſpes erat humanam mentem aſſurgere potuiſſe, meritò admirantur et ſuſpiciunt quicunque paulò profundius in hiſce rebus verſati ſunt. Clauſtris ergò reſeratis, aditum nobis aperuit ad pulcherrima rerum myſteria. Syſtematis mundani compagem elegantiſſimam ita tandem patefecit et penitiùs perſpectandam dedit; ut nec ipſe, ſi nunc reviviſceret, rex *Alphonſus* vel ſimplicitatem vel harmoniæ gratiam in ea deſideraret. Itaque naturæ majeſtatem propiùs jam licet intueri, et dulciſſima contemplatione frui, Conditorem verò ac Dominum univerſorum impenſiùs colere et venerari, qui fructus eſt philoſophiæ multò uberrimus. Cæcum eſſe oportet, qui ex optimis et ſapientiſſimis rerum ſtructuris non ſtatim videat Fabricatoris omnipotentis infinitam ſapientiam et bonitatem: inſanum, qui profiteri nolit.

Sectio Tertia.

PROPOSITIO XIII. PROBLEMA VI.

Revolvatur corpus in ellipſi: requiritur lex vis centripetæ tendentis ad umbilicum ellipſeos.

Tab. VI. Fig. 51.

Eſto ellipſis umbilicus S. Agatur SP ſecans ellipſeos tum diametrum DK in E, tum ordinatim applicatam Qv in x, et compleatur parallelogrammum $QxPR$. Patet EP æqualem eſſe ſemiaxi majori AC, eo quod, actâ ab altero ellipſeos umbilico H lineâ HI ipſi EC parallelâ, ob æquales CS, CH æquentur ES, EI, adeo ut EP ſemiſumma ſit ipſarum PS, PI, id eſt (ob parallelas HI, PR, et angulos æquales IPR, HPZ) ipſarum PS, PH, quæ conjunctim axem totum $2AC$ adæquant [t]. Ad SP demittatur perpendicularis QT, et ellipſeos latere recto principali (ſeu $\frac{2BC\,quad.}{AC}$) dicto L, erit $L \times QR$ ad $L \times Pv$ ut QR ad Pv, id eſt, ut PE ſeu AC ad PC; et $L \times Pv$ ad GvP ut L ad Gv,* et GvP ad Qv *quad.* ut PC *quad.* ad CD *quad.* et (per corol. 2. lem. VII.) Qv *quad.* ad Qx *quad.* punctis Q et P coeuntibus eſt ratio æqualitatis; et Qx *quad.* ſeu Qv *quad.* eſt ad QT *quad.* ut EP *quad.* ad PF *quad.* id eſt ut CA *quad.* ad PF *quad.* ſive ‡ ut CD *quad.* ad CB *quad.* Et conjunctis his omnibus rationibus, [u] $L \times QR$ fit ad QT *quad.* ut $AC \times L \times PCq \times CDq$ ſeu $2CBq \times PCq \times CDq$ ad $PC \times Gv \times CDq \times CBq$, ſive ut $2PC$ ad Gv. Sed punctis Q et P coeuntibus æquantur $2PC$ et Gv. Ergo et his proportionalia $L \times QR$ et QT *quad.* æquantur.

[t] 74. Eſt $EI = \frac{1}{2}SI$, $IP = \frac{IP+PH}{2}$, unde $EI+IP = \frac{SP+PH}{2} = AC$.

[u] 75. Conjungantur Rationes

$$\begin{aligned} L \times QR &: L \times Pv :: AC : PC \\ L \times Pv &: Gv \times Pv :: L : Gv \\ Gv \times Pv &: Qv^2 :: PC^2 : CD^2 \\ Qv^2 &: QT^2 :: CD^2 : CB^2 \end{aligned}$$

et fit $L \times QR : QT^2 :: AC \times L \times PC : Gv \times CB^2 :: 2BC^2 \times PC : Gv \times CB^2 :: 2PC : Gv$.

* Ham. Con. Sect. L. I. P. xxxi. Cor. i. ‡ Ham. L. IV. P. i.

æquantur. Ducantur hæc æqualia in $\frac{SPq}{QR}$, et fiet $L \times SPq$ æquale $\frac{SPq \times QTq}{QR}$. Ergo (per corol. 1. et 5. prop. V.) vis centripeta reciproce eſt ut $L \times SPq$, id eſt, reciproce in ratione duplicata diſtantiæ SP. Q.E.I. SECTIO TERTIA.

Idem aliter.

Cum vis ad centrum ellipſeos tendens, qua corpus P in ellipſi illa revolvi poteſt, ſit (per corol. 1. prop. IX.) ut CP diſtantia corporis ab ellipſeos centro C; ducatur CE parallela ellipſeos tangenti PR; et vis, qua corpus idem P circum aliud quodvis ellipſeos punctum S revolvi poteſt, ſi CE et PS concurrant in E, erit ut $\frac{PE\ cub.}{SPq}$ (per corol. 3. prop. VI. [v]:) hoc eſt, ſi punctum S ſit umbilicus ellipſeos, ideoque PE detur, ut SPq reciproce. Q.E.I.

Eadem brevitate, qua traduximus problema quartum ad parabolam, et hyperbolam, liceret idem hic facere: verum ob dignitatem problematis, et uſum ejus in ſequentibus non pigebit caſus cæteros demonſtratione confirmare.

PRO-

[v] 76. Nam ſi vires abſolutæ in centris C et S tales eſſe ſupponantur, ut tempora periodica circa hæc centra æqualia ſint, erit (per prop. VI. cor. 3.) vis tendens ad centrum C, vel CP, ad vim tendentem ad focum S, ut $CP \times SP^2$, ad cubum lineæ ductæ à centro C ad tangentem, parallelæ diſtantiæ SP à ſecundo centro virium S, quæ linea æqualis eſt PE: unde vis tendens ad focum eſt ut $\frac{CP \times PE^3}{CP \times SP^2} = \frac{PE^3}{SP^2}$.

77. LEM. Chorda curvaturæ PV quæ per focum ellipſeos tranſit æqualis eſt $\frac{2DC^2}{PE}$. Nam ſit PO diameter curvaturæ, ob ſimilia triangula PEF, PVO, erit $PE : PF :: PO$ (vel $\frac{2CD^2}{PF}$) $: PV = \frac{2CD^2}{PE}$. TAB. VI. FIG. 52.

78. PROP. XIII. Aliter. Iiſdem poſitis, demittatur $S\Upsilon$ perpendicularis à foco S in tangentem, et ob ſimilia triangula $SP\Upsilon$, EPF, eſt $S\Upsilon : SP :: PF : PE$, ideoque $S\Upsilon^2 = \frac{SP^2 \times PF^2}{PE^2}$, $S\Upsilon^2 \times PV = \frac{SP^2 \times PF^2 \times 2CD^2}{PE^3}$;

SECTIO TERTIA.

PROPOSITIO XIV. PROBLEMA VII.

Moveatur corpus in hyperbola: requiritur lex vis centripetæ tendentis ad umbilicum figuræ.

TAB. VI. FIG. 53.

Sunto CA, CB ſemiaxes hyperbolæ; PG, KD diametri aliæ conjugatæ; PF perpendiculum ad diametrum KD; et Qv ordinatim applicata ad diametrum GP. Agatur SP ſecans cum diametrum DK in E, tum ordinatim applicatam Qv in x, et compleatur parallelogrammum $QRPx$. Patet EP æqualem eſſe ſemiaxi tranſverſo AC, eo quod, acta ab altero hyperbolæ umbilico H linea HI ipſi EC parallela, ob æquales CS, CH æquentur ES, EI; adeo ut EP ſemidifferentia ſit ipſarum PS, PI, id eſt (ob parallelas IH, PR et angulos æquales IPR, HPZ) ipſarum PS, PH, quarum differentia axem totum $2AC$ adæquat. Ad SP demittatur perpendicularis QT. Et hyperbolæ latere recto principali (ſeu $\frac{2BCq}{AC}$) dicto L, erit $L \times QR$ ad $L \times Pv$ ut QR ad Pv, ſeu Px ad Pv, id eſt (ob ſimilia triangula Pxv, PEC) ut PE ad PC, ſeu AC ad PC. Erit etiam $L \times Pv$ ad $Gv \times Pv$ ut L ad Gv; et (ex natura conicorum) rectangulum GvP ad Qv *quad.* ut PCq ad CDq; et (per corol. 2. lem. VII.) Qv *quad.* ad Qx *quad.* punctis Q et P coeuntibus fit ratio æqualitatis; et Qx *quad.* ſeu Qv *quad.* eſt ad QTq ut EPq ad PFq, id eſt, ut CAq ad PFq, ſive ut CDq ad CBq: et conjunctis his omnibus rationibus $L \times QR$ fit ad QTq ut $AC \times L \times PCq \times CDq$, ſeu $2CBq \times PCq \times CDq$ ad $PC \times Gv \times CDq \times CBq$, ſive ut $2PC$ ad Gv. Sed punctis P et Q coeuntibus

unde, ob data $2CD^2 \times PF^2$, et PE^3, eſt vis centripeta reciprocè ut SP^2. Q. E. I.

[79] Ex accuratiſſimis Tychonis Braheæ obſervationibus invenit Keplerus, planetas non in orbitis circularibus, ſed ellipticis deferri, ſolemque in ellipſeos focorum alterutro verſari: et ex hâc propoſitione conſequitur eos igitur retineri in orbitis ſuis viribus centripetis, quæ in inverſâ duplicata ratione diſtantiarum à ſole variantur.

bus æquantur $2PC$ et Gv. Ergo et his proportionalia $L \times \mathcal{Q}R$ et $\mathcal{Q}\mathcal{T}q$ æquantur. Ducantur hæc æqualia in $\frac{SPq}{\mathcal{Q}R}$, et fiet $L \times SPq$ æquale $\frac{SPq \times \mathcal{Q}\mathcal{T}q}{\mathcal{Q}R}$. Ergo (per corol. 1. et 5. prop. V.) vis centripeta reciproce eſt ut $L \times SPq$, id eſt, reciproce in ratione duplicata diſtantiæ SP. Q. E. I. SECTIO TERTIA.

Idem aliter.

Inveniatur vis, quæ tendit ab hyperbolæ centro C. Prodibit hæc diſtantiæ CP proportionalis. Inde vero (per corol. 3. prop. VI.) vis ad umbilicum S tendens erit ut $\frac{PE\ cub.}{SPq}$, hoc eſt, ob datam PE reciproce ut SPq. Q. E. I.

Eodem modo demonſtratur, quod corpus hac vi centripeta in repulſivam verſa movebitur in hyperbola oppoſita.

LEMMA XII.

Perpendiculum, quod ab umbilico parabolæ ad tangentem ejus demittitur, medium eſt proportionale inter diſtantias umbilici a puncto contactus et a vertice principali figuræ.

Sit enim AP parabola, S umbilicus ejus, A vertex principalis, P punctum contactus, PO ordinatim applicata ad diametrum principalem, PM tangens diametro principali occurrens in M, et SN linea perpendicularis ab umbilico in tangentem. Jungatur AN et ob æquales MS et SP [y], MN, et NP, MA et AO parallelæ erunt rectæ AN et OP; et inde triangulum SAN rectangulum erit ad A, et ſimile triangulis æqualibus SNM, SNP: ergo PS eſt ad SN ut SN ad SA. Q. E. D. TAB. VI. FIG. 54.

Corol.

[y] 80. Sumatur $A\mathcal{Q}$ ipſi AS æqualis, et ducatur linea $\mathcal{Q}R$ perpendicularis et PR parallela ipſi MO; ob $A\mathcal{Q}$ et AS, MA et AO [Ham. L. I. P. XLVII.] æquales, æquantur etiam MS, $\mathcal{Q}O$; ob $\mathcal{Q}O$ vero æqualem PR vel SP, tandem æquales erunt MS, SP. TAB. VI. FIG. 54.

SECTIO TERTIA.

Corol. 1. PSq eſt ad SNq ut PS ad SA.

Corol. 2. Et ob datam SA eſt SNq ut PS.

Corol. 3. Et concurſus tangentis cujuſvis PM cum recta SN, quæ ab umbilico in ipſam perpendicularis eſt, incidit in rectam AN, quæ parabolam tangit in vertice principali.

PROPOSITIO XV. PROBLEMA VIII.

Moveatur corpus in perimetro parabolæ: requiritur lex vis centripetæ tendentis ad umbilicum hujus figuræ.

TAB. VI. FIG. 55.

Maneat conſtructio lemmatis, ſitque P corpus in perimetro parabolæ, et a loco Q, in quem corpus proxime movetur, age ipſi SP parallelam QR et perpendicularem QT, necnon Qv tangenti parallelam, et occurrentem tum diametro PG in v, tum diſtantiæ SP in x. Jam ob ſimilia triangula Pxv, SPM, et æqualia unius latera SM, SP, æqualia ſunt alterius latera Px ſeu QR et Pv. Sed ex conicis quadratum ordinatæ Qv æquale eſt rectangulo ſub latere recto et ſegmento diametri Pv ‡, id eſt rectangulo $4PS \times Pv$, ſeu $4PS \times QR$; et punctis P et Q coeuntibus, ratio Qv ad Qx (per corol. 2. lem. VII.) fit ratio æqualitatis. Ergo Qx *quad.* eo in caſu æquale eſt rectangulo $4PS \times QR$. Eſt autem (ob ſimilia triangula QxT, SPN) Qxq ad QTq ut PSq ad SNq, hoc eſt (per corol. 1. lem. XII.) ut PS ad SA, id eſt, ut $4PS \times QR$ ad $4SA \times QR$, et inde (per prop. IX. lib. V. elem.) QTq et $4SA \times QR$ æquantur. Ducantur hæc æqualia in $\frac{SPq}{QR}$, et fiet $\frac{SPq \times QTq}{QR}$ æquale $SPq \times 4SA$: et propterea (per corol. 1. et 5. prop. V.) vis centripeta eſt reciproce ut $SPq \times 4SA$, id eſt, ob datam $4SA$ reciproce in duplicata ratione diſtantiæ SP. Q. E. I. [z].

Corol.

TAB. VI. FIG. 52.

[z] 81. LEM. In omni ſectione conicâ eſt radius circuli curvaturæ Pr æqualis $\frac{L \times SP^3}{2ST^3}$. Eſt enim in ellipſi $CD \times PF = CA \times CB$ [Hamilton

‡ Hamil. Con. Sect. L. II. P. i.

Corol. 1. Ex tribus noviſſimis propoſitionibus conſequens eſt, quod ſi corpus quodvis P ſecundum lineam quamvis rectam PR quacunque cum velocitate exeat de loco P, et vi centripeta, quæ ſit reciproce proportionalis quadrato diſtantiæ locorum a centro, ſimul agitetur; movebitur hoc corpus in aliqua ſectionum conicarum umbilicum habente in centro virium; et contra. Nam datis umbilico, et puncto contactus, et poſitione tangentis, deſcribi poteſt ſectio conica, quæ curvaturam datam ad punctum illud habebit. Datur autem curvatura ex data vi centripeta, et velocitate corporis: et orbes duo ſe mutuo tangentes eadem vi centripeta eademque velocitate deſcribi non poſſunt [a].

PRO-

L. IV. P. 1.] unde $CD^2 = \frac{CA^2 \times CB^2}{PF^2}$, et $\frac{CD^2}{PF}$ [vel Pr] $= \frac{CA^2 \times CB^2}{PF^3}$; ob ſimilia autem triangula PFE, $SP\Upsilon$, $PF : PE :: S\Upsilon : SP$, et $PF^3 = \frac{PE^3 \times S\Upsilon^3}{SP^3}$, quo ſubſtituto, $Pr = \frac{CB^2 \times SP^3}{PE \times S\Upsilon^3}$; pro $\frac{CB^2}{PE}$ ponatur $\frac{L}{2}$ et $Pr = \frac{L \times SP^3}{2 S\Upsilon^3}$. Eodem modo demonſtratur lemma in hyperbolâ. Creſcente focorum diſtantiâ in infinitum, abeat figura elliptica in parabolam, manet $Pr = \frac{L \times SP^3}{2 S\Upsilon^3}$.

82. Exinde prop. XIII. XIV. XV. breviter et generatim demonſtrari poſſunt. Nam eſt vis centripeta ut $\frac{SP}{S\Upsilon^3 \times Pr} = \frac{2 S\Upsilon^3 \times SP}{S\Upsilon^3 \times L \times SP^3} = \frac{2}{L \times SP^2}$, hoc eſt ob datum $\frac{2}{L}$ ut $\frac{1}{SP^2}$.

83. Ex calculo à clariſſimo Halleio inito, et quam plurimis obſervationibus aſtronomicis comprobato, conſtat cometas moveri circa ſolem in orbitis parabolicis, vel ellipticis excentricis ad formam parabolarum quam proxime accedentibus: et ex propoſitionibus noviſſimis conſequitur, vires quibus retinentur in orbitis ſuis variari in inversâ duplicata ratione diſtantiarum a ſole.

[a] 84. Ob datas velocitatem in puncto P, poſitionem tangentis $P\Upsilon$, et vis centripetæ quantitatem abſolutam, dantur $Q\Upsilon$ et QR, ideoque $\frac{Q\Upsilon^2}{QR}$, ceu latus rectum. Sumatur PE æqualis dimidio lateris recti; et ex punctis P et E erigantur PK, EK perpendiculares ipſis $P\Upsilon$, PS, quæ occurrant in K; erit punctum K in axe ſectionis, (Ham. ſect. con. L. ii. P. xxvii.) et proinde linea SK poſitio axis: ducatur jam PF, ita ut angulus FPy ſit æqua-

Tab. VI. Fig. 56.

lis

Sectio Tertia.

PROPOSITIO XVI. THEOREMA VIII.

Si corpora plura revolvantur circa centrum commune, et vis centripeta ſit reciproce in duplicata ratione diſtantiæ locorum a centro; dico quod orbium latera recta principalia ſunt in duplicata ratione arearum, quas corpora radiis ad centrum ductis eodem tempore deſcribunt.

Nam (per prop. XIII. XIV. XV.) latus rectum L æquale eſt quantitati $\frac{2Tq}{2R}$, quæ ultimo fit, ubi coeunt puncta P et Q. Sed linea minima $2R$ dato tempore, eſt ut vis centripeta generans, hoc eſt

Tab. VII. Fig. 57.

lis angulo SPY; linea SK utrinque producta vel occurret lineæ PF in loco quodam F, vel huic lineæ parallela erit, vel ei occurret ad alteram partem puncti S: in primo caſu orbita ellipſis eſt, cujus foci ſunt S et F; in ſecundo, parabola; in tertio hyperbola: hæ vero orbitæ, focis, axis poſitione, et latere recto principali datis, deſcribi poſſunt. Patet corpus quodvis in orbitis hoc modo conſtructis moveri poſſe, ſi vis centripeta ſit reciproce ut quadratum diſtantiæ: et patet corpus hoc nullam aliam orbitam deſcribere poſſe, ex eadem ratiocinandi methodo, quâ uſi ſumus in nota (61.) ad hunc caſum applicatâ.

Tab. VI. Fig. 51.

85. Prob. Exeat corpus aliquod de loco dato P datâ cum velocitate ſecundùm datam poſitione rectam PY, et ſimul urgeatur à vi centripetâ tendente ad centrum datum S, quæ in loco quidem P innoteſcat, aliis vero in locis ſit reciprocè ut quadrata diſtantiarum ab hoc centro. Quæritur ſectio conica quam motu ſuo deſcripturum eſt hoc corpus. Cum tangat recta ZPY figuram quæſitam in loco P, et cum detur poſitione recta SP per umbilicorum alterum S tranſiens, dabitur poſitione recta PH, quæ per alterum figuræ umbilicum H tranſibit, et cujus inventa longitudo ſolvet problema.

Sit igitur a ad b ut data velocitas in orbita, ad velocitatem quâ circulus deſcribitur in eâdem diſtantiâ, quæ etiam dabitur ex datis vi et diſtantiâ: atque his quidem datis dabitur et formâ et poſitione trajectoria quæſita: erit enim $2bb-aa : aa :: SP : PH$, inter quas ſemiaxis tranſverſus medius eſt arithmeticus; et ſi in tangentem ZPY demittantur perpendiculares SY, HZ, erit etiam $2bb-aa : aa :: SY : HZ$, inter quas ſemiaxis conjugatus medius eſt geometricus. Dem. Eſto enim umbilicus alter H, quæcunque tandem fuerit longitudo PH; et cum ſectiones omnes conicæ ad ellipſin referri poſſunt, ponamus ſectionem quæſitam ellipticam eſſe; et quadratum ſemiaxis conjugati æquale erit et rectangulo $\overline{SP+PH} \times \frac{L}{4}$, et rectangulo $SY \times HZ$

eſt (per hypotheſin) reciproce ut SPq. Ergo $\frac{\mathcal{Q}\mathcal{T}q}{\mathcal{Q}R}$ eſt ut $\mathcal{Q}\mathcal{T}q \times SPq$, hoc eſt, latus rectum L in duplicata ratione areæ $\mathcal{Q}\mathcal{T} \times SP$. Q. E. D.

Corol. Hinc ellipſeos area tota, eique proportionale rectangulum ſub axibus eſt in ratione compoſita ex ſubduplicata ratione lateris recti, et ratione temporis periodici. Namque area tota eſt ut area $\mathcal{Q}\mathcal{T} \times SP$, quæ dato tempore deſcribitur, ducta in tempus periodicum.

PROPOSITIO XVII. THEOREMA IX.

Iiſdem poſitis, dico quod tempora periodica in ellipſibus ſunt in ratione ſeſquiplicata majorum axium.

Namque axis minor eſt medius proportionalis inter axem majorem et latus rectum, atque ideo rectangulum ſub axibus eſt in ratione $\times HZ$ (Ham. L. ii. P. xxi.) ergo $\overline{SP + PH} \times \frac{L}{4} = S\Upsilon \times HZ$: ſed ob ſimilia triangula $SP\Upsilon$, HPZ, erit $HZ = S\Upsilon \times \frac{PH}{SP}$, et $S\Upsilon \times HZ = S\Upsilon^2 \times \frac{PH}{SP}$; quare eſt $\overline{SP + PH} \times \frac{L}{4} = S\Upsilon^2 \times \frac{PH}{SP}$; quare $\overline{SP + PH} \times \frac{SP}{PH} = \frac{4S\Upsilon^2}{L}$. Sed velocitas in omni orbitâ ad altitudinem quamvis SP eſt in ſubduplicatâ ratione $\frac{\mathcal{Q}\mathcal{T}^2 \times SP^2}{S\Upsilon^2}$ (18), et in conicâ ſectione $L = \frac{\mathcal{Q}\mathcal{T}^2}{\mathcal{Q}R}$; et præterea $\mathcal{Q}R$ dato tempore eſt ut $\frac{1}{SP^2}$, unde fit L proportionale $\mathcal{Q}\mathcal{T}^2 \times SP^2$, quo ſubſtituto eſt velocitas in conica ſectione reciproce in ſubduplicatâ ratione longitudinis $\frac{S\Upsilon^2}{L}$, vel $\frac{4S\Upsilon^2}{L}$: ergo eadem velocitas eſt etiam reciprocè in ſubduplicatâ ratione longitudinis $\overline{SP + PH} \times \frac{SP}{PH}$. Ergo velocitas corporis in circulo revolventis ad altitudinem primam SP eſt ad velocitatem corporis e loco ſuo primo P exeuntis, in ſubduplicatâ ratione $\overline{SP + PH} \times \frac{SP}{PH}$ ad

Sectio Tertia.

tione compoſita ex ſubduplicata ratione lateris recti et ſeſquiplicata ratione axis majoris. Sed hoc rectangulum (per corol. prop. XVI.) eſt in ratione compoſita ex ſubduplicata ratione lateris recti et ratione periodici temporis. Dematur utrobique ſubduplicata ratio lateris recti, et manebit ſeſquiplicata ratio majoris axis eadem cum ratione periodici temporis. Q. E. D. (b).

Corol.

$SP + SP \times \frac{SP}{SP}$, vel in ſubduplicatâ ratione $SP + PH$ ad $2PH$. Eſt ergo b^2 ad a^2 ut $SP + PH$ ad $2PH$; $2b^2$ ad a^2 ut $2SP + 2PH$ ad $2PH$; vel ut $SP + PH$ ad PH, et dividendo $2b^2 - a^2$ ad a^2 ut SP ad PH vel ut $S\Upsilon$ ad HZ. Q. E. D.

86. *Cor.* 1. Orbita deſcripta ellipſis erit, vel parabola, vel hyperbola, prout quantitas a^2 minor fuerit, vel æqualis, vel major quam $2b^2$.

87. *Cor.* 2. Si parabola ſit, erit hujus latus rectum $\frac{4S\Upsilon^2}{SP}$ per Lem. XII. et etiam ex ſolutione hujus problematis; et axis per S tranſiens erit recta ipſi PH parallela.

88. *Cor.* 3. Si ellipſis ſit vel hyperbola, erit ellipſeos ſemiaxis $SP \times \frac{b^2}{2b^2 - a^2}$, et ſemiaxis hyperbolæ $SP \times \frac{b^2}{a^2 - 2b^2}$. Porro ſemiaxis conjugatus in caſu priore erit $S\Upsilon \times \sqrt{\frac{a^2}{2b^2 - a^2}}$; in poſteriore $S\Upsilon \times \sqrt{\frac{a^2}{a^2 - 2b^2}}$.

89. *Cor.* 4. Itaque ſi detur velocitas, et vis centripeta ad altitudinem quamvis SP, idem erit axis tranſverſus quicunque fuerit angulus $SP\Upsilon$ ad eandem altitudinem; et axis conjugatus erit ut ſinus anguli iſtius $SP\Upsilon$.

b 90. Contra, poſito quod tempora periodica in ellipſibus diverſis circa centrum idem deſcriptis varientur in ratione ſeſquiplicatâ mediocrium diſtantiarum, erunt vires in mediis illis diſtantiis ut diſtantiarum quadrata inversè. Sit enim A ſemiaxis major, M ſemiaxis minor, et P tempus periodicum, erit ex hypotheſi P ut $A^{\frac{3}{2}}$; quoniam vero tempora periodica ſunt in ratione arearum totarum directè, et arearum datis temporibus deſcriptarum inversè, erit in ellipſi P vel $A^{\frac{3}{2}}$ ut $\frac{A \times M}{\mathcal{QT} \times SP}$, unde eſt $\mathcal{QT} \times SP$ ut $\frac{M}{A^{\frac{1}{2}}}$, vel $\mathcal{QT}^2 \times SP^2$ ut $\frac{M^2}{A}$, quæ eſt ut L, vel ut $\frac{\mathcal{QT}^2}{\mathcal{QR}}$; unde eſt $\mathcal{QR}$, vel ei proportionalis vis centripeta, inversè ut diſtantiæ mediocris quadratum.

91. Hinc ſequitur, conceſsâ rationum harmoniâ quam invenit Keplerus inter temporum periodicorum quadrata et mediarum diſtantiarum cubos, quod vires

Corol. Sunt igitur tempora periodica in ellipſibus eadem ac in circulis, quorum diametri æquantur majoribus axibus ellipſeon. SECTIO TERTIA.

PROPOSITIO XVIII. THEOREMA X.

Iiſdem poſitis, et actis ad corpora lineis rectis, quæ ibidem tangant orbitas, demiſſiſque ab umbilico communi ad has tangentes perpendicularibus: dico quod velocitates corporum ſunt in ratione compoſita ex ratione perpendiculorum inverſe, et ſubduplicata ratione laterum rectorum principalium directe.

Ab umbilico S ad tangentem PR demitte perpendiculum $S\Upsilon$, et velocitas corporis P erit reciproce in ſubduplicata ratione quantitatis $\frac{S\Upsilon q}{L}$. Nam velocitas illa eſt ut arcus quam minimus $P\mathcal{Q}$, in data temporis particula deſcriptus, hoc eſt (per lem. VII.) ut tangens PR, id eſt, ob proportionales PR ad $\mathcal{Q}\mathcal{T}$ et SP ad $S\Upsilon$, ut $\frac{SP \times \mathcal{Q}\mathcal{T}}{S\Upsilon}$, ſive ut $S\Upsilon$ reciproce et $SP \times \mathcal{Q}\mathcal{T}$ directe; eſtque $SP \times \mathcal{Q}\mathcal{T}$ ut area dato tempore deſcripta, id eſt (per prop. XVI.) in ſubduplicata ratione lateris recti. Q. E. D. ‡ TAB. VII. FIG. 57.

Corol. 1. Latera recta principalia ſunt in ratione compoſita ex duplicata ratione perpendiculorum, et duplicata ratione velocitatum.

Corol. 2. Velocitates corporum, in maximis et minimis ab umbilico communi diſtantiis, ſunt in ratione compoſita ex ratione diſtantiarum

vires acceleratrices, quibus planetæ omnes primarii in ſolem urgentur, ſunt inter ſe inversè ut mediarum illarum diſtantiarum quadrata.

92. Hinc etiam, ſi ex obſervationibus aſtronomicis diametri orbitarum quas cometæ deſcribunt, accurate determinari poſſint, tempora reditûs definire liceret; et vice versâ, temporibus revolutionum conceſſis, axes illorum majores, maximæque a ſole vel tellure excurrentium diſtantiæ, calculo ſimpliciſſimo inveniri poſſunt.

‡ Patet etiam e demonſtratione problematis (85).

SECTIO TERTIA

distantiarum inverse, et subduplicata ratione laterum rectorum principalium directe. Nam perpendicula jam sunt ipsæ distantiæ.

Corol. 3. Ideoque velocitas in conica sectione, in maxima vel minima ab umbilico distantia, est ad velocitatem in circulo in eadem a centro distantia in subduplicata ratione lateris recti principalis ad duplam illam distantiam.

Corol. 4. Corporum in ellipsibus gyrantium velocitates in mediocribus distantiis ab umbilico communi sunt eædem, quæ corporum gyrantium in circulis ad easdem distantias; hoc est (per corol. 6. prop. IV.) reciproce in subduplicata ratione distantiarum. Nam perpendicula jam sunt semi-axes minores, et hi sunt ut mediæ proportionales inter distantias et latera recta. Componatur hæc ratio inverse cum subduplicata ratione laterum rectorum directe, et fiet ratio subduplicata distantiarum inverse (c).

Corol. 5. In eadem figura, vel etiam in figuris diversis, quarum latera recta principalia sunt æqualia, velocitas corporis est reciproce ut perpendiculum demissum ab umbilico ad tangentem (d).

Corol. 6. In parabola velocitas est reciproce in subduplicata ratione distantiæ corporis ab umbilico figuræ; in ellipsi magis variatur, in hyperbola minus quam in hac ratione. Nam (per corol. 2. lem. XII.) perpendiculum demissum ab umbilico ad tangentem parabolæ est in subduplicata ratione distantiæ. In hyperbola perpendiculum minus variatur, in ellipsi magis.‡

Corol. 7.

TAB. VI. FIG. 51.

(c) 93. Patet (per 85). velocitatem in sectione conicâ esse semper ad velocitatem in circulo ad eandem distantiam, in subduplicatâ ratione distantiæ PH ab altero foco, ad semiaxem majorem, est enim $a^2 : b^2 :: 2PH : SP + PH :: PH : \frac{SP + PH}{2}$: in mediâ vero distantiâ est PH æqualis semiaxi majori.

94. Hinc sequitur, si vires quibus planetæ in solem urgentur sint inverse ut distantiarum quadrata, quod eorundem velocitates forent in ratione distantiarum mediocrium subduplicatâ inversè; quod ab astronomorum observationibus comprobatum invenimus.

(d) 95. Ob motum in ellipticâ orbitâ confectum patet tellurem velocius ferri tempore brumali, quàm tempore æstivo: tempore enim brumali tellus in perihelio versatur.

‡ Ham. Con. Sec. L. II. P. xxxi. Cor. II.

Corol. 7. In parabola velocitas corporis ad quamvis ab umbilico diſtantiam eſt ad velocitatem corporis revolventis in circulo ad eandem a centro diſtantiam in ſubduplicata ratione numeri binarii ad unitatem; in ellipſi minor eſt, in hyperbola major quam in hac ratione. Nam per hujus corollarium ſecundum velocitas in vertice parabolæ eſt in hac ratione, et per corollaria ſexta hujus et propoſitionis quartæ ſervatur eadem proportio in omnibus diſtantiis (e). Hinc etiam in parabola velocitas ubique æqualis eſt velocitati corporis revolventis in circulo ad dimidiam diſtantiam, in ellipſi minor eſt, in hyperbola major (f).

Corol. 8. Velocitas gyrantis in ſectione quavis conica eſt ad velocitatem gyrantis in circulo in diſtantia dimidii lateris recti principalis ſectionis, ut diſtantia illa ad perpendiculum ab umbilico in tangentem ſectionis demiſſum. Patet per corollarium quintum.

Corol. 9. Unde cum (per Cor. 6. Prop. IV.) velocitas gyrantis in hoc circulo ſit ad velocitatem gyrantis in circulo quovis alio reciprocè in ſubduplicatâ ratione diſtantiarum; fiet ex æquo velocitas gyrantis in conicâ ſectione ad velocitatem gyrantis in circulo in eâdem diſtantia, ut media proportionalis inter diſtantiam illam communem et ſemiſſem principalis lateris recti ſectionis, ad perpendiculum ab umbilico communi in tangentem ſectionis demiſſum (g).

(e) 96. Nam in parabolâ *PH* æqualis eſt axi majori: in ellipſi ſemper minor eſt: in hyperbolâ major. Unde in parabolâ eſt *PH* ad ſemiaxem majorem ut 2 ad 1; in ellipſi minor, in hyperbolâ major quàm in hâc ratione: et velocitas eſt ad velocitatem in circulo in ratione hujus ſubduplicatâ.

(f) 97. Velocitas in parabolâ eſt ad velocitatem in circulo ad eandem diſtantiam ut $\sqrt{2}$ ad 1, velocitas in hoc circulo eſt ad velocitatem in circulo ad dimidiam diſtantiam ut 1 ad $\sqrt{2}$, componendo igitur has rationes, velocitas in parabolâ æqualis erit velocitati in circulo ad dimidiam diſtantiam: in ellipſi autem minor eſt, et in hyperbolâ major, ex eo quod ratio velocitatis in ellipſi ad velocitatem in circulo ad eandem diſtantiam minor eſt quàm $\sqrt{2}$ ad 1, in hyperbolâ major.

(g) 98. Conſequitur etiam ex ipſâ propoſitione: eſt enim velocitas in conicâ ſectione ad velocitatem in circulo ut $\frac{\sqrt{L}}{SY}$ ad $\frac{\sqrt{2SP}}{SP}$, vel ut $\sqrt{\frac{L \times SP}{2}}$ ad

SECTIO TERTIA.

ad SY, hoc eſt ut media proportionalis inter $\frac{L}{2}$ et SP, ad perpendiculum SY.

99. Omnia hæc corollaria ſequuntur etiam ex eo, quod velocitas in omni orbitâ eſt ad velocitatem in circulo ad eandem diſtantiam in ſubduplicata ratione chordæ curvaturæ per centrum virium tranſeuntis ad duplam diſtantiam.

100. In ellipſi velocitas V in puncto quovis P eſt ad velocitatem v in mediâ diſtantiâ B, in ſubduplicatâ ratione PH diſtantiæ ab altero foco, ad PS diſtantiam a centro virium. Eſt enim $V^2 : v^2 :: CB^2 : SY^2 :: SY \times HZ : SY^2$ (Ex Con. Ham. L. ii. P. xxi.) $:: HZ : SY :: HP : SP$.

TAB. VII. FIG. 57.

101. Velocitates angulares corporum, in orbitis quibuſvis circa centrum commune revolventium, ſunt inter ſe ut areæ datis temporibus deſcriptæ directè, et ut quadrata diſtantiarum inversè. Nam ſi linea perpendicularis QT adeo parva eſſe ſupponatur, ut pro arcu circuli haberi poſſit, erit angulus QSP ut $\frac{QT}{PS}$; eſt autem QT directè ut area trianguli SPQ, et inversè ut altitudo SP, unde angulus QSP eſt ut area illa directè et ut SP^2 inversè.

102. In conicis ſectionibus angulares velocitates ſunt in ſubduplicatâ ratione laterum rectorum principalium directè, et in duplicata ratione diſtantiarum inversè: ſunt enim latera recta principalia in duplicatâ ratione arearum datis temporibus deſcriptarum.

103. Ex his conſequuntur omnia illa quæ in ſeptimâ ſectione Newtonus demonſtravit de corporum aſcenſu et deſcenſu rectilineo, poſito quod vis centripeta ſit reciprocè proportionalis quadrato diſtantiæ a centro virium: Nam eadem omnia, quæ jam demonſtrata ſunt de velocitatibus et temporibus periodicis in conicis ſectionibus, obtinebunt, ſive latitudo orbitæ deſcriptæ major ſit, ſive minor, ſive nulla: et diminuendo latus rectum principale in infinitum, manente axe majori, perimeter ſectionis cum axe, et foci cum axis verticibus ultimo coincidunt. Recta vero in quâ movetur corpus uſurpanda eſt pro ellipſi evaneſcentis latitudinis, ſi velocitas in rectâ illâ ſit ad velocitatem quâ circulus deſcribitur ad eandem diſtantiam in ratione minori quam $\sqrt{2}$ ad 1; pro hyperbolâ autem, ſi in ratione majori; et pro parabolâ, ſi in eâ ipſa ratione.

TAB. VI. FIG. 51.

104. His poſitis, velocitas corporis de loco quovis b verſus centrum S recta deſcendentis, ad altitudinem quamvis SP erit ad velocitatem corporis intervallo SP circulum deſcribentis in ſubduplicatâ ratione bP ad $\frac{1}{2} Sb$. Nam velocitas in conicâ ſectione eſt ſemper ad velocitatem in circulo in ſubduplicatâ ratione diſtantiæ ab altero foco, ad ſemiaxem majorem.

105. Sit $bP = \frac{Sb}{2}$, et erit velocitas acquiſita cadendo per bP æqualis velocitati in circulo. Unde ſi corpus illud ad diſtantiam æqualem $\frac{Sb}{2}$ in circulo revolvens, ſurſum projiciatur eâ cum velocitate quâ circulum deſcribit, aſcendet ad duplam ſuam a centro diſtantiam.

106. Hinc

106. Hinc ſequitur, quòd ſi corpus in ellipſi revolvens, ſurſum projiciatur eâ cum velocitate quâ ellipſin deſcribit, aſcendet ad diſtantiam a centro virium æqualem axi majori. Nam in mediâ diſtantiâ, in quâ velocitas æqualis eſt velocitati in circulo, aſcendet ad duplam a centro diſtantiam; et per Prop. xii. ad eandem ſemper altitudinem aſcendet, ſi a quovis alio puncto orbitæ projiciatur. Idem ſequitur e Corollario 4to. Prob. (85.) nam ſi directio projectionis utcunque mutetur manente velocitate et vi centripetâ ad datam diſtantiam, idem erit axis tranſverſus figuræ, et axis conjugatus erit ut ſinus anguli SPY: evaneſcente hoc ſinu, projiciatur corpus recta a centro, et aſcendet corpus in perimetro ſectionis conicæ evaneſcentis cujus axis tranſverſus idem manet ac prius; hoc eſt recta per quam aſcendit corpus æqualis eſt axi tranſverſo ſectionis.

107. Si velocitas projectionis ea ſit quâ parabola deſcribitur, aſcendet corpus in infinitum, neque unquam redibit.

108. Si velocitas projectionis ea ſit, quæ ſufficeret ad deſcribendam hyperbolam, corpus non modo aſcendet ad altitudinem infinitam, ſed et motus ſui partem aliquam etiam tum retinebit: et velocitas ultima ad altitudinem infinitam erit ad velocitatem in loco quovis P ad finitam altitudinem, ut perpendiculum SY, demiſſum a centro S in tangentem PY, ad perpendiculum demiſſum a centro S in aſymptotum. Tab. VI. Fig. 53.

109. Corporis de loco dato h e quiete cadentis tempus totius deſcenſus ad centrum S dimidium eſt temporis periodici corporis in circulo revolventis ad diſtantiam æqualem $\frac{1}{\sqrt{2}} Sh$. Corpus enim, rectà deſcendens de loco h ad centrum S, deſcribit ſemiperimetrum ellipſeos latitudinis evaneſcentis, et tempus deſcenſus dimidium erit temporis periodici in ellipſi, cujus axis tranſverſus eſt Sh.

110. Hinc ſi orbitas planetarum circulares eſſe ſupponamus, ex datis temporibus periodicis inveniri poſſunt tempora, quibus ad centrum motûs ſui deſcenderent, ſi motu omni revolutionis ſublato, ſolâ vi centripetâ urgerentur. Nam tempus periodicum corporis circulum deſcribentis ad diſtantiam Sh eſt ad tempus periodicum corporis circulum deſcribentis ad diſtantiam $\frac{1}{\sqrt{2}} Sh$ in ſeſquiplicatâ ratione numeri binarii ad unitatem, vel ut $2\frac{3}{4}$ ad 1, vel ut $2 \times \sqrt{2}$ ad 1; unde eſt tempus primum, ad dimidium temporis periodici in circulo ad diſtantiam $\frac{1}{\sqrt{2}} Sh$, vel ad tempus rectilinei deſcenſus uſque ad centrum, ut $4 \times \sqrt{2}$ ad 1. Exempli gratia cum tempus periodicum terræ ſit dierum 365, 2565, et ſit $4 \times \sqrt{2} : 1 :: 365, 2565 : 64, 5699$, tellus noſtra ſpatio dierum 64, 5699 recta ad ſolem caderet. Et ex ſimili ratiocinio patet quod

		die : hor :
Mercurius	in ſolem caderet ſpatio circiter	15 : 13
Venus		39 : 17
Mars		121 : 11
Jupiter		767 : 3
Saturnus		1900 : 4

Planetarum

SECTIO TERTIA.

Planetarum circumjovialium.

		die : hor :
Intimus	in Jovem caderet ſpatio circiter	0 : 7
Secundus		0 : 15
Tertius		1 : 6
Quartus		2 : 23

Planetarum circumſaturniorum.

Intimus	in Saturnum caderet ſpatio circiter	0 : 8
Secundus		0 : 12
Tertius		0 : 19
Quartus		2 : 20
Quintus		14 : 21

Luna in terram caderet ſpatio circiter 4 : 20

Scholium.

Ope horum corollariorum explicare licet alternum aſcenſum et deſcenſum planetæ in orbitâ ſuâ. Abundè quidem a præcedentibus conſtat, corpus juſtâ velocitate projectum, ſimulque vi centripetâ in inverſâ duplicatâ ratione diſtantiæ variante agitatum, deſcribere poſſe orbitam ellipticam focum in centro illo habentem. Quoniam vero huic motui nihil ſimile in corporibus terreſtribus obſervare licet, ob vim projectilem prorſus contemnendam reſpectu ad vim gravitatis in lineis parallelis agentem, quæ citiſſime detrahit corpora omnia in vicinio telluris projecta, permulti profitentur ſe non concipere poſſe, quâ ratione corpus, cum ſemel ad virium centrum deſcendere cœpit, ob eodem iterum aſcendere poteſt. Etenim aiunt, ſi deſcenſus a vi præpollenti gravitatis oriatur, quòd magis rationi et experientiæ quotidianæ foret conſentaneum, ut propter auctam perpetuo vim gravitatis, diſtantiâ diminutâ, corpus ad minores perpetuò diſtantias deſcenderet, donec tandem ad centrum ipſum appellat. Hinc ſane mirantur planetas, cum ſemel a ſole recedere cœpiſſent, iterum quaſi mutato conſilio ad ſolem reverti : cometaſque in rapido ſuo ad ſolem deſcenſu, quando ipſam ſolis ſuperficiem tetigiſſe videntur, quaſi metu percitos in infinitum abire.

Huic vero objectioni facilis eſt reſponſio. Concedimus nimirum hæc omnia accidere debere ſi corpora hæcce in rectis lineis moveantur : contendimus autem corpora omnia in gyros acta vi centrifugâ gaudere ; et hanc vim centrifugam tam celeriter ſæpiſſimè augeri, ut corpora jamjam ad centra ipſa deſcenſura, quaſi repellere potis ſit. Hæc vero paulo accuratius conſideranda ſunt. TAB. VII. FIG. 58. Fingamus corpus motu uniformi in lineâ AP, quæ perpendicularis ducitur lineæ AS, moveri; deſcribatur circulus radio SA, patet hoc corpus cum ad P perventum eſt a centro receſſiſſe ſpatio RP. Sit linea AP quam minima in tempuſculo quodam deſcripta, et vis quâ corpus recedere conatur in puncto A repre-

TAB. VI.




Fig: 51.




Fig: 52




Fig: 53.




Fig: 54.




Fig: 55.




Fig: 56

repreſentabitur per lineam RP: æqualis huic vi ponatur vis centripeta, et corpus hiſce viribus in peripheriâ circuli ſemper retinebitur. Patet ob vim centrifugam vi centripetæ æqualem, corpus ſemper eandem a centro diſtantiam ſervare, vel, quod idem eſt, circulum deſcribere.

Vires autem centripetas atque centrifugas, in circulis ſemper æquales, in eadem ratione ad diverſas diſtantias variari neceſſe eſt ut circuli revera deſcribantur; hoc eſt (per Corol. i. Prop. iv.) in ratione duplicatâ velocitatis directè, et in ſimplici ratione radiorum inverſè; et proinde, datis vi centripetâ et diſtantiâ, inveniri poteſt certa illa et invariabilis velocitas quæ neceſſaria eſt ad corpus in circulo retinendum (34).

Si velocitas igitur corporis projecti, diſtantiâ eâdem manente, minor ſit hâc velocitate circulari, conſpicuum eſt, corpus arcum arcui circulari interiorem deſcribere debere, hoc eſt, ad minorem diſtantiam deſcendere. Si, velocitate et vi iiſdem manentibus, augeatur diſtantia, ex eo quod hæc velocitas minor eſt velocitate quæ requiritur ad corpus in circulo retinendum, corpus iterum arcum quendam arcui circulari interiorem deſcriberet. Eâdem methodo ſequitur, ſi augeretur velocitas, vel minueretur diſtantia, vi centripetâ eadem manente, corpus arcum arcui circulari exteriorem deſcribere; vel quod idem eſt, a centro recedere. Et proinde ex his concludere licet, ſi vis centrifuga ſit æqualis vi centripetæ, corpus in lineâ perpendiculariter ductâ ad diſtantiam projectum, in peripheriâ circuli ſemper retineri; ſi major ſit, a centro recedere; ſi minor, ad centrum accedere debere.

His præmiſſis, perpetuam illam oſcillationem corporis inter apſides orbitæ nullo fere negotio explicare licet, vel poſito quod motus perficiatur in orbitâ ellipticâ circa focum ſecundum hypotheſes in Prop. xiii. ex motus illius naturâ, et ex indole figuræ in quâ perficitur motus, luculenter oſtendere, hunc motum a vi projectili et vi gravitatis in inverſa duplicatâ ratione diſtantiæ variantis oriri poſſe. Fingamus corpus vi projectili et vi gravitatis agitatum circulum deſcribere ad diſtantiam maximam ellipſis, poſito centro virium in umbilico figuræ, et corpus aliud circa idem virium centrum areas temporibus proportionales in ellipſi illâ ex quâcunque demum cauſâ deſcribere. Aberratio corporis projecti a tangente eadem fieri poteſt quæ in eodem tempuſculo in orbita elliptica conficitur, ſi vel augeatur vis gravitatis vel diminuatur vis projectilis. Diminuatur velocitas corporis projecti, donec velocitati corporis alterius in vertice figuræ ellipticæ tandem fiat æqualis; ob legem gravitatis, areaſque a corporibus utriſque deſcriptas æquales, eadem erit utriuſque ſemita, (61) eademque velocitatis variatio. Quoniam vero velocitas in orbitâ ellipticâ creſcit in majori quàm inversâ ſubduplicatâ ratione diſtantiarum; hoc eſt, in majori ratione quam variantur velocitates corporum circulos deſcribentium ad eaſdem diſtantias: velocitas corporis projecti perpetuo ad velocitatem corporis in circulo appropinquabit; quandoque ſemel ad diſtantiam a centro æqualem diſtantiæ mediæ corporis in ellipticâ orbitâ revolventis pervenerit, velocitas ejus velocitati in circulo erit æqualis per Cor. 4. Prop. xviii. Quæret forſan quiſpiam utrum corpus hoc vi projectili et vi gravitatis agitatum, poſtquam ad hanc diſtantiam pervenerit, in circulo jam ferretur vel in orbitâ ellipticâ moveri

SECTIO TERTIA.

perſeveraret. Reſponſio facilis eſt ; perpendenti enim facillime innoteſcit, corpus ob angulum projectionis in hoc loco recto minorem propius ad centrum deſcendere, et ob cauſas prædictas in ellipſi etiamnum retineri : nec ullus conceditur dubitandi locus, utrum ab hâc orbita deflecteret, donec ad diſtantiam minimam perveniat. Poſtquam vero corpus ad diſtantiam æqualem diſtantiæ minimæ in orbitâ ellipticâ pervenerit, velocitas ejus major eſt velocitate quæ requiritur ad corpus in circulo retinendum ; ex eo quod ex naturâ ellipſeos, velocitates corporis ex mediâ ad minimam diſtantiam tranſeuntis celerius creſcunt quam velocitates quæ requiruntur ad corpora in circulis retinenda ad eaſdem diſtantias, modo vires centripetæ ſint diſtantiarum quadratis inverſè proportionales. Patet igitur corpus projectum lineam circulo exteriorem deſcribere. Simili argumento concluditur quod velocitatibus et viribus jam decreſcentibus iiſdem quibus modo creſcebant gradibus, corpus in aſcenſu ſuo in ſemiellipſi ſimili et æquali ei quam in deſcenſu deſcripſerat ferretur et ad diſtantiam priorem rediret, ſicque inter apſides ſuas, ſi non obſtaret medii reſiſtentia, in æternum oſcillaretur.

SECTIO IV.

De corporum ſphæricorum viribus attractivis.

PROOEMIUM.

SECTIO QUARTA.

Ex præcedentibus abunde conſtat gravitationis principium a terræ ſuperficie uſque ad lunam extendi, a primario unoquoque ad ſatellites ſuos, et a centro ſolis ad omnes planetas, cum primarios tum ſecundarios ; et per legem motus tertiam conſequitur hoſce omnes viciſſim in ſolem gravitare : præterea vis, quâcum urgentur, legem determinatam in diverſis diſtantiis obſervat, rationem nempe diſtantiarum a centro duplicatam inverſam.

Priuſquam vero ſyſtema mundanum penitus explicari poſſit planetarumque ſingulorum materiæ quantitates ut et denſitates vireſque gravitationis inveniri ; neceſſe eſt ut pauca quædam de univerſalitate aliiſque hujuſce principii proprietatibus præmittantur. Progredimur igitur oſtenſuri in primo loco vim gravitationum vel motum ab eâ generatum in æqualibus a corpore centrali diſtantiis proportionalem eſſe quantitati materiæ in corpore attracto. Experimentis accuratiſſimè factis invenit Newtonus corpora funependula ejuſdem figuræ atque magnitudinis, diverſæ vero denſitatis aut conſtitutionis internæ, oſcillationes ſuas in temporibus æqualibus peragere, poſitâ nimirum eadem fili longitudine eademque aëris reſiſtentiâ. Et exinde concludit vires motrices vel gravitantes variari in ratione quantitatis materiæ in corpore attracto*. Natura autem gravitatis in planetas eadem eſt atque in terram. Elevari igitur fingantur

* THEOREMA. *Quantitates materiæ in corporibus funependulis, quorum centra oſcillationum a centro ſuſpenſionis æqualiter diſtant, ſunt in ratione compoſitâ ex*

tur corpora terreſtria ad uſque orbem lunæ, unàque cum lunâ motu omni privata demitti, et quoniam in temporibus æqualibus ſpatia æqualia cum lunâ cadendo deſcriberent, quantitates materiæ in iiſdem ſunt ad quantitatem materiæ in lunâ ut pondera eorum ad ipſius pondus. Similiter ſatellites Jovis temporibus revolvuntur quæ ſunt in ratione ſeſquiplicatâ diſtantiarum a Jovis centro; ideoque gravitates eorum acceleratrices ſunt in diverſis a Jovis centro diſtantiis reciproce ut quadrata diſtantiarum, in diſtantiis vero æqualibus æquales: quare corpora quælibet temporibus æqualibus ab altitudinibus æqualibus cadendo ſpatia æqualia deſcriberent perinde ut fit gravibus in terram. — Eodem argumento planetæ circumſolares ab æqualibus a ſole diſtantiis demiſſi deſcenſu ſuo in ſolem ſpatia æqualia in temporibus æqualibus deſcriberent. Pondera igitur eorum ſunt etiam ut quantitates materiæ in ipſis.

Hactenus probavimus vires, quibus corpora diverſa vel planetæ diverſi attrahuntur ab eodem corpore centrali eſſe datis diſtantiis ut quantitates materiæ in corporibus attractis, reſtat probandum vires planetarum diverſorum in æqualia corpora datis diſtantiis exercitas eſſe in ratione quantitatis materiæ in corpore trahente. Cum autem jam antea demonſtratur gravitatem in quemlibet planetam ſeorſim conſideratum eſſe reciprocè ut quadratum diſtantiæ a planetæ iſtius centro patet veritas hujuſce poſitionis ex Newtoni Prop. LXIX. et Cor. ſuis. †

Quoniam vero gravitatio corpora omnia pervadere intelligitur nec variatur ob diverſam ſuperficiei texturam eſtque ſemper in ratione quantitatis materiæ, oritur

ex ratione ponderum et ratione duplicatâ temporum oſcillationum in vacuo.

DEM. Nam velocitas, quam data vis in datâ materia, dato tempore generare poteſt, eſt ut vis et tempus directè, et materia inverſè. Quo major eſt vis, vel majus tempus, vel minor materia, eo major generabitur velocitas. Id quod per motus legem ſecundam manifeſtum eſt. Jam vero ſi pendula ejuſdem ſint longitudinis, vires motrices in locis a perpendiculo æqualiter diſtantibus ſunt ut pondera: ideoque ſi corpora duo oſcillando deſcribant arcus æquales, et arcus illi dividantur in partes æquales; cum tempora quibus corpora deſcribunt ſingulas arcuum partes correſpondentes ſint ut tempora oſcillationum totarum, erunt velocitates ad invicem in correſpondentibus oſcillationum partibus, ut vires motrices et tota oſcillationum tempora directè, et quantitates materiæ reciprocè: ideoque quantitates materiæ ut vires et oſcillationum tempora directè, et velocitates reciprocè. Sed velocitates reciprocè ſunt ut tempora; atque ideo tempora directè et velocitates reciprocè ſunt ut quadrata temporum; et propterea quantitates materiæ ſunt ut vires motrices, et quadrata temporum, id eſt, ut pondera et quadrata temporum. Q. E. D.

Cor. Ideoque ſi tempora ſint æqualia, quantitates materiæ in ſingulis corporibus erunt ut pondera.

† THEOREMA. *In ſyſtemate corporum plurium* A, B, C, D, &c. *ſi corpus aliquod* A *trahit cætera omnia* B, C, D, &c. *viribus acceleratricibus quæ ſunt reciprocè ut quadrata diſtantiarum a trahente; et corpus aliud* B *trahit etiam cætera*

 A, C, D,

SECTIO QUARTA.

oritur gravitatio totius ex gravitatione partium. Exempli gratiâ, pondus montis oritur ex gravitatione partium montis ad tellurem et ex ſummâ gravitationum componitur; et ſimiliter gravitatio telluris ad montem ex ſummâ gravitationum partium telluris ad montem conficitur; extenditur igitur gravitatio pro ratione quantitatis materiæ ſolidæ ad unamquamque materiæ particulam, legeſque quibuſcum particulæ componentes ſe invicem trahunt, datis legibus quibuſcum ſphæræ ex his particulis conflatæ ſeſe attrahunt, jam ſunt explorandæ.

PRO-

A, C, D, *&c. viribus quæ ſunt reciprocè ut quadrata diſtantiarum a trahente: erunt abſolutæ corporum trahentium* A, B *vires ad invicem, ut ſunt ipſa corpora* A, B, *quorum ſunt vires.*

DEM. Nam attractiones acceleratrices corporum omnium *B*, *C*, *D* verſus *A*, paribus diſtantiis, ſibi invicem æquantur ex hypotheſi; et ſimiliter attractiones acceleratrices corporum omnium verſus *B*, paribus diſtantiis, ſibi invicem æquantur. Eſt autem abſoluta vis attractiva corporis *A* ad vim abſolutam attractivam corporis *B*, ut attractio acceleratrix corporum omnium verſus *A* ad attractionem acceleratricem corporum omnium verſus *B*, paribus diſtantiis; et ita eſt attractio acceleratrix corporis *B* verſus *A*, ad attractionem acceleratricem corporis *A* verſus *B*. Sed attractio acceleratrix corporis *B* verſus *A* eſt ad attractionem acceleratricem corporis *A* verſus *B*, ut maſſa corporis *A* ad maſſam corporis *B*; propterea quod vires motrices, quæ ſunt ut vires acceleratrices et corpora attracta conjunctim, hic ſunt (per motus legem tertiam) ſibi invicem æquales. Ergo abſoluta vis attractiva corporis *A* eſt ad abſolutam vim attractivam corporis *B*, ut maſſa corporis *A* ad maſſam corporis *B*. Q. E. D.

Cor. 1. Hinc ſi ſingula ſyſtematis corpora *A*, *B*, *C*, *D*, &c. ſeorſim ſpectata trahant cætera omnia viribus acceleratricibus, quæ ſunt reciprocè ut quadrata diſtantiarum a trahente; erunt corporum illorum omnium vires abſolutæ ad invicem ut ſunt ipſa corpora.

Cor. 2. Eodem argumento, ſi ſingula ſyſtematis corpora *A*, *B*, *C*, *D*, &c. ſeorſim ſpectata trahant cætera omnia viribus acceleratricibus, quæ ſunt vel reciprocè, vel directè in ratione dignitatis cujuſcunque diſtantiarum a trahente, quæve ſecundum legem quamcunque communem ex diſtantiis ab unoquoque trahente definiuntur; conſtat quod corporum illorum vires abſolutæ ſunt ut corpora.

PROPOSITIO XIX. THEOREMA XI.

SECTIO QUARTA.

Si ad ſphæricæ ſuperficiei puncta ſingula tendant vires æquales centripetæ decreſcentes in duplicata ratione diſtantiarum a punctis: dico quod corpuſculum intra ſuperficiem conſtitutum his viribus nullam in partem attrahitur.

TAB. VII. FIG. 59.

Sit *HIKL* ſuperficies illa ſphærica, et *P* corpuſculum intus conſtitutum. Per *P* agantur ad hanc ſuperficiem lineæ duæ *HK*, *IL*, arcus quam minimos *HI*, *KL* intercipientes; et, ob triangula *HPI*, *LPK* (per corol. 3. lem. VII.] ſimilia, arcus illi erunt diſtantiis *HP*, *LP* proportionales; et ſuperficiei ſphæricæ particulæ quævis ad *HI* et *KL*, rectis per punctum *P* tranſeuntibus undique terminatæ, erunt in duplicata illa ratione. Ergo vires harum particularum in corpus *P* exercitæ ſunt inter ſe æquales. Sunt enim ut particulæ directe, et quadrata diſtantiarum inverſe. Et hæ duæ rationes componunt rationem æqualitatis. Attractiones igitur, in contrarias partes æqualiter factæ, ſe mutuo deſtruunt. Et ſimili argumento, attractiones omnes per totam ſphæricam ſuperficiem a contrariis attractionibus deſtruuntur. Proinde corpus *P* nullam in partem his attractionibus impellitur. Q.E.D.

PROPOSITIO XX. THEOREMA XII.

Iiſdem poſitis, dico quod corpuſculum extra ſphæricam ſuperficiem conſtitutum attrahitur ad centrum ſphæræ, vi reciproce proportionali quadrato diſtantiæ ſuæ ab eodem centro.

TAB. VII. FIG. 60.

Sint *AHKB*, *ahkb* æquales duæ ſuperficies ſphæricæ, centris *S*, *s*, diametris *AB*, *ab* deſcriptæ, et *P*, *p* corpuſcula ſita extrinſecus in diametris illis productis. Agantur a corpuſculis lineæ *PHK*,

SECTIO QUARTA.

PHK, *PIL*, *phk*, *pil*, auferentes a circulis maximis *AHB*, *ahb*, æquales arcus *HK*, *hk* et *IL*, *il*: Et ad eas demittantur perpendicula *SD*, *sd*; *SE*, *se*; *IR*, *ir*; quorum *SD*, *sd* ſecent *PL*, *pl* in *F* et *f*: Demittantur etiam ad diametros perpendicula *IQ*, *iq*. Evaneſcant anguli *DPE*, *dpe*: et ob æquales *DS* et *ds*, *ES* et *es*, lineæ *PE*, *PF* et *pe*, *pf* et lineola *DF*, *df* pro æqualibus habeantur; quippe quarum ratio ultima, angulis illis *DPE*, *dpe* ſimul evaneſcentibus, eſt æqualitatis. His itaque conſtitutis, erit *PI* ad *PF* ut *RI* ad *DF*, et *pf* ad *pi* ut *df* vel *DF* ad *ri*; et ex æquo *PI* × *pf* ad *PF* × *pi* ut *RI* ad *ri*, hoc eſt (per corol. 3. lem. VII.) ut arcus *IH* ad arcum *ih*. Rurſus *PI* ad *PS* ut *IQ* ad *SE*, et *ps* ad *pi* ut *se* vel *SE* ad *iq*; et ex æquo *PI* × *ps* ad *PS* × *pi* ut *IQ* ad *iq*. Et conjunctis rationibus *PI quad.* × *pf* × *ps* ad *pi quad.* × *PF* × *PS*, ut *IH* × *IQ* ad *ih* × *iq*; hoc eſt, ut ſuperficies circularis, quam arcus *IH* convolutione ſemicirculi *AKB* circa diametrum *AB* deſcribet, ad ſuperficiem circularem quam arcus *ih* convolutione ſemicirculi *akb* circa diametrum *ab* deſcribet. Et vires, quibus hæ ſuperficies ſecundum lineas ad ſe tendentes attrahunt corpuſcula *P* et *p*, ſunt (per hypotheſin) ut ipſæ ſuperficies directe, et quadrata diſtantiarum ſuperficierum a corporibus inverſe, hoc eſt, ut *pf* × *ps* ad *PF* × *PS*. Suntque hæ vires ad ipſarum partes obliquas, quæ (facta per legum corol. 2. reſolutione virium) ſecundum lineas *PS*, *ps* ad centra tendunt, ut *PI* ad *PQ*, et *pi* ad *pq*; id eſt (ob ſimilia triangula *PIQ* et *PSF*, *piq* et *psf*) ut *PS* ad *PF* et *ps* ad *pf*. Unde, ex æquo, fit attractio corpuſculi hujus *P* verſus *S* ad attractionem corpuſculi *p* verſus *s*, ut $\frac{PF \times pf \times ps}{PS}$ ad $\frac{pf \times PF \times PS}{ps}$, hoc eſt, ut *ps quad.* ad *PS quad.* Et ſimili argumento vires, quibus ſuperficies convolutione arcuum *KL*, *kl* deſcriptæ trahunt corpuſcula, erunt ut *ps quad.* ad *PS quad.* inque eadem ratione erunt vires ſuperficierum omnium circularium in quas utraque ſuperficies ſphærica, capiendo ſemper *sd* æqualem *SD* et *se* æqualem *SE*, diſtingui poteſt. Et per compoſitionem, vires totarum ſuperficierum ſphæricarum in corpuſcula exercitæ erunt in eadem ratione. Q. E. D.

PRO-

PROPOSITIO XXI. THEOREMA XIII.

SECTIO QUARTA.

Si ad ſphæræ cujuſvis puncta ſingula tendant vires æquales centripetæ decreſcentes in duplicata ratione diſtantiarum a punctis; ac detur tum ſphæræ denſitas, tum ratio diametri ſphæræ ad diſtantiam corpuſculi a centro ejus: dico quod vis, qua corpuſculum attrahitur, proportionalis erit ſemidiametro ſphæræ.

Nam concipe corpuſcula duo ſeorſim a ſphæris duabus attrahi, unum ab una et alterum ab altera, et diſtantias eorum a ſphærarum centris proportionales eſſe diametris ſphærarum reſpective, ſphæras autem reſolvi in particulas ſimiles et ſimiliter poſitas ad corpuſcula. Et attractiones corpuſculi unius, factæ verſus ſingulas particulas ſphæræ unius, erunt ad attractiones alterius verſus analogas totidem particulas ſphæræ alterius, in ratione compoſita ex ratione particularum directe et ratione duplicata diſtantiarum inverſe ([h]). Sed particulæ ſunt ut ſphæræ, hoc eſt, in ratione triplicata diametrorum, et diſtantiæ ſunt ut diametri; et ratio prior directe una cum ratione poſteriore bis inverſe eſt ratio diametri ad diametrum, Q. E. D.

Corol. 1. Hinc ſi corpuſcula in circulis, circa ſphæras ex materia æqualiter attractiva conſtantes, revolvantur; ſintque diſtantiæ a centris ſphærarum proportionales earundem diametris: Tempora periodica erunt æqualia.

Corol. 2. Et vice verſa, ſi tempora periodica ſunt æqualia; diſtantiæ erunt proportionales diametris. Conſtant hæc duo per corol. 3. prop. IV.

Corol. 3.

([h]) III. Corpuſculum extra ſphæricam ſuperficiem, cujus puncta ſingula vi tali centripetâ urgentur conſtitutum, attrahitur ad centrum vi quadrato diſtantiæ ab eodem centro proportionali per prop. ultimam; concipe igitur ſphæras haſce duas ex ſuperficiebus ſphæricis et concentricis conflatas et patet veritas poſitionis.

SECTIO QUARTA.

Corol. 3. Si ad ſolidorum duorum quorumvis, ſimilium et æqualiter denſorum, puncta ſingula tendant vires æquales centripetæ, decreſcentes in duplicata ratione diſtantiarum a punctis; vires, quibus corpuſcula, ad ſolida illa duo ſimiliter ſita, attrahentur ab iiſdem, erunt ad invicem ut diametri ſolidorum ([i]).

([i]) 112. Vires quibus corpuſcula ad ſimilia et homogenea quævis ſolida ſimiliter poſita attrahuntur, ſunt ut diſtantiæ corpuſculorum a punctis quibuſvis ſimiliter poſitis, vel ut ſolidorum latera quævis homologa; poſito quòd ad ſolidorum puncta ſingula tendant vires æquales centripetæ decreſcentes in duplicatâ ratione diſtantiarum a punctis.

TAB. VII. FIG. 61.

DEM. Reſolvi concipiantur ſimilia ſolida in ſimiles conos $PKLP$, $PHIP$; vel in ſimilia conorum fruſta quorum vertices ſunt in corpuſculo P; et ſint baſes eorum KL, HI ſuperficies ſphæricæ quarum centra ſunt in P: erunt vires ſimilium et concentricarum quarumvis ſuperficierum KL, MN in corpuſculum P exercitæ inter ſe æquales; ſunt enim ut ſuperficies illæ directè, et quadrata diſtantiarum inversè; vel ut PK^2 ad PM^2 directè, et PK^2 ad PM^2 inversè; quæ rationes componunt rationem æqualitatis. Totæ igitur vires ſimilium ſolidorum $PKLP$, $PHIP$ erunt ut vis illa data ſuperficiei cujuſvis MN, et ut numerus ſuperficierum, ex quibus ſolida ultimò conſtant, vel ut PK ad PH. Patet etiam attractionem fruſti cujuſvis $MKLN$ eſſe ut MK. Et idem obtinet in ſimilibus quibuſvis ſolidis, quæ ex ſimilibus conis, vel ſimilibus conorum fruſtis, ultimò componi intelliguntur.

113. *Cor.* Sit PH æqualis HK, erit vis quâ corpuſculum P verſus conum $PHIP$ attrahitur, æqualis vi verſus fruſtum $HKLI$. Unde patet, quod ſi vires particularum, ex quibus corpus trahens componitur, decreſcant in receſſu corpuſculi attracti in duplicatâ ratione diſtantiarum, attractio non multò fortior erit in contactu, quàm cum attrahens et attractum parvo intervallo ſeparantur ab invicem.

TAB. VII. FIG. 62.

114. Iiſdem poſitis corpuſculum intra ſolidum genitum ex revolutione annularis ſpatii a duabus ſimilibus et concentricis ellipſibus $HIKL$, $hikl$ terminati, nullam in partem attrahitur.

DEM. Sit enim P corpuſculum intra ſolidum conſtitutum, et IPL recta per P tranſiens, et occurrens externæ ſuperficiei in punctis I, L; internæ vero in i, l: intelligatur linea IL bifariam ſecari in z, et ob ſimiles ſimiliterque poſitas figuras il bifariam etiam ſecetur in z, et proinde eſt Ii æqualis Ll. Vires autem quibus corpuſculum P attrahitur ad oppoſita ſolidi fruſta $IihH$, $KklL$, quæ inter eaſdem rectas lineas IPL, HPK per P tranſeuntes continentur, erunt (112) ut Ii ad Ll, hoc eſt in ratione æqualitatis: et ſimili argumento attractiones omnes per totum ſolidum a contrariis attractionibus deſtruuntur.

PRO-

PROPOSITIO XXII. THEOREMA XIV.

SECTIO QUARTA.

Si ad ſphæræ alicujus datæ puncta ſingula tendant æquales vires centripetæ decreſcentes in duplicata ratione diſtantiarum a punctis: dico quod corpuſculum intra ſphæram conſtitutum attrahitur vi proportionali diſtantiæ ſuæ ab ipſius centro.

In ſphæra *ABCD*, centro *S* deſcripta, locetur corpuſculum *P*; et centro eodem *S*, intervallo *SP*, concipe ſphæram interiorem *PEQF* deſcribi. Manifeſtum eſt, (per prop. XIX.) quod ſphæricæ ſuperficies concentricæ, ex quibus ſphærarum differentia *AEBF* componitur, attractionibus ſuis per attractiones contrarias deſtructis, nil agunt in corpus *P*. Reſtat ſola attractio ſphæræ interioris *PEQF*. Et (per prop. XXI.) hæc eſt ut diſtantia *PS* ([k]). Q.E.D.

TAB. VII. FIG. 63.

Scholium.

Superficies, ex quibus ſolida componuntur, hic non ſunt pure mathematicæ, ſed orbes adeo tenues, ut eorum craſſitudo inſtar nihili ſit; nimirum orbes evaneſcentes, ex quibus ſphæra ultimo conſtat, ubi orbium illorum numerus augetur et craſſitudo minuitur

([k]) 115. Poſitis quæ in fig. 62. vis, quâ corpuſculum *p* intra ſpheroidem in ſemidiametro *CQ* conſtitutum ad totum ſolidum attrahitur, eſt ad vim corpuſculi *Q* in eadem ſemidiametro, ut diſtantia *Cp* ad *CQ*.

DEM. Centro enim *C* ſemidiametro *Cp* deſcribi concipiatur ſphærois interior *hipkl* ipſi *HIQKL* ſimilis; attractiones exterioris ſolidi annularis contrariis attractionibus deſtructæ, nihil agunt in corpuſculum *p*; vires autem quibus attrahuntur corpuſcula *p*, *Q*, verſus ſolida *hikl*, *HIKL*, ſunt ut lineæ quævis homologæ in his ſolidis (112), vel ut *Cp* ad *CQ*.

116. Si igitur ſphæra vel ſphærois hujuſmodi per centrum perforetur, corpora ex diverſis a centro ſphæræ diſtantiis in eodem tempore ad centrum pervenirent; et præterea, corpus per foramen tale libere decidens per centrum tranſiret, et in aſcenſu ſuo viribus iiſdem, a quibus deſcendens accelerabatur, retardatum, oſcillationes perageret more penduli in arcu cycloidis moti.

SECTIO QUARTA.

tur in infinitum. Similiter per puncta, ex quibus lineæ, ſuperficies, et ſolida componi dicuntur, intelligendæ ſunt particulæ æquales magnitudinis contemnendæ.

PROPOSITIO XXIII. THEOREMA XV.

Iiſdem poſitis, dico quod corpuſculum extra ſphæram conſtitutum attrahitur vi reciproce proportionali quadrato diſtantiæ ſuæ ab ipſius centro.

Nam diſtinguatur ſphæra in ſuperficies ſphæricas innumeras concentricas, et attractiones corpuſculi a ſingulis ſuperficiebus oriundæ erunt reciproce proportionales quadrato diſtantiæ corpuſculi a centro (per prop. XX.) Et componendo fiet ſumma attractionum, hoc eſt attractio corpuſculi in ſphæram totam, in eadem ratione. Q. E. D.

Corol. 1. Hinc in æqualibus diſtantiis a centris homogenearum ſphærarum attractiones ſunt ut ſphæræ. Nam (per prop. XXI.) ſi diſtantiæ ſunt proportionales diametris ſphærarum, vires erunt ut diametri. Minuatur diſtantia major in illa ratione; et, diſtantiis jam factis æqualibus, augebitur attractio in duplicata illa ratione; ideoque erit ad attractionem alteram in triplicata illa ratione, hoc eſt, in ratione ſphærarum.

Corol. 2. In diſtantiis quibuſvis attractiones ſunt ut ſphæræ applicatæ ad quadrata diſtantiarum.

Corol. 3. Si corpuſculum, extra ſphæram homogeneam poſitum, trahatur vi reciproce proportionali quadrato diſtantiæ ſuæ ab ipſius centro, conſtet autem ſphæra ex particulis attractivis; decreſcet vis particulæ cujuſque in duplicata ratione diſtantiæ a particula ([1]).

PRO-

([1]) 117. Hinc colligere licet particulas ex quibus conflantur corpora ſolis, telluris, planetarumque ſingulorum cum primariorum tum ſecundariorum, ſe invicem attrahere vi diſtantiarum ſuarum quadratis reciprocè proportionali. In propoſitionibus noviſſimis demonſtravit Newtonus ſphæras a particulis conflatas ſe invicem trahentibus in inverſâ duplicatâ ratione diſtantiæ ſe invicem trahere

SECTIO QUARTA.

PROPOSITIO XXIV. THEOREMA XVI.

Si ad ſphæræ datæ puncta ſingula tendant vires æquales centripetæ, decreſcentes in duplicata ratione diſtantiarum a punctis; dico quod ſphæra quævis alia ſimilaris ab eadem attrahitur vi reciproce proportionali quadrato diſtantiæ centrorum.

Nam particulæ cujuſvis attractio eſt reciproce ut quadratum diſtantiæ ſuæ a centro ſphæræ trahentis, (per prop. XXIII.) et propterea eadem eſt, ac ſi vis tota attrahens manaret de corpuſculo unico ſito in centro hujus ſphæræ. Hæc autem attractio tanta eſt, quanta foret viciſſim attractio corpuſculi ejuſdem, ſi modo illud a ſingulis ſphæræ attractæ particulis eadem vi traheretur, qua ipſas attrahit. Foret autem illa corpuſculi attractio (per prop. XXIII.) reciproce proportionalis quadrato diſtantiæ ſuæ a centro ſphæræ; ideoque huic æqualis attractio ſphæræ eſt in eadem ratione. Q. E. D.

Corol. 1. Attractiones ſphærarum, verſus alias ſphæras homogeneas, ſunt ut ſphæræ trahentes applicatæ ad quadrata diſtantiarum centrorum ſuorum a centris earum, quas attrahunt.

Corol. 2. Idem valet, ubi ſphæra attracta etiam attrahit. Namque hujus puncta ſingula trahent ſingula alterius eadem vi, quâ ab

here ſecundum legem eandem. Si igitur poſitâ hâc lege attractionis ſphærarum particulæ ipſæ ſe invicem non traherent ſecundum hanc legem fingatur quævis alia attractionis lex, et ratiocinia Newtoni uſurpando luculenter conſtabit quod particula extra ſuperficiem ſphæricam vel ſphæram conſtituta non attrahetur in inversâ duplicata ratione diſtantiæ. Quoniam igitur vires quibus attrahuntur particulæ in diverſis diſtantiis a ſole vel quolibet planetâ ſunt inter ſe inverſe ut diſtantiarum quadrata a corpore attrahente, patet a præcedentibus particulam unamquamque et in ſole et in unoquoque planeta vi propria attractionis gaudere ita ut unumquodque corpuſculum in ſyſtemate mundano alia quæcunque attrahat vi diſtantiarum quadrato reciproce proportionali.

SECTIO QUARTA.

ab ipſis viciſſim trahuntur; ideoque cum in omni attractione urgeatur (per legem 3.) tam punctum attrahens, quam punctum attractum, geminabitur vis attractionis mutuæ, conſervatis proportionibus.

Corol. 3. Eadem omnia, quæ ſuperius de motu corporum circa umbilicum conicarum ſectionum demonſtrata ſunt, obtinent, ubi ſphæra attrahens locatur in umbilico, et corpora moventur extra ſphæram.

Corol. 4. Ea vero, quæ de motu corporum circa centrum conicarum ſectionum demonſtrantur, obtinent ubi motus peraguntur intra ſphæram.

PROPOSITIO XXV. THEOREMA XVII.

Si ſphæræ in progreſſu a centro ad circumferentiam (quoad materiæ denſitatem et vim attractivam) utcunque diſſimilares, in progreſſu vero per circuitum ad datam omnem a centro diſtantiam ſunt undique ſimilares; et vis attractiva puncti cujuſque decreſcit in duplicata ratione diſtantiæ corporis attracti: dico quod vis tota, qua hujuſmodi ſphæra una attrahit aliam, ſit reciproce proportionalis quadrato diſtantiæ centrorum.

TAB. VII. FIG. 64.

Sunto ſphæræ quotcunque concentricæ ſimilares *AB*, *CD*, *EF*, &c. quarum interiores additæ exterioribus componant materiam denſiorem verſus centrum, vel ſubductæ relinquant tenuiorem; et hæ (per prop. XXIV.) trahent ſphæras alias quotcunque concentricas ſimilares *GH*, *IK*, *LM*, &c. ſingulæ ſingulas, viribus reciproce proportionalibus quadrato diſtantiæ *SP*. Et componendo vel dividendo, ſumma virium illarum omnium, vel exceſſus aliquarum ſupra alias; hoc eſt, vis, qua ſphæra tota, ex concentricis quibuſcunque vel concentricarum differentiis compoſita *AB*, trahit

bit totam ex concentricis quibuſcunque vel concentricarum differentiis compoſitam GH; erit in eadem ratione. Augeatur numerus ſphærarum concentricarum in infinitum ſic, ut materiæ denſitas una cum vi attractiva, in progreſſu a circumferentia ad centrum, ſecundum legem quamcunque creſcat vel decreſcat; et, addita materia non attractiva, compleatur ubivis denſitas deficiens, eo ut ſphæræ acquirant formam quamvis optatam; et vis, qua harum una attrahet alteram, erit etiamnum, per argumentum ſuperius, in eadem illa diſtantiæ quadratæ ratione inverſa. Q. E. D.

Corol. 1. Hinc ſi ejuſmodi ſphæræ complures, ſibi invicem per omnia ſimiles, ſe mutuo trahant; attractiones acceleratrices ſingularum in ſingulas erunt, in æqualibus quibuſvis centrorum diſtantiis, ut ſphæræ attrahentes.

Corol. 2. Inque diſtantiis quibuſvis inæqualibus, ut ſphæræ attrahentes applicatæ ad quadrata diſtantiarum inter centra.

Corol. 3. Attractiones vero motrices, ſeu pondera ſphærarum in ſphæras erunt, in æqualibus centrorum diſtantiis, ut ſphæræ attrahentes et attractæ conjunctim, id eſt, ut contenta ſub ſphæris per multiplicationem producta.

Corol. 4. Inque diſtantiis inæqualibus, ut contenta illa directe et quadrata diſtantiarum inter centra inverſe.

Corol. 5. Eadem valent, ubi attractio oritur a ſphæræ utriuſque virtute attractiva mutuo exercita in ſphæram alteram. Nam viribus ambabus geminatur attractio, proportione ſervata.

Corol. 6. Si hujuſmodi ſphæræ aliquæ circa alias quieſcentes revolvantur, ſingulæ circa ſingulas; ſintque diſtantiæ inter centra revolventium et quieſcentium proportionales quieſcentium diametris; æqualia erunt tempora periodica.

Corol. 7. Et viciſſim, ſi tempora periodica ſunt æqualia; diſtantiæ erunt proportionales diametris.

Corol. 8. Eadem omnia, quæ ſuperius de motu corporum circa umbilicos conicarum ſectionum demonſtrata ſunt, obtinent; ubi ſphæra attrahens, formæ et conditionis cujuſvis jam deſcriptæ, locatur in umbilico.

Corol. 9.

SECTIO QUARTA.

Corol. 9. Ut et ubi gyrantia ſunt etiam ſphæræ attrahentes, conditionis cujuſvis jam deſcriptæ ([m]).

PRO-

([m]) 118. Ope propoſitionum præcedentium inveniri et inter ſe comparari poſſunt pondera corporum in diverſos planetos. Pondera enim corporum æqualium circum planetas in circulis revolventium ſunt (per Cor. 2. prop. IV.) ut diametri circulorum directè et quadrata temporum periodicorum inverſè; pondera autem ad ſuperficies planetarum aliaſve quaſvis a centro diſtantias majora ſunt vel minora (per hanc prop.) in duplicatâ ratione diſtantiarum inverſè. Computum ſic ineundo invenit Newtonus pondera æqualium corporum in ſolis, jovis, ſaturni, ac terræ ſuperficiebus eſſe ut 10000, 943, 529 et 435 reſpectivè.

119. *Cor.* 2. Innoteſcit etiam quantitas materiæ in planetis ſingulis; Nam quantitates materiæ in planetis ſunt ut eorum vires in æqualibus diſtantiis ab eorum centris; id eſt in ſole, jove, ſaturno, ac terra ut $1, \frac{1}{1067}, \frac{1}{3021}$, et $\frac{1}{169282}$, reſpectivè.

120. *Cor.* 3. Innoteſcunt etiam denſitates planetarum. Nam pondera corporum æqualium et homogeneorum in ſphæras homogeneas ſunt in ſuperficiebus ſphærarum ut ſphærarum diametri per prop. XXI, ideoque ſpærarum heterogenearum denſitates ſunt ut pondera illa ad ſphærarum diametros applicata. Denſitates ſolis, jovis, ſaturni, ac terræ, ſunt ut 100, 94 $\frac{1}{2}$, 67 et 400. Eſt igitur ſol paulo denſior quàm jupiter, et jupiter quam ſaturnus, et terra quadruplò denſior quam ſol.

121. *Cor.* 4. Denſiores igitur ſunt planetæ qui ſunt minores, cæteris paribus. Sic enim vis gravitatis in eorum ſuperficiebus ad æqualitatem magis accedit. Sed et denſiores ſunt planetæ, cæteris paribus, qui ſunt ſoli propriores; ut jupiter ſaturno, et terra jove. In diverſis utique diſtantiis a ſole collocandi erant planetæ, ut quilibet pro gradu denſitatis calore ſolis majore vel minore frueretur. Aqua noſtra ſi terra locaretur in orbe ſaturni rigeſceret, ſi in orbe mercurii in vapores ſtatim abieret. Eſt enim lux ſolis, cui calor proportionalis eſt, ſeptuplo denſior in orbe mercurii quam apud nos, et ſeptuplo ſolis æſtivi calore aqua ebullit. Dubium vero non eſt quin materia mercurii ad calorem accomodetur, et propterea denſior ſit hâc noſtrâ, cum materia omnis denſior ad operationes naturales obeundas majorem calorem requirat.

122. *Cor.* 5. Gravitas pergendo a ſuperficiebus planetarum deorſum decreſcit in ratione diſtantiarum a centro quam proxime. Si enim materia uniformis eſſet obtineret hæc proportio accuratè per prop. XXII. Error igitur tantus eſt quantus ab inæquabili denſitate oriri poſſit.

PROPOSITIO XXVI. THEOREMA XVIII.

SECTIO QUARTA.

Si ad ſingula ſphærarum puncta tendant vires centripetæ proportionales diſtantiis punctorum a corporibus attractis: dico quod vis compoſita, qua ſphæræ duæ ſe mutuo trahent, eſt ut diſtantia inter centra ſphærarum.

Caſ. 1. Sit *AEBF* ſphæra; *S* centrum ejus; *P* corpuſculum attractum, *PASB* axis ſphæræ per centrum corpuſculi tranſiens; *EF*, *ef* plana duo, quibus ſphæra ſecatur, huic axi perpendicularia, et hinc inde æqualiter diſtantia a centro ſphæræ; *G*, *g* interſectiones planorum et axis; et *H* punctum quodvis in plano *EF*. Puncti *H* vis centripeta in corpuſculum *P*, ſecundum lineam *PH* exercita, eſt ut diſtantia *PH*; et (per legum corol. 2.) ſecundum lineam *PG*, ſeu verſus centrum *S*, ut longitudo *PG*. Igitur punctorum omnium in plano *EF*, hoc eſt plani totius vis, qua corpuſculum *P* trahitur verſus centrum *S*, eſt ut diſtantia *PG* multiplicata per numerum punctorum, id eſt, ut ſolidum quod continetur ſub plano ipſo *EF* et diſtantia illa *PG*. Et ſimiliter vis plani *ef*, qua corpuſculum *P* trahitur verſus centrum *S*, eſt ut planum illud ductum in diſtantiam ſuam *Pg*, ſive ut huic æquale planum *EF* ductum in diſtantiam illam *Pg*; et ſumma virium plani utriuſque ut planum *EF* ductum in ſummam diſtantiarum *PG* + *Pg*, id eſt, ut planum illud ductum in duplam centri et corpuſculi diſtantiam *PS*, hoc eſt, ut duplum planum *EF* ductum in diſtantiam *PS*, vel ut ſumma æqualium planorum *EF* + *ef* ducta in diſtantiam eandem. Et ſimili argumento, vires omnium planorum in ſphæra tota, hinc inde æqualiter a centro ſphæræ diſtantium, ſunt ut ſumma planorum ducta in diſtantiam *PS*, hoc eſt, ut ſphæra tota et ut diſtantia *PS* conjunctim. Q. E. D.

TAB. VII. FIG. 65.

Caſ. 2. Trahat jam corpuſculum *P* ſphæram *AEBF*. Et eodem argumento probabitur quod vis, qua ſphæra illa trahitur, erit ut diſtantia *PS*. Q. E. D.

Caſ. 3.

SECTIO QUARTA.

Caſ. 3. Componatur jam ſphæra altera ex corpuſculis innumeris P; et quoniam vis, qua corpuſculum unumquodque trahitur, eſt ut diſtantia corpuſculi a centro ſphæræ primæ et ut ſphæra eadem conjunctim, atque ideo eadem eſt, ac ſi prodiret tota de corpuſculo unico in centro ſphæræ; vis tota, qua corpuſcula omnia in ſphæra ſecunda trahuntur, hoc eſt, qua ſphæra illa tota trahitur, eadem erit, ac ſi ſphæra illa traheretur vi prodeunte de corpuſculo unico in centro ſphæræ primæ, et propterea proportionalis eſt diſtantiæ inter centra ſphærarum. Q. E. D.

Caſ. 4. Trahant ſphæræ ſe mutuo, et vis geminata proportionem priorem ſervabit. Q. E. D.

TAB. VII. FIG. 66.

Caſ. 5. Locetur jam corpuſculum p intra ſphæram $AEBF$; et quoniam vis plani ef in corpuſculum eſt ut ſolidum contentum ſub plano illo et diſtantia pg; et vis contraria plani EF ut ſolidum contentum ſub plano illo et diſtantia pG; erit vis ex utraque compoſita ut differentia ſolidorum, hoc eſt, ut ſumma æqualium planorum ducta in ſemiſſem differentiæ diſtantiarum, id eſt, ut ſumma illa ducta in pS diſtantiam corpuſculi a centro ſphæræ. Et ſimili argumento, attractio planorum omnium EF, ef in ſphæra tota, hoc eſt, attractio ſphæræ totius, eſt conjunctim ut ſumma planorum omnium, ſeu ſphæra tota, et ut pS diſtantia corpuſculi a centro ſphæræ. Q. E. D.

Caſ. 6. Et ſi ex corpuſculis innumeris p componatur ſphæra nova, intra ſphæram priorem $AEBF$ ſita; probabitur ut prius quod attractio, ſive ſimplex ſphæræ unius in alteram, ſive mutua utriuſque in ſe invicem, erit ut diſtantia centrorum pS. Q. E. D.

PRO-




Fig. 57




Fig. 58




Fig. 59




Fig. 60




Fig. 61




Fig. 63




Fig. 64




Fig. 62




Fig. 66




Fig. 64




Fig. 65

PROPOSITIO XXVII. THEOREMA XIX.

Si ſphæræ in progreſſu a centro ad circumferentiam ſint utcunque diſſimilares et inæquabiles, in progreſſu vero per circuitum ad datam omnem a centro diſtantiam ſint undique ſimilares; et vis attractiva puncti cujuſque ſit ut diſtantia corporis attracti: dico quod vis tota qua hujuſmodi ſphæræ duæ ſe mutuo trahunt ſit proportionalis diſtantiæ inter centra ſphærarum.

Demonſtratur ex propoſitione præcedente eodem modo, quo propoſitio XXV. ex propoſitione XXIV. demonſtrata fuit.

Corol. Quæ ſuperius de motu corporum circa centra conicarum ſectionum demonſtrata ſunt, valent ubi attractiones omnes fiunt vi corporum ſphæricorum conditionis jam deſcriptæ, et attracta corpora ſunt ſphæræ conditionis ejuſdem.

SECTIO QUINTA.

SECTIO V.

De motu corporum in orbibus mobilibus, deque motu apſidum.

PROPOSITIO XXVIII. PROBLEMA IX.

Efficiendum eſt ut corpus in trajectoria quacunque circa centrum virium revolvente perinde moveri poſſit, atque corpus aliud in eadem trajectoria quieſcente.

TAB. VIII. FIG. 67.

In orbe VPK poſitione dato revolvatur corpus P pergendo a V verſus K. A centro C agatur ſemper Cp, quæ ſit ipſi CP æqualis, angulumque VCp angulo VCP proportionalem conſtituat; et area, quam linea Cp deſcribit, erit ad aream VCP, quam linea CP ſimul deſcribit, ut velocitas lineæ deſcribentis Cp ad velocitatem lineæ deſcribentis CP; hoc eſt, ut angulus VCp ad angulum VCP, ([n]) ideoque in data ratione, et propterea tempori proportionalis. Cum area tempori proportionalis ſit quam linea Cp in plano immobili deſcribit, manifeſtum eſt quod corpus, cogente juſtæ quantitatis vi centripeta, revolvi poſſit una cum puncto p in curva illa linea quam punctum idem p ratione jam expoſita deſcribit in plano immobili. Fiat angulus VCu angulo PCp, et linea Cu lineæ CV, atque figura uCp figuræ VCP æqualis, et corpus in p ſemper exiſtens movebitur in perimetro figuræ revolventis uCp, eodemque tempore deſcribet arcum ejus up quo corpus aliud P arcum ipſi ſimilem et æqualem VP in figura quieſcente VPK deſcri-

([n]) 123. Si trianguli ABC duo latera AB, AC ſint æqualia duobus lateribus ab, ac trianguli abc; erunt areæ triangulorum ut ſinus angulorum intermediorum. Demiſſis enim perpendiculis BD, bd, areæ eorum ſunt ut $AC \times BD$ ad $ac \times bd$, vel ut BD ad bd; id eſt, poſito AB aut ab pro radio, ut ſinus anguli BAD ad ſinum anguli bad.

TAB. VIII. FIG. 68.

Si igitur ſit angulus $VCp : VCP :: G : F$, et $VCq : VC\mathcal{Q} :: G : F$, eſt pCq ad $PC\mathcal{Q}$ in eadem ratione. Sed $PC = pC$, et $\mathcal{Q}C = qC$; ergo area trianguli pCq eſt in ſtatu naſcenti ad aream trianguli $PC\mathcal{Q}$, ut G ad F, vel in eadem datâ ratione.

deſcribere poteſt. Quæratur igitur, per corollarium quintum propoſitionis V, vis centripeta qua corpus revolvi poſſit in curva illa linea quam punctum *p* deſcribit in plano immobili, et ſolvetur problema. (°) Q. E. F.

SECTIO QUINTA.

PROPOSITIO XXIX. THEOREMA XX.

Differentia virium, quibus corpus in orbe quieſcente, et corpus aliud in eodem orbe revolvente æqualiter moveri poſſunt, eſt in triplicata ratione communis altitudinis inverſe.

Partibus orbis quieſcentis *VP*, *PK* ſunto ſimiles et æquales orbis revolventis partes *up*, *pk*; et punctorum *P*, *K* diſtantia intelligatur eſſe quam minima. A puncto *k* in rectam *pC* demitte perpendiculm *kr*, idemque produc ad *m*, ut ſit *mr* ad *kr* ut angulus *VCp* ad angulum *VCP*. Quoniam corporum altitudines *PC* et *pC*,

TAB. VIII. FIG. 69.

(°) 124. Fingatur corpus in trajectoriâ quâcunque revolvi vi tendente ad immobile punctum, areaſque tempori proportionales deſcribere; in hoc caſu angularis velocitas radii vectoris in inversâ duplicatâ ratione diſtantiæ variabitur (101). Ut vero ea quæ ſequuntur facilius concipiantur, ponamus ſemitam corporis *VPK* rigeſcere, vel motum eundem confici in linea phyſicâ craſſitudinis contemnendæ, interea dum hæc orbita motu tranſverſo et angulari velocitate ſemper quadrato diſtantiæ corporis reciproce proportionali circa centrum virium *C* revolvatur; hoc motu compoſito linea quædam *Vpq* in ſpatio immobili deſcribetur, et angularis velocitas radii vectoris *Cp* hanc lineam deſcribentis erit æqualis ſummis angularium velocitatum corporis in orbitâ moventis et orbitæ ipſius, hoc eſt inverſè ut quadratum diſtantiæ, et proinde area hoc motu deſcripta in eadem ratione ac in orbitâ immobili variabitur; area autem in orbitâ immobili eſt tempori proportionalis, ergo in orbitâ motu hoc compoſito deſcriptâ erit etiam area tempori proportionalis. Ponamus jam corpus in ſpatio non reſiſtente hoc modo moveri, tendetque vis centripeta ad punctum immobile circa quod areæ illæ deſcribuntur. Temperari fingamus impulſus vis centripetæ, ita ut corpus movens ſecundum legem prædictam in hâc linea ſemper inveniatur, et eadem erunt phœnomena, vis, et motus projectilis, utrum primo fingamus corpus revera hanc lineam circa punctum immobile deſcribere, vel in trajectoriâ datâ revolvi, interea dum hæc trajectoria motu tranſverſo circa centrum virium revolvitur.

SECTIO QUINTA.

pC, KC et kC ſemper æquantur, manifeſtum eſt quod linearum PC et pC incrementa vel decrementa ſemper ſint æqualia, ideoque ſi corporum in locis P et p exiſtentium diſtinguantur motus ſinguli (per legum corol. 2.) in binos, quorum hi verſus centrum, ſive ſecundum lineas PC, pC determinentur, et alteri prioribus tranſverſi ſint, et ſecundum lineas ipſis PC, pC perpendiculares directionem habeant; motus verſus centrum erunt æquales, et motus tranſverſus corporis p erit ad motum tranſverſum corporis P, ut motus angularis lineæ pC ad motum angularem lineæ PC, id eſt, ut angulus VCp ad angulum VCP. Igitur eodem tempore quo corpus P motu ſuo utroque pervenit ad punctum K, corpus p æquali in centrum motu æqualiter movebitur a p verſus C, ideoque completo illo tempore reperietur alicubi in linea mkr, quæ per punctum k in lineam pC perpendicularis eſt; et motu tranſverſo acquiret diſtantiam a linea pC, quæ ſit ad diſtantiam quam corpus alterum P acquirit a linea PC, ut eſt motus tranſverſus corporis p ad motum tranſverſum corporis alterius P. Quare cum kr æqualis ſit diſtantiæ quam corpus P acquirit a linea PC, ſitque mr ad kr ut angulus VCp ad angulum VCP, hoc eſt, ut motus tranſverſus corporis p ad motum tranſverſum corporis P, manifeſtum eſt quod corpus p completo illo tempore reperietur in loco m. Hæc ita ſe habebunt ubi corpora p et P æqualiter ſecundum lineas pC et PC moventur, ideoque æqualibus viribus ſecundum lineas illas urgentur (P). Capiatur autem angulus pCn ad angulum pCk ut eſt angulus VCp ad angulum VCP, ſitque nC æqualis kC, et corpus p completo illo tempore revera reperietur in n; ideoque vi majore urgetur quam corpus P, ſi modo angulus nCp angulo kCp major eſt, id eſt ſi orbis upk vel movetur

(P) 125. Corpora P, p æqualibus viribus ſecundum lineas PC, pC moventur, quæ lineæ initio motûs ſunt ipſæ æquales; diſtantiæ tamen completo illo tempore non erunt æquales, nec p in loco n reperietur; manifeſtum enim eſt, quòd corpora cum diverſis velocitatibus ab eodem puncto projecta non æqualiter a recto tramite deflectant ni vires centripetæ augeantur vel diminuantur; ſit igitur motus tranſverſus corporis p major vel minor quàm corporis P, corpora illa non eandem acquirent diſtantiam, ni motui corporis p addatur vel ſubducatur vis quædam mn.

vetur in consequentia, vel movetur in antecedentia majore celeritate quam sit dupla ejus qua linea CP in consequentia fertur; et vi minore si orbis tardius movetur in antecedentia (q). Estque virium differentia ut locorum intervallum mn, per quod corpus illud p ipsius actione, dato illo temporis spatio, transferri debet. Centro C intervallo Cn vel Ck describi intelligatur circulus secans lineas mr, mn productas in s et t, et erit rectangulum $mn \times mt$ æquale rectangulo $mk \times ms$, ideoque mn æquale $\frac{mk \times ms}{mt}$. Cum autem triangula pCk, pCn dato tempore dentur magnitudine, sunt kr et mr, earumque differentia mk et summa ms reciproce ut altitudo pC, ideoque rectangulum $mk \times ms$ est reciproce ut quadratum altitudinis pC. Est et mt directe ut $\frac{1}{2}mt$, id est, ut altitudo pC. Hæ sunt primæ rationes linearum nascentium; et hinc fit $\frac{mk \times ms}{mt}$, id est lineola nascens mn, eique proportionalis virium differentia reciproce ut cubus altitudinis pC. Q. E. D. (r)

Corol. 1.

(q) 126. Quoniam est mr ad kr ut VCp ad VCP, prout VCp major est, vel minor, vel æqualis VCP, erit mr major vel minor vel æqualis ipsi kr; et mn positiva, negativa, vel evanescens. Si orbis upk moveatur in consequentia, patet mr majorem esse quam kr; ideoque vis altera priori addenda est, quâ corpus p describat mn. Si orbis upk in antecedentia moveatur cum celeritate duplâ ejus quâ linea CP in consequentia fertur, erit angulus VCu æqualis duplo VCP, et VCp æqualis VCP; corpusque in oppositam partem movens, describet orbem similem et æqualem ipsi VPK: si orbis in antecedentiâ movetur majori vel minori velocitate, patet mr majorem esse vel minorem quam kr, et vim mn in uno casu addendam esse, in altero subtrahendam. Si orbis in antecedentiâ movetur eâdem celeritate quâ CP fertur in consequentia motus transversus destruetur, corpusque p inter apsides movens rectâ lineâ ascendet descendetque vicissim.

(r) 127. THEOREMA. Vis centrifuga, quæ a motu circulari oritur, est in omni orbitâ, in quâ æquales areæ æqualibus temporibus describuntur in reciprocâ triplicatâ ratione distantiæ.

Cas. 1. Sit enim primò directio PR ad radium SP perpendicularis. Corpus P duabus agitatum viribus accedet vel recedet a centro cum vi quæ est differentia virium centripetarum et centrifugarum: describatur circulus PB cum eâdem angulari velocitate quâ orbita PQ, si corpus accedat, vel Pq, si corpus recedat a centro virium; et erit QB accessus corporis ad centrum in priori casu, et qB recessus

TAB. VIII. FIG. 70.

SECTIO QUINTA.

Corol. 1. Hinc differentia virium in locis P et p, vel K et k, eſt ad vim qua corpus motu circulari revolvi poſſit ab R ad K eodem tempore quo corpus P in orbe immobili deſcribit arcum PK, ut lineola naſcens mn ad ſinum verſum arcus naſcentis PK, id eſt ut $\frac{mk \times ms}{mt}$ ad $\frac{rk\mathrm{q}}{2kC}$, vel ut $mk \times ms$ ad rk quadratum; hoc eſt, ſi capiantur

receſſus a centro in altero. Sunt igitur $\mathcal{Q}B$, qB differentiæ inter vires centripetas $R\mathcal{Q}$, Rq et vires centrifugas in orbitis $P\mathcal{Q}$, Pq reſpectivè; et proinde vires centrifugæ in his orbitis experimentur per quantitates $R\mathcal{Q} - \mathcal{Q}B$ et $Rq + qB$, quæ æquales ſunt vi RB quâ circulus cum eâdem angulari velocitate deſcribitur. Vires autem RB ſunt ſemper ut quadrata arcuum ſimul deſcriptorum directè, et ut radii inversè; et ob areas æquales ſemper areis ſimul deſcriptis in orbitis $P\mathcal{Q}$, Pq, et proinde æquales inter ſe, erunt ſemper arcus inversè ut radii, et vires inverſe ut cubi radiorum. Q. E. D.

TAB. VIII. FIG. 71.

Caſ. 2. Sit jam directio Pr ad SP obliqua: ob directionem projectionis defertur corpus propius ad centrum quàm prius per ſpatium Rr, et ob vim attractivam corporis S deſcribit præterea ſpatium $r\mathcal{Q}$: eſt autem $B\mathcal{Q}$, acceſſus nempe corporis verſus centrum, æqualis differentiæ inter $R\mathcal{Q}$ totum motum corporis verſus centrum et vim centrifugam; et proinde manet vis centrifuga æqualis vi RB quâ circulus deſcribitur, ut in priori caſu.

128. *Cor* 1. Ex demonſtratione ſequitur, quòd ſi areæ non ſint temporibus proportionales, vires centrifugæ erunt in duplicatâ ratione arearum ſimul deſcriptarum directè, et ut cubi diſtantiarum inversè: nam arcus circulorum ſunt ut areæ deſcriptæ directe et diſtantiæ inverſe; et proinde quadrata arcuum per diſtantias diviſa erunt ut quadrata arearum diviſa per cubos diſtantiarum.

129. *Cor.* 2. Sequitur etiam quòd vis centrifuga ſit ad vim centripetam, ut chorda illa curvaturæ quæ per centrum virium tranſit ad duplam diſtantiam; nam vis centrifuga eſt vis quâ circulus eâdem angulari velocitate deſcribitur, et hæc vis eſt ad vim in orbitâ $P\mathcal{Q}$ directè in duplicatâ ratione velocitatum, et inversè ut chordæ curvaturæ (42), *i. e.* ob æquales velocitates, ut chordæ illæ inversè.

130. His poſitis, Prop. xxix. ſic demonſtrari poteſt aliter. Quoniam corpora per hyp. æqualiter verſus centrum accedunt vel recedunt, erit differentia virium centripetarum et centrifugarum in mobili orbitâ æqualis differentiæ virium in immobili: et proinde differentia virium centrifugarum erit æqualis differentiæ gravitatum. Sit angulus VCp ad angulum VCP in datâ ratione G ad F, erunt areæ datis temporibus deſcriptæ et areæ totæ in eâdem ratione; vis centrifuga in mobili orbitâ eſt ad vim in immobili, datâ diſtantiâ CP, ut G^2 ad F^2 (128); et proinde differentia virium erit ad vim centrifugam in immobili orbitâ in datâ ratione $GG - FF$ ad FF; vires autem centrifugæ in immobili et in mobili orbitâ variantur in diverſis diſtantiis in reciprocâ triplicatâ ratione diſtantiarum (127); et proinde differentia virium centrifugarum, eique æqualis differentia gravitatum, erit in eâdem ratione. Q. E. D.

piantur datæ quantitates F, G in ea ratione ad invicem quam habet angulus VCP ad angulum VCp, ut GG—FF ad FF. Et propterea, ſi centro C intervallo quovis CP vel Cp deſcribatur ſector circularis æqualis areæ toti VPC, quam corpus P tempore quovis in orbe immobili revolvens radio ad centrum ducto deſcripſit; differentia virium, quibus corpus P in orbe immobili et corpus p in orbe mobili revolvuntur, erit ad vim centripetam, qua corpus aliquod, radio ad centrum ducto, ſectorem illum eodem tempore, quo deſcripta ſit area VPC, uniformiter deſcribere potuiſſet, ut GG—FF ad FF. Namque ſector ille et area pCk ſunt ad invicem ut tempora quibus deſcribuntur. (s)

Corol. 2. Si orbis VPK ellipſis ſit umbilicum habens C et apſidem ſummam V; eique ſimilis et æqualis ponatur ellipſis upk, ita ut ſit ſemper pC æqualis PC, et angulus VCp ſit ad angulum VCP in data ratione G ad F; pro altitudine autem PC vel pC ſcribatur A, et pro ellipſeos latere recto ponatur 2R: erit vis, qua corpus in ellipſi mobili revolvi poteſt, ut $\frac{FF}{AA} + \frac{RGG-RFF}{A\ cub.}$ et contra. Exponatur enim vis qua corpus revolvatur in immota ellipſi per quantitatem $\frac{FF}{AA}$, et vis in V erit $\frac{FF}{CV\ quad.}$. Vis autem qua corpus in circulo ad diſtantiam CV ea cum velocitate revolvi poſſet quam corpus in ellipſi revolvens habet in V, eſt ad vim qua corpus in ellipſi revolvens urgetur in apſide V, ut dimidium lateris recti ellipſeos ad circuli ſemidiametrum CV, ideoque valet $\frac{RFF}{CV\ cub.}$: et vis quæ ſit ad hanc ut GG—FF ad FF, valet $\frac{RGG-RFF}{CV\ cub.}$: eſtque hæc vis (per hujus corol. 1.) differentia virium in V quibus corpus P in ellipſi immota VPK, et corpus p in ellipſi mobili

(s) 131. Aliter. Quoniam vis centrifuga ſit vis quâ circulus eâdem angulari velocitate deſcribitur, erit per 130. differentia virium ad vim quâ corpus motu circulari revolvi poſſit ab R ad K eodem tempore quo corpus P in orbe immobili deſcribit arcum PK, in datâ ratione $GG-FF$ ad FF.

132. *Cor.* 2. et 3. in *Cor.* 4to. includuntur, et eâdem demonſtrantur methodo.

SECTIO QUINTA.

mobili *upk* revolvuntur. Unde cum (per hanc prop.) differentia illa in alia quavis altitudine A ſit ad ſeipſam in altitudine *CV* ut $\frac{1}{A\ cub.}$ ad $\frac{1}{CV\ cub.}$, eadem differentia in omni altitudine A valebit $\frac{RGG-RFF}{A\ cub.}$. Igitur ad vim $\frac{FF}{AA}$, qua corpus revolvi poteſt in ellipſi immobili *VPK*, addatur exceſſus $\frac{RGG-RFF}{A\ cub.}$; et componetur vis tota $\frac{FF}{AA}+\frac{RGG-RFF}{A\ cub.}$ qua corpus in ellipſi mobili *upk* iiſdem temporibus revolvi poſſit.

Corol. 3. Ad eundem modum colligetur quod, ſi orbis immobilis *VPK* ellipſis ſit centrum habens in virium centro *C*; eique ſimilis, æqualis et concentrica ponatur ellipſis mobilis *upk*; ſitque 2 R ellipſeos hujus latus rectum principale, et 2 T latus tranſverſum ſive axis major, atque angulus *VCp* ſemper ſit ad angulum *VCP* ut G ad F; vires, quibus corpora in ellipſi immobili et mobili temporibus æqualibus revolvi poſſunt, erunt ut $\frac{FFA}{T\ cub.}$ et $\frac{FFA}{T\ cub.}+\frac{RGG-RFF}{A\ cub.}$ reſpective.

Corol. 4. Et univerſaliter, ſi corporis altitudo maxima *CV* nominetur T, et radius curvaturæ quam orbis *VPK* habet in *V*, id eſt radius circuli æqualiter curvi, nominetur R, et vis centripeta, qua corpus in trajectoria quacunque immobili *VPK* revolvi poteſt in loco *V*, dicatur $\frac{VFF}{TT}$, atque aliis in locis *P* indefinite dicatur X, altitudine *CP* nominata A, et capiatur G ad F in data ratione anguli *VCp* ad angulum *VCP*: erit vis centripeta, qua corpus idem eoſdem motus in eadem trajectoria *upk* circulariter mota temporibus iiſdem peragere poteſt, ut ſumma virium $X+\frac{VRGG-VRFF}{A\ cub.}$ (t).

Corol. 5.

(t) 133. Aliter. Vis centrifuga in loco *V* eſt ad vim centripetam $\frac{VFF}{\mathcal{T}\mathcal{T}}$, ut chorda curvaturæ ad duplam diſtantiam (129), vel ut *R* ad $\mathcal{T}$, et proinde æqualis eſt

SECTIO QUINTA.

Corol. 5. Dato igitur motu corporis in orbe quocunque immobili, augeri vel minui poteſt ejus motus angularis circa centrum virium in ratione data, et inde inveniri novi orbes immobiles in quibus corpora novis viribus centripetis gyrentur.

TAB. VIII. FIG. 72.

Corol. 6. Igitur ſi ad rectam CV poſitione datam erigatur perpendiculum VP longitudinis indeterminatæ, jungaturque CP, et ipſi æqualis agatur Cp, conſtituens angulum VCp, qui ſit ad angulum VCP in data ratione; vis, qua corpus gyrari poteſt in curva illa Vpk quam punctum p perpetuo tangit, erit reciproce ut cubus altitudinis Cp. Nam corpus P per vim inertiæ, nulla alia vi urgente, uniformiter progredi poteſt in recta VP. Addatur vis in centrum C, cubo altitudinis CP vel Cp reciproce proportionalis, et (per jam demonſtrata) detorquebitur motus ille rectilineus in lineam curvam Vpk.

PROPOSITIO XXX. PROBLEMA X.

Orbium qui ſunt circulis maxime finitimi requiruntur motus apſidum.

Problema ſolvitur arithmetice faciendo ut orbis, quem corpus in ellipſi mobili (ut in propoſitionis ſuperioris corol. 2. vel 3.) revolvens deſcribit in plano immobili, accedat ad formam orbis cujus apſides requiruntur, et quærendo apſides orbis quem corpus illud eſt $\frac{VRFF}{T^3}$; differentia virium eſt ad vim centrifugam $\frac{VRFF}{T^3}$, ut $GG - FF$ ad FF, et proinde æqualis eſt $\frac{VRGG - VRFF}{T^3}$; cum autem hæc ſit ad differentiam in aliâ quâvis altitudine A, ut A^3 ad T^3, differentia in omni altitudine A valebit $\frac{VRGG - VRFF}{A^3}$: ad vim igitur X, quâ corpus revolvi poteſt in immobili orbitâ, addatur exceſſus $\frac{VRGG - VRFF}{A^3}$, et componetur vis tota $X + \frac{VRGG - VRFF}{A^3}$ quâ corpus in eadem trajectoriâ circulariter motâ iiſdem temporibus revolvi poſſit.

SECTIO QUINTA.

illud in plano immobili deſcribit (u). Orbes autem eandem acquirent formam, ſi vires centripetæ quibus deſcribuntur, inter ſe collatæ, in æqualibus altitudinibus reddantur proportionales (v). Sit

(u) 134. In orbitis ſimilibus et æqualibus, vires, ſi ſumantur æquales diſtantiæ et correſpondentes, vel æquales ſunt, vel datam ad ſe rationem ſemper conſervant (per hactenus demonſtrata): hinc ſi orbita detur vi quacunque deſcripta, et fingatur vis ad centrum aliud tendens, quæ ad eandem diſtantiam a centro ſuo vel æqualis eſt vel in datâ ratione ad vim priorem, poſſibile erit, ob vim in utroque caſu in eâdem ratione variantem, tali velocitate et tali directione corpus projicere, ut orbitam ſimilem et æqualem priori deſcribat; ſi vero in hâc orbitâ erui poteſt apſidum motus angularis, eruetur etiam in priori.

(v) 135. Fingatur corpus revolvi in ellipſi revolvente, et orbita motu compoſito in ſpatio immobili deſcripta circularis non evadet ſi orbita elliptica excentrica ſit, et ſumma vel differentia virium in nullâ certâ et determinatâ ratione diſtantiæ variabitur; quo vero propius appropinquat orbita revolvens ad formam circularem, orbita in ſpatio immobili deſcripta eo propius accedet ad formam circularem, et lex in quâ variatur ſumma vel differentia virium eo propius accedet ad quandam determinatam legem diſtantiæ; etenim, ſi orbita revolvens fiat circularis, orbita in ſpatio immobili etiam fiet circulus diverſâ velocitate angulari deſcriptus, et lex in qua variatur ſumma vel differentia virium ea evadet (vel fractionalis vel integra) ad quam antea perpetuo accedebat. Si enim orbita ſit revera circularis, propter diſtantias æquales ſummæ vel differentiæ virium quantitas erit invariabilis, et proinde hanc quantitatem fingere licet in datâ qualibet vel directâ vel inverſâ ratione diſtantiæ variari: ergo, orbitâ jamjam abiturâ in circulum angulari motu regulari deſcribendum, fingere licet unamquamque orbitam propemodum circularem deſcribi motu corporis in ellipſi revolvente moventis, motumque in hâc orbita à vi variante in quâdam certâ lege diſtantiæ vel fractionali vel integrâ oriri, ex eo quod differentia per quam à tali orbitâ abludat minor ſumi poteſt quantitate ullâ quæ aſſignari poteſt, faciendo nimirum ut orbita ad orbitam circularem perpetuo appropinquet.

136. Detur orbita utcunque anomala et vi tendente ad punctum immobile deſcripta; capiantur diſtantiæ maximæ et minimæ quæ ſe invicem immediate ſequuntur, et deſcribatur ellipſis ſummâ harum diſtantiarum pro axe, et dimidio differentiæ pro excentricitate; ita temperari poteſt motus hujuſce ellipſis, ut corpus in illa revolvens ſemper in orbita datâ inveniatur, in hoc caſu forſan motus non fit neceſſario ſecundum legem propoſitionis 29 temperatus; quoniam vero corpus in ellipſi mobili revolvens orbitam quamlibet datam deſcribere poteſt; et quoniam, ſi orbita deſcripta ſit circularis, hæc orbita deſcribi poteſt à corpore in orbitâ circulari revolvente, interea dum hæc ipſa orbita revolvetur, ſequitur quod perpetuo acceſſu orbitæ datæ ad formam circularem, motûſque angularis ad motum conſtantem, orbita perpetuo

Sit punctum *V* apſis ſumma, et ſcribantur T pro altitudine maxima *CV*, A pro altitudine quavis alia *CP* vel *Cp*, et X pro altitudinum differentia *CV* — *CP*; et vis, qua corpus in ellipſi circa umbilicum ſuum *C* (ut in corol. 2.) revolvente movetur, quæque in corol. 2. erat ut $\frac{FF}{AA} + \frac{RGG-RFF}{A\ cub.}$, id eſt ut $\frac{FFA+RGG-RFF}{A\ cub.}$, ſubſtituendo T — X pro A, erit ut $\frac{RGG-RFF+TFF-FFX}{A\ cub.}$. Reducenda ſimiliter eſt vis alia quævis centripeta ad fractionem cujus denominator ſit A *cub.* et numeratores, facta homologorum terminorum collatione, ſtatuendi ſunt analogi. Res exemplis patebit.

Exempl. 1. Ponamus vim centripetam uniformem eſſe, ideoque ut $\frac{A\ cub.}{A\ cub.}$, ſive (ſcribendo T — X pro A in numeratore) ut $\frac{T\ cub. - 3TTX + 3TXX - X\ cub.}{A\ cub.}$; et collatis numeratorum terminis correſpondentibus, nimirum datis cum datis et non datis cum non datis, fiet RGG — RFF + TFF ad T *cub.* ut — FFX ad — 3TTX + 3TXX — X *cub.* ſive ut — FF ad — 3TT + 3TX — XX (x). Jam cum orbis ponatur circulo quam maxime finipetuo appropinquet ad formam orbitæ quæ ab ellipſi revolvente ſecundum leges prop. 29. deſcribi poteſt, donec tandem ab orbitâ tali quantitate minori ullâ quæ aſſignari poteſt abludat; in hoc caſu orbitæ evadere ponantur ſimiles et æquales, et exinde vires proportionales: quoniam vero ope quantitatum vi centripetæ in ellipſibus proportionalium erui poteſt ellipſis motus, eruetur etiam apſidum motus in orbitâ, quæ, comparatione virium, orbitæ deſcriptæ ab ellipſi mobili reddetur ſimilis et æqualis.

(x) 137. *Si quantitates duæ* a + x *et* b + y *componantur ex partibus datis* a *et* b, *et ex partibus non datis, ſimul tamen naſcentibus, vel ſimul evaneſcentibus*, x *et* y; *fuerit autem* a + x *ut* b + y; *erit ſemper* x *ad* y *ut* a *ad* b. Dem. Cum enim ponatur $a + x$ ut $b + y$, erit ſemper $a + x$ ad $b + y$ in datâ ratione: naſcentibus autem vel evaneſcentibus x et y, eſt $a + x$ ad $b + y$, ut a ad b; quare $a + x$ erit ſemper ad $b + y$, ut a ad b; ideoque x erit ad y ſemper ut a ad b.

Aliter. Eſt $a + x : b + y :: m : n$ ex hypotheſi: ſit $\dot{x}$ et $\dot{y}$ cotemporanea finita incrementa vel decrementa x et y, et erit $a + x + \dot{x} : b + y + \dot{y} :: m : n$

SECTIO QUINTA.

finitimus, coeat orbis cum circulo; et ob factas R, T æquales, atque X in infinitum diminutam, rationes ultimæ erunt RGG ad T *cub.* ut — FF ad — 3 TT, ſeu GG ad TT ut FF ad 3 TT, et viciſſim GG ad FF ut TT ad 3 TT, id eſt, ut 1 ad 3; ideoque G ad F, hoc eſt angulus *VCp* ad angulum *VCP*, ut 1 ad $\surd 3$. Ergo cum corpus in ellipſi immobili, ab apſide ſumma ad apſidem imam deſcendendo conficiat angulum *VCP* (ut ita dicam) graduum 180; corpus aliud in ellipſi mobili, atque ideo in orbe immobili de quo agimus, ab apſide ſumma ad apſidem imam deſcendendo conficiet angulum *VCp* graduum $\frac{180}{\surd 3}$: id ideo ob ſimilitudinem orbis hujus, quem corpus agente uniformi vi centripeta deſcribit, et orbis illius quem corpus in ellipſi revolvente gyros peragens deſcribit in plano quieſcente. Per ſuperiorem terminorum collationem ſimiles redduntur hi orbes, non univerſaliter, ſed tunc cum ad formam circularem quam maxime appropinquant. Corpus igitur uniformi cum vi centripeta in orbe propemodum circulari revolvens, inter apſidem ſummam et apſidem imam conficiet ſemper angulum $\frac{180}{\surd 3}$ graduum, ſeu 103 *gr.* 55 *m.* 23 *ſec.* ad centrum; perveniens ab apſide ſumma ad apſidem imam ubi ſemel confecit hunc angulum, et inde ad apſidem ſummam rediens ubi iterum confecit eundem angulum; et ſic deinceps in infinitum.

Exempl. 2. Ponamus vim centripetam eſſe ut altitudinis A dignitas quælibet A^{n-3} ſeu $\frac{A^n}{A^3}$: ubi n—3 et n ſignificant dignitatum indices quoſcunque integros vel fractos, rationales vel irrationales,

ex hypotheſi; ergo $a + x + \dot{x} : b + y + \dot{y} :: a + x : b + y$; et $ab + bx + b\dot{x} + ay + yx + y\dot{x} = ab + ay + a\dot{y} + bx + xy + x\dot{y}$; et $b\dot{x} + y\dot{x} = a\dot{y} + x\dot{y}$; atque idcirco $\dot{x} : \dot{y} :: a + x : b + y :: m : n$. Si vero cotemporanea incrementa vel decrementa quantitatum duarum, quæ ſimul exiſtere incipiunt, ſemper vel æquales ſint vel in eâdem ratione, quantitates ipſæ vel æquales erunt, vel in hâc ratione; hoc eſt, erit $x : y :: a + x : b + y$ in omni caſu, et $bx + yx = ay + yx$, vel $bx = ay$, atque idcirco $x : y :: a : b$.

les, affirmativos vel negativos. Numerator ille A^n seu $\overline{T-X}|^n$ in seriem indeterminatam per methodum nostram serierum convergentium reducta, evadit $T^n - nXT^{n-1} + \frac{nn-n}{2} XXT^{n-2}$ &c. Et collatis hujus terminis cum terminis numeratoris alterius $RGG - RFF + TFF - FFX$, fit $RGG - RFF + TFF$ ad T^n ut $-FF$ ad $-nT^{n-1} + \frac{nn-n}{2} XT^{n-2}$ &c. Et sumendo rationes ultimas ubi orbes ad formam circularem accedunt, fit RGG ad T^n ut $-FF$ ad $-nT^{n-1}$, seu GG ad T^{n-1} ut FF ad nT^{n-1}, et vicissim GG ad FF ut T^{n-1} ad nT^{n-1} id est ut 1 ad n; ideoque G ad F, id est angulus VCp ad angulum VCP, ut 1 ad $\surd n$. Quare cum angulus VCP, in descensu corporis ab apside summa ad apsidem imam in ellipsi confectus, sit graduum 180; conficietur angulus VCp, in descensu corporis ab apside summa ad apsidem imam, in orbe propemodum circulari quem corpus quodvis vi centripeta dignitati A^{n-3} proportionali describit, æqualis angulo graduum $\frac{180}{\surd n}$; et hoc angulo repetito corpus redibit ab apside ima ad apsidem summam, et sic deinceps in infinitum. Ut si vis centripeta sit ut distantia corporis a centro, id est, ut A seu $\frac{A^4}{A^3}$, erit n æqualis 4 et $\surd n$ æqualis 2; ideoque angulus inter apsidem summam et apsidem imam æqualis $\frac{180}{2}$ *gr.* seu 90 *gr.* Completa igitur quarta parte revolutionis unius corpus perveniet ad apsidem imam, et completa alia quarta parte ad apsidem summam, et sic deinceps per vices in infinitum. Id quod etiam ex propositione IX. manifestum est. Nam corpus urgente hac vi centripeta revolvetur in ellipsi immobili, cujus centrum est in centro virium. Quod si vis centripeta sit reciproce ut distantia, id est directe ut $\frac{1}{A}$ seu $\frac{A^2}{A^3}$, erit n æqualis 2, ideoque inter apsidem

summam

Sectio Quinta.

ſummam et imam angulus erit graduum $\frac{180}{\sqrt{2}}$ ſeu 127 *gr.* 16 *m.* 45 *ſec.* & propterea corpus tali vi revolvens, perpetua anguli hujus repetitione, vicibus alternis ab apſide ſumma ad imam et ab ima ad ſummam perveniet in æternum. Porro ſi vis centripeta ſit reciproce ut latus quadrato-quadratum undecimæ dignitatis altitudinis, id eſt reciproce ut $A^{\frac{11}{4}}$, ideoque directe ut $\frac{1}{A^{\frac{11}{4}}}$ ſeu ut $\frac{A^{\frac{1}{4}}}{A^3}$ erit n æqualis $\frac{1}{4}$, et $\frac{180}{\sqrt{n}}$ *gr.* æqualis 360 *gr.* et propterea corpus de apſide ſumma diſcedens et ſubinde perpetuo deſcendens, perveniet ad apſidem imam ubi complevit revolutionem integram, dein perpetuo aſcenſu complendo aliam revolutionem integram, redibit ad apſidem ſummam: et ſic per vices in æternum. (*y*)

Exempl. 3. Aſſumentes m et n pro quibuſvis indicibus dignitatum altitudinis, et b, c pro numeris quibuſvis datis, ponamus vim cen-

* (*y*) 138. *Sit vis centripeta ut altitudinis dignitas quælibet cujus index eſt* $n-3$. *Quæritur angulus inter apſidem ſummam et apſidem imam ſecundum hypotheſin corollarii tertii ubi nimirum centrum virium coincidit cum centro communi ellipſium.*

Secundum hanc hypotheſin, adhibitâ notatione Newtonianâ, vis centripeta eſt ut $\frac{F^2 A}{T^3} + \frac{RG^2 - RF^2}{A^3}$. Scribatur 1 pro T vel R, et vis centripeta jam erit ut $F^2 A + \frac{G^2 - F^2}{A^3}$, hoc eſt ut $\frac{F^2 A^4 + G^2 - F^2}{A^3}$. Eſt autem $A^4 = 1 - 4X$ &c. et $F^2 A^4 = F^2 - 4F^2 X$, &c. quare vis centripeta eſt ut $\frac{F^2 - 4F^2 X + G^2 - F^2}{A^3}$, vel ut $\frac{G^2 - 4F^2 X}{A^3}$; ponitur autem vis centripeta ut A^{n-3} vel $\frac{A^n}{A^3}$; quare A^n eſt ut $G^2 - 4F^2 X$: ſed $A^n = 1 - nX$, &c. quare $G^2 - 4F^2 X$ eſt ut $1 - nX$; unde eſt G^2 ad 1, ut $4F^2$ ad n; unde $G^2 \times n = 4F^2$, et $G^2 = \frac{4F^2}{n}$, et $G = \frac{2F}{\sqrt{n}}$. Sed in hâc hypotheſi eſt F 90 Grad. cum ſit 90 Grad. angulus inter apſidem ſummam et apſidem imam in ellipſi quieſcente: Quare angulus inter apſidem imam, ubi vis centripeta eſt ut A^{n-3} erit $\frac{180}{\sqrt{n}}$, idem nimirum qui prodit ex hypotheſi corollarii ſecundi.

centripetam esse ut $\frac{b\,A^m + c\,A^n}{A\ cub.}$, id est, ut $\frac{b\,in\,\overline{T-X}^m + c\,in\,\overline{T-X}^n}{A\ cub.}$ seu (per eandem methodum nostram serierum convergentium) ut $\frac{bT^m + cT^n - mbXT^{m-1} - ncXT^{n-1} + \frac{mm-m}{2}bXXT^{m-2} + \frac{nn-n}{2}cXXT^{n-2}\ \&c.}{A\ cub.}$ et collatis numeratorum terminis, fiet $RGG - RFF + TFF$ ad $bT^m + cT^n$, ut $-FF$ ad $-mbT^{m-1} - ncT^{n-1} + \frac{mm-m}{2}bXT^{m-2} + \frac{nn-n}{2}cXT^{n-2}$ &c. Et sumendo rationes ultimas quæ prodeunt ubi orbes ad formam circularem accedunt, fit GG ab $bT^{m-1} + cT^{n-1}$, ut FF ad $mbT^{m-1} + ncT^{n-1}$, et vicissim GG ad FF ut $bT^{m-1} + cT^{n-1}$ ad $mbT^{n-1} + ncT^{n-1}$. Quæ proportio, exponendo altitudinem maximam CV seu T arithmetice per unitatem (z) fit GG ad FF ut $b + c$ ad $mb + nc$, ideoque ut 1 ad $\frac{mb+nc}{b+c}$. Unde est G ad F, id est angulus VCp ad angulum VCP, ut 1 ad $\sqrt{\frac{mb+nc}{b+c}}$. Et propterea cum angulus VCP inter apsidem summam et apsidem imam in ellipsi immobili sit 180 *gr.* erit angulus VCp inter easdem apsides, in orbe quem corpus vi centripeta quantitati $\frac{b\,A^m + c\,A^n}{A\ cub.}$ proportionali describit, æqualis angulo graduum 180 $\sqrt{\frac{b+c}{mb+nc}}$. Et eodem argumento si vis centripeta sit ut $\frac{b\,A^m - c\,A^n}{A\ cub.}$, angulus inter apsides invenietur graduum 180

(z) 139. Ratio subduplicata quantitatum $b\,T^{m-1} + c\,T^{n-1}$ ad $mb\,T^{m-1} + nc\,T^{n-1}$ semper exprimet rationem G ad F, substituendo quemlibet numerum pro altitudine maximâ T: si numerus substituatur unitate major vel minor, quantitates T^{m-1} et T^{n-1} non erunt sibi invicem æquales, et proinde ratio G ad F non exprimetur in terminis quantitatum $b + c$ et $mb + nc$: ponendo vero T unitati æqualem, T^{m-1} et T^{n-1} erunt sibi invicem æquales, et ratio prædicta $bT^{m-1} + cT^{n-1}$ ad $mbT^{m-1} + ncT^{n-1}$, semper exprimens rationem G^2 ad F^2, hac methodo eruta prodibit ratio $b + c$ ad $mb + nc$.

Sectio Quinta.

$\surd \frac{b-c}{mb-nc}$. Nec ſecus reſolvetur problema in caſibus difficilioribus. Quantitas, cui vis centripeta proportionalis eſt, reſolvi ſemper debet in ſeries convergentes denominatorem habentes A *cub.* Dein pars data numeratoris qui ex illa operatione provenit ad ipſius partem alteram non datam, et pars data numeratoris hujus RGG—RFF+TFF—FFX ad ipſius partem alteram non datam in eadem ratione ponendæ ſunt: Et quantitates ſuperfluas delendo, ſcribendoque unitatem pro T, obtinebitur proportio G ad F.

Corol. 1. Hinc ſi vis centripeta ſit ut aliqua altitudinis dignitas, inveniri poteſt dignitas illa ex motu apſidum; et contra. Nimirum ſi motus totus angularis, quo corpus redit ad apſidem eandem, ſit ad motum angularem revolutionis unius, ſeu graduum 360, ut numerus aliquis *m* ad numerum alium *n*, et altitudo nominetur A: erit vis ut altitudinis dignitas illa $A^{\frac{nn}{mm}-3}$, cujus index eſt $\frac{nn}{mm}-3$. Id quod per exempla ſecunda manifeſtum eſt (a). Unde liquet vim illam in majore quam triplicata altitudinis ratione, in receſſu a centro, decreſcere non poſſe (b). Corpus tali vi

(a) 140. Per exempla ſecunda manifeſtum eſt, quod motus totus angularis quo corpus redit ad apſidem eandem ſit $\frac{360}{\surd p}$, poſito quod vis centripeta ſit ut altitudinis *A* dignitas quælibet A^{p-3}, cujus index eſt $p-3$; in hoc corollario exprimitur motus ille per $\frac{360\,m}{n}$; ſit igitur $\frac{360\,m}{n} = \frac{360}{\surd p}$, et per reſolutionem æquationis fit $p-3 = \frac{nn}{mm} - 3$, quo ſubſtituto, eſt vis centripeta ut altitudinis dignitas illa $A^{\frac{nn}{mm}-3}$.

(b) 141. Hoc eſt, orbita qua movetur corpus cum vi, quæ in receſſu a centro decreſcit in majori quam triplicata ratione altitudinis, non deſcribi poteſt motu corporis in peripheria ellipſeos, dum ellipſis revolvitur circa focum ſuum: patet enim quantitatem $A^{\frac{nn}{mm}-3}$ non exprimere majorem quam inverſam triplicatam diſtantiæ rationem, ni ponatur $\frac{nn}{mm}$ negativa, in hoc caſu fit motus apſidum $360 \times \surd -\frac{mm}{nn}$, quæ eſt quantitas impoſſibilis.

vi revolvens deque apſide diſcedens, ſi cœperit deſcendere nunquam perveniet ad apſidem imam ſeu altitudinem minimam, ſed deſcendet uſque ad centrum, deſcribens curvam illam lineam de qua egimus in corol. 6. prop. XXIX (c). Sin cœperit illud, de apſide diſcedens (d), vel minimum aſcendere; aſcendet in infinitum, neque unquam perveniet ad apſidem ſummam. Deſcribet enim curvam illam lineam de qua actum eſt in eodem corollario. (e) Sic et ubi vis, in receſſu a centro, decreſcit in

(c) 142. Si enim vis gravitatis ſit in apſide illâ major quam vis centrifuga, quoniam in eâdem variatur ratione, erit ſemper major, corpuſque verſus centrum perpetuo deſcendet: et contra ſi minor ſit, corpus aſcendet in infinitum, neque ad maximam altitudinem unquam perveniet. Idem patet ex exemplo ſecundo hujus problematis; nam ſi vis centripeta variatur in inversâ triplicatâ ratione diſtantiæ, in quantitate A^{n-3}, ſit $n = o$; et motus angularis ab apſide ad apſidem erit $\frac{180}{o}$, quæ eſt quantitas indefinitè magna.

(d) 143. Si corpus non de apſide diſcedat, ad apſidem pervenire poteſt. Sit enim Vpk curva de quâ actum eſt in Cor. 6. Prop. 29. manifeſtum eſt quòd corpus p, non ab apſide diſcedens, movere poſſit a puncto p verſus Q, eâ lege, ut ſit ſemper Cp æqualis CP, et angulus VCp ad angulum VCP in data ratione: corpus p hâc lege movens, perveniet ad apſidem imam V, et poſtea aſcendet in infinitum. TAB. VIII. FIG. 72.

(e) 144. Quoniam enim vis centrifuga variatur in inversâ triplicatâ ratione altitudinis, et vis gravitatis in majore quàm in hâc ratione, patet, quòd ſi vis centrifuga in apſide illâ major ſit quàm vis gravitatis, vim centrifugam in minori decreſcentem ratione ſemper majorem eſſe, et corpus aſcendere in infinitum. Et contra, ſi vis centrifuga minor ſit quàm vis gravitatis, quoniam in acceſſu corporis ad centrum minùs augeatur, erit ſemper minor, corpuſque verſus centrum deſcendet. Quò major eſt dignitas diſtantiæ cui vis gravitatis eſt reciprocè proportionalis, eò citius corpus ad centrum deſcendet: ſi vis gravitatis ſit in inversâ triplicatâ ratione altitudinis, corpus non niſi infinitis revolutionibus ad centrum perveniet: ſi vis ſit reciprocè ut quadrato-cubus altitudinis, et corpus juſtâ projiciatur velocitate, deſcendet in circulo in cujus peripheriâ eſt centrum virium per Cor. 1. Prop. IV; et ſi velocitas projectionis ſit ad velocitatem in circulo ad eandem diſtantiam ut 1 ad $\sqrt{2}$, corpus in centrum decidet poſt quartam partem revolutionis: ſi vis gravitatis ſit reciprocè in quadruplicatâ ratione diſtantiæ, et corpus projiciatur cum velocitate quæ eſt ad velocitatem quâ circulus deſcribitur ad eandem diſtantiam, ut $\sqrt{2}$ ad $\sqrt{3}$, deſcribet corpus illud epicycloidem, et poſt dimidiam revolutionem in centrum decidet: ſi gravitas ſit reciprocè ut dignitas diſtantiæ cujus index eſt $n + 3$, et

SECTIO QUINTA.

in majore quam triplicata ratione altitudinis, corpus de apſide diſcedens, perinde ut cœperit deſcendere vel aſcendere, vel deſcendet ad centrum uſque vel aſcendet in infinitum. (f) At ſi vis, in receſſu a centro, vel decreſcat in minore quam triplicata ratione altitudinis, vel creſcat in altitudinis ratione quacunque; corpus nunquam deſcendet ad centrum uſque, ſed ad apſidem imam aliquando perveniet: et contra, ſi corpus de apſide ad apſidem alternis vicibus deſcendens et aſcendens nunquam appellat ad centrum; vis in receſſu a centro aut augebitur, aut in minore quam triplicata altitudinis ratione decreſcet: et quo citius corpus de apſide ad apſidem redierit, eo longius ratio virium recedet a ratione illa triplicata. Ut ſi corpus revolutionibus 8 vel 4 vel 2 vel $1\frac{1}{2}$ de apſide ſumma ad apſidem ſummam alterno deſcenſu et aſcenſu redierit; hoc eſt, ſi fuerit m ad n ut 8 vel 4 vel 2 vel $1\frac{1}{2}$ ad 1, ideoque $\frac{nn}{mm} - 3$ valeat $\frac{1}{64} - 3$ vel $\frac{1}{16} - 3$ vel $\frac{1}{4} - 3$ vel $\frac{4}{9} - 3$: erit velocitas projectionis ſit ad velocitatem quâ circulus deſcribitur ad eandem diſtantiam ut 1 ad $\sqrt{1 + \frac{n}{2}}$, corpus in centrum decidet poſt partem revolutionis quæ eſt ad totam ut $\frac{1}{2n}$ ad 1. (Vid. Mac. Fl. Art. 437.)

(f) 145. Si gravitas variatur in minore quam triplicatâ ratione diſtantiæ patet quòd ſi major ſit quàm vis centrifuga in ſuperiori parte orbitæ, tardius tamen in acceſſu ad centrum aucta, minor erit quàm vis centrifuga in inferiori parte orbitæ, et corpus ad priorem diſtantiam recedet. Si gravitas ſit in inversâ triplicatâ ratione diſtantiæ corpus ab apſide ſummâ diſcedens ad apſidem imam nunquam perveniet. Si gravitas ſit in inversâ duplicatâ ratione diſtantiæ, corpus in ſemiellipſi deſcendens in dimidiâ revolutione ad apſidem imam perveniet. Si gravitas ſit in reciprocâ quâdam ratione diſtantiæ, quæ minor eſt quàm triplicata, major autem quàm duplicata, corpus ad apſidem perveniet poſt partem revolutionis pluſquam dimidiam; vis enim centrifuga difficilius gravitatem ſuperabit. Contra, ſi gravitas ſit in minore quàm duplicatâ ratione diſtantiæ, vis centrifuga citius gravitatem ſuperabit, et corpus ad imam apſidem in minore quàm dimidiâ revolutione deſcendet. Patet igitur, ſi gravitas ſit in inversâ duplicatâ ratione diſtantiæ, apſides quieſcere, ſi in majori quàm in hâc ratione, ferri in conſequentia, ſi in minori, in antecedentia, et contra. Unde, apſidibus planetarum motu lentiſſimo et fere inſenſibili progredientibus, concludimus virium centripetarum proportiones haud multùm aberrare ab inversâ duplicatâ diſtantiarum.

erit vis ut $A^{\frac{1}{64}-3}$ vel $A^{\frac{1}{16}-3}$ vel $A^{\frac{1}{4}-3}$ vel $A^{\frac{4}{9}-3}$, id eſt reciproce ut $A^{3-\frac{1}{64}}$ vel $A^{3-\frac{1}{16}}$ vel $A^{3-\frac{1}{4}}$ vel $A^{3-\frac{4}{9}}$. Si corpus ſingulis revolutionibus redierit ad apſidem eandem immotam; erit *m* ad *n* ut 1 ad 1, ideoque $A^{\frac{nn}{mm}-3}$ æqualis A^{-2} ſeu $\frac{1}{AA}$; et propterea decrementum virium in ratione duplicata altitudinis, ut in præcedentibus demonſtratum eſt. Si corpus partibus revolutionis unius vel tribus quartis, vel duabus tertiis, vel una tertia, vel una quarta, ad apſidem eandem redierit; erit *m* ad *n* ut $\frac{3}{4}$ vel $\frac{2}{3}$ vel $\frac{1}{3}$ vel $\frac{1}{4}$ ad 1, ideoque $A^{\frac{nn}{mm}-3}$ æqualis $A^{\frac{11}{9}-3}$ vel $A^{\frac{9}{4}-3}$ vel A^{9-3} vel A^{16-3}; et propterea vis aut reciproce ut $A^{\frac{11}{9}}$ vel $A^{\frac{3}{4}}$, aut directe ut A^{6} vel A^{13}. Denique ſi corpus pergendo ab apſide ſumma ad apſidem ſummam confecerit revolutionem integram, et præterea gradus tres, ideoque apſis illa ſingulis corporis revolutionibus confecerit in conſequentia gradus tres; erit *m* ad *n* ut 363 *gr.* ad 360 *gr.* ſive ut 121 ad 120, ideoque $A^{\frac{nn}{mm}-3}$ erit æquale $A^{-\frac{29523}{14641}}$; et propterea vis centripeta reciproce ut $A^{\frac{29523}{14641}}$ ſeu reciproce ut $A^{2\frac{4}{243}}$ proxime. Decreſcit igitur vis centripeta in ratione paulo majore quam duplicata, ſed quæ vicibus $59\frac{3}{4}$ propius ad duplicatam quam ad triplicatam accedit.

Corol. 2. Hinc etiam ſi corpus, vi centripeta quæ ſit reciproce ut quadratum altitudinis, revolvatur in ellipſi umbilicum habente in centro virium, et huic vi centripetæ addatur vel auferatur vis alia quævis extranea; cognoſci poteſt (per exempla tertia) motus apſidum qui ex vi illa extranea orietur: et contra (g). Ut ſi vis

(g) 146. Vi varianti in inversâ duplicatâ ratione diſtantiæ addatur perpetuo vis in triplicatâ ratione ejuſdem diſtantiæ, et ſumma non variabitur ſecundum ullam diſtantiæ legem determinatam; quo vero propius accedit orbita ad formam circularem eo propius accedit lex vis compoſitæ ad legem quandam duplicatam inter et triplicatam diſtantiæ, ita tandem ut in orbitâ propemodum circulari ſumma revera variabitur ſecundum determinatam quandam diſtantiæ legem. Auferatur a vi in duplicatâ inversâ variante vis ipſi diſtantiæ pro-

 portionalis

SECTIO QUINTA.

vis qua corpus revolvitur in ellipſi ſit ut $\frac{1}{AA}$, et vis extranea ablata ut cA, ideoque vis reliqua ut $\frac{A - cA^4}{A\ cub.}$; erit (in exemplis tertiis) b æqualis 1, m æqualis 1, et n æqualis 4, ideoque angulus revolutionis inter apſides æqualis angulo graduum $180 \surd \frac{1-c}{1-4c}$. Ponamus vim illam extraneam eſſe 357. 45 partibus minorem quam vis altera qua corpus revolvitur in ellipſi, id eſt c eſſe $\frac{100}{35745}$, exiſtente A vel T æquali 1, et $180 \surd \frac{1-c}{1-4c}$ evadet $180 \surd \frac{35645}{35345}$, ſeu 180.7623, id eſt, 180 *gr.* 45 *m.* 44 *ſ.* Igitur corpus de apſide ſumma diſcedens, motu angulari 180 *gr.* 45 *m.* 44 *ſ.* perveniet ad apſidem imam, et hoc motu duplicato ad apſidem ſummam redibit: ideoque apſis ſumma ſingulis revolutionibus progrediendo conficiet 1 *gr.* 31 *m.* 28 *ſec.* Apſis lunæ eſt duplo velocior circiter ([h]).

SECTIO

portionalis, et reſiduum quoque in orbitâ propemodum circulari ſecundum determinatam quandam diſtantiæ legem variabitur. Fingatur igitur vim, compoſitam ex vi creſcente in inversâ duplicatâ et vi addititiâ creſcente in inversâ triplicata, variari in eâdem ratione ac vis, compoſita ex vi creſcente in inversâ duplicatâ et vi ablatitiâ diſtantiæ proportionali, et quoniam motus apſidum ex variatione vis in majori vel minori ratione quam inversâ duplicatâ diſtantiæ pendet, idem erit in utroque caſu eorundem motus.

([h]) 147. Inveniantur proportio vis ablatitiæ ad vim addititiam, et earundem quantitates per calculos a Newtoni principiis pendentes; et, ſubtrahendo ſummas virium addititiarum a viribus ablatitiis, inveniatur exceſſus vis ablatitiæ ſupra vim addititiam; ponatur hunc exceſſum, ſublato motu regreſſivo, agere per totam orbitam lunarem, et apſidum motus hinc oriundus dimidium erit motûs ab aſtronomis obſervati. Probavit vero Newtonus hunc motum dimidiatum neceſſario oriri ex quantitate illâ datâ vis ablatitiæ, et proinde cauſam motûs illius dimidiati recte exponit ex principiis hujuſce ſectionis; altera vero pars hujuſce motûs ab excentricitate orbitæ lunaris, motu in tangente variabili, motu ipſius telluris, aliiſque cauſis, de quibus in hâc ſectione nulla habetur ratio, petenda videtur.




Fig. 67.




Fig. 68.




Fig. 70.




Fig. 71.




Fig. 69.




Fig. 72.

SECTIO VI.

Sectio Sexta.

De motu corporum viribus centripetis ſe mutuo petentium.

Hactenus expoſui motus corporum attractorum ad centrum immobile, quale tamen vix extat in rerum natura. Attractiones enim fieri ſolent ad corpora; et corporum trahentium et attractorum actiones ſemper mutuæ ſunt et æquales, per legem tertiam: adeo ut neque attrahens poſſit quieſcere neque attractum, ſi duo ſint corpora, ſed ambo (per legum corollarium quartum) quaſi attractione mutua, circum gravitatis centrum commune revolvantur: et ſi plura ſint corpora, quæ vel ab unico attrahantur, et idem attrahant, vel omnia ſe mutuo attrahant; hæc ita inter ſe moveri debeant, ut gravitatis, centrum commune vel quieſcat, vel uniformiter moveatur in directum. Qua de cauſa jam pergo motum exponere corporum ſe mutuo trahentium, conſiderando vires centripetas tanquam attractiones, quamvis fortaſſe, ſi phyſice loquamur, verius dicantur impulſus. In mathematicis enim jam verſamur: et propterea, miſſis diſputationibus phyſicis, familiari utimur ſermone, quo poſſimus a lectoribus mathematicis facilius intelligi.

PROPOSITIO XXXI. THEOREMA XXI.

Corpora duo ſe invicem trahentia deſcribunt, et circum commune centrum gravitatis, et circum ſe mutuo, figuras ſimiles.

Sunt enim diſtantiæ corporum a communi gravitatis centro reciproce proportionales corporibus; atque ideo in data ratione ad invicem, et componendo in data ratione ad diſtantiam totam inter corpora. Feruntur autem hæ diſtantiæ circum terminum ſuum communem æquali motu angulari, propterea quod in directum

SECTIO SEXTA.

rectum ſemper jacentes non mutant inclinationem ad ſe mutuo. Lineæ autem rectæ, quæ ſunt in data ratione ad invicem, et æquali motu angulari circum terminos ſuos feruntur, figuras circum eoſdem terminos in planis, quæ una cum his terminis vel quieſcunt, vel motu quovis non angulari moventur, deſcribunt omnino ſimiles. Proinde ſimiles ſunt figuræ, quæ his diſtantiis circumactis deſcribuntur ([i]). Q. E. D.

PROPOSITIO XXXII. THEOREMA XXII.

Si corpora duo viribus quibuſvis ſe mutuo trahunt, et interea revolvuntur circa gravitatis centrum commune: dico quod figuris, quas corpora ſic mota deſcribunt circum ſe mutuo, poteſt figura ſimilis et æqualis, circum corpus alterutrum immotum, viribus iiſdem deſcribi.

TAB. IX. FIG. 74.

Revolvantur corpora S, P circa commune gravitatis centrum C, pergendo de S ad T, deque P ad Q. A dato puncto s ipſis SP,

([i]) 148. Projiciantur corpora S, T in contrariis directionibus, ita ut centrum gravitatis C quieſcat; et ſi in dato tempore corpus T ad punctum t perveniat, et agatur tc, erit corpus alterum in lineâ illâ productâ; et diſtantia ejus Cs erit ad Ct, ut quantitas materiæ corporis T ad quantitatum materiæ corporis S, hoc eſt, ut CS ad CT, per naturam centri gravitatis; et proinde, ob angulum SCs æqualem angulo TCt, erunt figuræ SCs, TCt, circa commune centrum gravitatis deſcriptæ, ſimiles. Præterea, corpora S, T deſcribunt etiam circa ſe mutuo figuras et ſimiles inter ſe, et ſimiles etiam figuris circa punctum C deſcriptis: corpus enim T per arcum Tt movens deſcribet circa quieſcens S angulum TSt; moveat interea S per ſpatium Ss, et deſcribetur præterea angulus æqualis angulo Sts, qui duo anguli ſimul ſumpti æquales ſunt externo angulo TCt: eodem modo oſtendi poteſt corpus S deſcribere circa T angulum æqualem angulo SCs: unde, quoniam per naturam centri gravitatis, totæ inter corpora diſtantiæ ſunt, et inter ſe, et ad diſtantias a centro gravitatis C in data ratione, ſequitur quatuor illas figuras ſimiles eſſe.

TAB. IX. FIG. 73.

Projiciantur jam corpora S, T ita ut corpora illa cum centro C quieſcente non jaceant in eâdem rectâ, tum movebitur centrum illud uniformiter in directum, et motus corporum inter ſe iidem erunt ac ſi centrum illud quieſceret (Cor. 6. leg. mot.); ideoque figuræ ſimiles ſunt ut prius.

SP, $T\mathcal{Q}$ æquales et parallelæ ducantur ſemper sp, sq; et curva pqv, quam punctum p revolvendo circum punctum immotum s deſcribit, erit ſimilis et æqualis curvis, quas corpora S, P deſcribunt circum ſe mutuo: proindeque (per theor. XXI.) ſimilis curvis ST et $P\mathcal{Q}V$, quas eadem corpora deſcribunt circum commune gravitatis centrum C: idque quia proportiones linearum SC, CP, et SP vel sp ad invicem dantur.

Caſ. 1. Commune illud gravitatis centrum C, per legum corollarium quartum, vel quieſcit, vel movetur uniformiter in directum. Ponamus primo, quod id quieſcit, inque s et p locentur corpora duo, immobile in s, mobile in p, corporibus S et P ſimilia et æqualia. Dein tangant rectæ PR et pr curvas $P\mathcal{Q}$ et pq in P et p, et producantur $C\mathcal{Q}$ et sq ad R et r. Et ob ſimilitudinem figurarum $CPR\mathcal{Q}$, $sprq$ erit $R\mathcal{Q}$ ad rq ut CP ad sp, ideoque in data ratione. Proinde ſi vis, qua corpus P verſus corpus S, atque ideo verſus centrum intermedium C attrahitur, eſſet ad vim, qua corpus p verſus centrum s attrahitur, in eadem illa ratione data; hæ vires æqualibus temporibus attraherent ſemper corpora de tangentibus PR, pr ad arcus $P\mathcal{Q}$, pq per intervalla ipſis proportionalia $R\mathcal{Q}$, rq, ideoque vis poſterior efficeret, ut corpus p gyraretur in curva pqv, quæ ſimilis eſſet curvæ $P\mathcal{Q}V$, in qua vis prior efficit, ut corpus P gyretur; et revolutiones iiſdem temporibus complerentur. At quoniam vires illæ non ſunt ad invicem in ratione CP ad sp, ſed (ob ſimilitudinem et æqualitatem corporum S et s, P et p, et æqualitatem diſtantiarum SP, sp) ſibi mutuo æquales; corpora æqualibus temporibus æqualiter trahentur de tangentibus: et propterea, ut corpus poſterius p trahatur per intervallum majus rq, requiritur tempus majus, idque in ſubduplicata ratione intervallorum; propterea quod (per lemma decimum) ſpatia ipſo motus initio deſcripta ſunt in duplicata ratione temporum. Ponatur igitur velocitas corporis p eſſe ad velocitatem corporis P in ſubduplicata ratione diſtantiæ sp ad diſtantiam CP, eo ut temporibus, quæ ſint in eadem ſubduplicata ratione, deſcribantur

SECTIO SEXTA.

bantur arcus pq, $P\mathcal{Q}$, qui ſunt in ratione integra ([k]): Et corpora P, p viribus æqualibus ſemper attracta deſcribent circum centra quieſcentia C et s figuras ſimiles $P\mathcal{Q}V$, pqv, quarum poſterior pqv ſimilis eſt et æqualis figuræ, quam corpus P circum corpus mobile S deſcribit. Q. E. D.

Caſ. 2. Ponamus jam quod commune gravitatis centrum, una cum ſpatio in quo corpora moventur inter ſe, progreditur uniformiter in directum; et (per legum corollarium ſextum) motus omnes in hoc ſpatio peragentur ut prius, ideoque corpora deſcribent circum ſe mutuo figuras eaſdem ac prius, et propterea figuræ pqv ſimiles et æquales. Q. E. D.

Corol. 1. Hinc corpora duo viribus diſtantiæ ſuæ proportionalibus ſe mutuo trahentia, deſcribunt (per prop. IX.) et circum commune gravitatis centrum, et circum ſe mutuo, ellipſes concentricas ([l]); et vice verſa, ſi tales figuræ deſcribuntur, ſunt vires diſtantiæ proportionales.

Corol. 2.

*([k]) 149. Si velocitates in P et p fuerint in ſubduplicatâ ratione CP ad sp, corpora P et p deſcribent arcus ſimiles in temporibus quæ erunt etiam in ſubduplicatâ illâ ratione; et ſi velocitates in $\mathcal{Q}$ et q fuerint ut $\surd\overline{C\mathcal{Q}}$ ad $\surd\overline{sq}$ vel ob ſimilitudinem arcuum ut $\surd\overline{CP}$ ad $\surd\overline{sp}$, corpora P et p pergent arcus ſimiles in temporibus proportionalibus deſcribere. Videamus ergo an velocitates in $\mathcal{Q}$ et q ſint ad invicem in hâc ratione. Anguli $CP\mathcal{Q}$ et spq ob ſimilitudinem ſitûs corporum P et p in curvis ſimilibus æquantur; ergo vires centripetæ quibus hæc corpora in lineas curvas detorquentur ſimiliter applicantur. Sed vires æquales ſimiliter applicatæ velocitates generant temporibus proportionales; ergo incrementa vel decrementa velocitatum in locis $\mathcal{Q}$ et q ſunt ut $\surd\overline{CP}$ ad $\surd\overline{sp}$. Addantur hæc incrementa vel ſubducantur decrementa velocitatibus in P et p quæ ſunt etiam ut $\surd\overline{CP}$ ad $\surd\overline{cp}$, et prodibunt velocitates in $\mathcal{Q}$ et q etiam in eâdem illâ ratione. Sunt ergo velocitates in locis omnibus ſimilibus ut $\surd\overline{CP}$ ad $\surd\overline{sp}$.

TAB. IX. FIG. 73.

([l]) 150. Deſcribat corpus $\mathcal{T}$ lineam $\mathcal{T}t$; centrum orbitæ circa S deſcriptæ erit in ipſo corpore S; deſcribat interea S lineam Ss; et centra arcuum omnium quàm minimorum, quos corpus $\mathcal{T}$ circa S deſcribit, invenientur perpetuo in linea Ss: completâ igitur totâ revolutione, ipſa orbita corporis S locus erit omnium centrorum; et centrum ejus C centrum erit totius orbitæ a corpore $\mathcal{T}$ circa S deſcriptæ. Eodem modo patet, centrum orbitæ quam corpus S circa $\mathcal{T}$ deſcribit eſſe in loco C.

Corol. 2. Et corpora duo, viribus quadrato diſtantiæ ſuæ reciproce proportionalibus, deſcribunt (per prop. XIII. XIV. XV.) et circum commune gravitatis centrum, et circum ſe mutuo, ſectiones conicas umbilicum habentes in centro, circum quod figuræ deſcribuntur. Et vice verſa, ſi tales figuræ deſcribuntur, vires centripetæ ſunt quadrato diſtantiæ reciproce proportionales.

Corol. 3. Corpora duo quævis circum gravitatis centrum commune gyrantia, radiis et ad centrum illud et ad ſe mutuo ductis, deſcribunt areas temporibus proportionales.

PROPOSITIO XXXIII. THEOREMA XXIII.

Corporum duorum S *et* P, *circa commune gravitatis centrum* C *revolventium, tempus periodicum eſſe ad tempus periodicum corporis alterutrius* P, *circa alterum immotum* S *gyrantis, et figuris, quæ corpora circum ſe mutuo deſcribunt, figuram ſimilem et æqualem deſcribentis, in ſubduplicata ratione corporis alterius* S, *ad ſummam corporum* S + P.

Namque, ex demonſtratione ſuperioris propoſitionis, tempora, quibus arcus quivis ſimiles PQ et pq deſcribuntur, ſunt in ſubduplicata ratione diſtantiarum CP et SP vel sp, hoc eſt, in ſubduplicata ratione corporis S ad ſummam corporum $S+P$. Et componendo, ſummæ temporum quibus arcus omnes ſimiles PQ et pq deſcribuntur, hoc eſt, tempora tota, quibus figuræ totæ ſimiles deſcribuntur, ſunt in eadem ſubduplicata ratione. Q. E. D.

Sectio Sexta.

PROPOSITIO XXXIV. THEOREMA XXIV.

Si corpora duo S *et* P, *viribus quadrato diſtantiæ ſuæ reciproce proportionalibus, ſe mutuo trahentia, revolvuntur circa gravitatis centrum commune: dico quod ellipſeos, quam corpus alterutrum* P *hoc motu circa alterum* S *deſcribit, axis principalis erit ad axem principalem ellipſeos, quam corpus idem* P *circa alterum quieſcens* S *eodem tempore periodico deſcribere poſſet, ut ſumma corporum duorum* S + P *ad primum duorum medie proportionalium inter hanc ſummam et corpus illud alterum* S.

Nam ſi deſcriptæ ellipſes eſſent ſibi invicem æquales, tempora periodica (per theorema ſuperius) forent in ſubduplicata ratione corporis S ad ſummam corporum $S+P$. Minuatur in hac ratione tempus periodicum in ellipſi poſteriore, et tempora periodica evadent æqualia; ellipſeos autem axis principalis (per prop. XVII.) minuetur in ratione, cujus hæc eſt ſeſquiplicata, id eſt in ratione, cujus ratio S ad $S+P$ eſt triplicata; ideoque erit ad axem principalem ellipſeos alterius, ut primum duorum medie proportionalium inter $S+P$ et S ad $S+P$. Et inverſe, axis principalis ellipſeos circa corpus mobile deſcriptæ erit ad axem principalem deſcriptæ circa immobile, ut $S+P$ ad primum duorum medie proportionalium inter $S+P$ et S ([m]). Q. E. D.

PRO-

([m]) 151. Cum $T^2 : t^2 :: S+P : S$ per prop. XXXIII; et $T^2 : t^2 :: A^3 : X^3$, (poſitis nempe A et X pro axibus ellipſium deſcriptarum) per prop. XVII; erit $S+P : S :: A^3 : X^3$. Sed cum quatuor quantitates geometricè proportionales ſint, prima eſt ad quartam, ut cubus primæ ad cubum ſecundæ; ergo duobus mediis proportionalibus inter $S+P$ et S ſumptis, eſt $S+P$ ad S ut $\overline{S+P}^3$ ad cubum primi horum duorum, ideoque $S+P$ ad primum illud ut A ad X.

Tab. IX. Fig. 75. 152. Methodus media dua proportionalia inveniendi hæc ſit. Sint E et F rectæ duæ lineæ longitudinis cujuſcunque, et a puncto A ducantur lineæ AB et

PROPOSITIO XXXV. THEOREMA XXV.

SECTIO SEXTA.

Si corpora duo viribus quibuſvis ſe mutuo trahentia, neque alias agitata vel impedita, quomodocunque moveantur; motus eorum perinde ſe habebunt, ac ſi non traherent ſe mutuo, ſed utrumque a corpore tertio in communi gravitatis centro conſtituto viribus iiſdem traheretur: Et virium trahentium eadem erit lex reſpectu diſtantiæ corporum a centro illo communi atque reſpectu diſtantiæ totius inter corpora.

Nam vires illæ, quibus corpora ſe mutuo trahunt, tendendo ad corpora, tendunt ad commune gravitatis centrum intermedium; ideoque eædem ſunt, ac ſi a corpore intermedio manarent. Q. E. D.

Et quoniam datur ratio diſtantiæ corporis utriuſvis a centro illo communi ad diſtantiam inter corpora, dabitur ratio cujuſvis poteſtatis diſtantiæ unius ad eandem poteſtatem diſtantiæ alterius; ut et ratio quantitatis cujuſvis, quæ ex una diſtantia et quantitatibus datis utcunque derivatur, ad quantitatem aliam, quæ ex altera diſtantia, et quantitatibus totidem datis, datamque illam diſtantiarum rationem ad priores habentibus ſimiliter derivatur. Proinde ſi vis, qua corpus unum ab altero trahitur, ſit directe vel inverſe ut diſtantia corporum ab invicem; vel ut quælibet hujus diſtantiæ

et AC ad invicem perpendiculares. Fiat parabola ADG, cujus axis eſt AB cujuſque latus rectum æquatur lineæ E, ducaturque alia parabola ADH, cujus axis eſt AC cujuſque latus rectum lineæ F æqualis eſt. Hæ parabolæ ſeſe interſecent in puncto D, et demiſſis perpendiculis DC, DB, eſt $E : BD :: BD : BA$ (Ham. Con. Sect. L. II. P. i.) et $BD : DC$ vel $BA :: DC$ vel $BA : F$. Ergo E, BD, BA et F ſunt quatuor geometricè proportionales.

153. Hinc inveniri poſſunt diametri principales orbium quos planetæ deſcribunt. Capiendæ ſunt enim in ratione ſubſeſquiplicatâ temporum periodicorum per prop. XVII, et deinde ſigillatim augendæ in ratione ſummæ maſſarum ſolis et planetæ cujuſque revolventis ad primum duorum medie proportionalium inter hanc ſummam et ſolem.

Sectio Sexta.

diſtantiæ poteſtas; vel denique ut quantitas quævis ex hac diſtantia et quantitatibus datis quomodocunque derivata: erit eadem vis, qua corpus idem ad commune gravitatis centrum trahitur, directe itidem vel inverſe ut corporis attracti diſtantia a centro illo communi, vel ut eadem diſtantiæ hujus poteſtas, vel denique ut quantitas ex hac diſtantia et analogis quantitatibus datis ſimiliter derivata. Hoc eſt, vis trahentis eadem erit lex reſpectu diſtantiæ utriuſque (n). Q. E. D.

PROPOSITIO XXXVI. PROBLEMA XI.

Viribus quibus corpora ſe mutuo trahunt creſcentibus in ſimplici ratione diſtantiarum a centris: requiruntur motus plurium corporum inter ſe (o).

Tab. IX. Fig. 76.

Ponantur primo corpora duo T et L commune habentia gravitatis centrum D. Deſcribent hæc (per corollarium primum theorematis XXII.) ellipſes centra habentes in D.

Trahat

* (n) 154. Moveantur duo corpora S et P circa commune gravitatis centrum C, et nominetur SP, x, et CP, z; et ponantur corpora S et P æqualia, ita ut ſit $x = 2z$; exponamus denique vim centripetam qua corpus S trahit corpus P per quantitatem aliquam compoſitam, qualis eſt $Ax + Bx^2$, habitis A et B pro quantitatibus quibuſlibet datis, et ſi exponatur lex $Ax + Bx^2$ per poteſtates ipſius z evadet $2Az + 4Bz^2$; vel poſitis a et b pro $2A$ vel $4B$, lex vis centripetæ ad commune centrum C tendentis fiet $az + bz^2$; et quantitas $az + bz^2$ ſemper erit æqualis quantitati $Ax + Bx^2$. Statuatur jam corpus aliquod in communi centro C, quod trahat corpus P vi centripetâ $az + bz^2$, corpore S jam deſtructo; et corpus P jam trahetur ad corpus in centro C conſtitutum omnino pariter ac prius, tum quoad directionem, tum quoad quantitatem vis centripetæ.

*(o) 155. LEMMA. Si feratur corpus aliquod L circa centrum D cum vi centripetâ quæ ſit ut $A \times DL$, tempus periodicum erit reciprocè in ſubduplicatâ ratione quantitatis A. Nam (per Cor. 2. Prop. IX.) tempus periodicum idem erit ac ſi corpus L circulum deſcriberet circa centrum D ad diſtantiam quamvis DL: deſcribat ergo; et ſi tempus periodicum vocetur T, erit $A \times DL$ ut $\frac{DL}{T^2}$ (per Cor. 2. Prop. IV); unde erit T^2 ut $\frac{1}{A}$ et T ut $\frac{1}{\sqrt{A}}$. Q. E. D.

156. Poſitis

SECTIO SEXTA.

Trahat jam corpus tertium S priora duo $\mathcal{T}$ et L viribus acceleratricibus $S\mathcal{T}$, SL, et ab ipſis viciſſim trahatur. Vis $S\mathcal{T}$ (per legum corol. 2.) reſolvitur in vires SD, $D\mathcal{T}$; et vis SL in vires SD, DL. Vires autem $D\mathcal{T}$, DL, quæ ſunt ut ipſarum ſumma $\mathcal{T}L$, atque ideo ut vires acceleratrices quibus corpora $\mathcal{T}$ et L ſe mutuo trahunt, additæ his viribus corporum $\mathcal{T}$ et L, prior priori et poſterior poſteriori, componunt vires diſtantiis $D\mathcal{T}$ ac DL proportionales, ut prius, ſed viribus prioribus majores; ideoque (per corol. 1. prop. IX. et corol. 1. et 8. prop. IV.) efficiunt ut corpora illa deſcribant ellipſes ut prius, ſed motu celeriore. Vires reliquæ acceleratrices SD et SD, actionibus motricibus $SD \times \mathcal{T}$ et $SD \times L$, quæ ſunt ut corpora, trahendo corpora illa æqualiter et ſecundum lineas $\mathcal{T}I$, LK, ipſi DS parallelas, nil mutant ſitus eorum ad invicem, ſed

156. Poſitis quæ in hâc prop. trahat corpus unumquodque corpora reliqua cum vi acceleratrice, quæ ſit ut corpus trahens et diſtantia corporum attractorum conjunctim; et exponetur vis qua corpus $\mathcal{T}$ trahit corpus L per quantitatem $\mathcal{T} \times \mathcal{T}L$; cumque ſit L ad $\mathcal{T}$ ut $\mathcal{T}D$ ad DL, erit (*componendo*) $\mathcal{T} + L$ ad $\mathcal{T}$ ut $\mathcal{T}L$ ad DL; unde $\mathcal{T} \times \mathcal{T}L$ æqualis erit $\overline{\mathcal{T} + L} \times DL$: trahitur ergo corpus L ad centrum commune D, perinde ac ſi corpus $\mathcal{T}$ tolleretur et aliud corpus $\mathcal{T} + L$ in communi centro D immotum conſtitueretur; et tempus periodicum corporis L circum D erit ad tempus periodicum corporis L circum $\mathcal{T}$ immotum, in ſubduplicatâ ratione corporis $\mathcal{T}$ ad ſummam corporum $\mathcal{T} + L$ (155.) Accedat jam corpus tertium S, et vis quâ corpus S trahit corpus $\mathcal{T}$ exponetur per $S \times S\mathcal{T}$, æqualis viribus $\overline{S \times \mathcal{T}D} + \overline{S \times SD}$. Similiter vis quâ corpus S trahit corpus L æqualis erit viribus $\overline{S \times LD} + \overline{S \times SD}$: quare ſumma virium, quâ corpus S trahit corpora $\mathcal{T}$ et L, eſt $\overline{S \times \mathcal{T}D} + \overline{S \times DL} + \overline{S \times 2SD}$; ſed vis $S \times 2SD$ minimè perturbat motum ſyſtematis ut demonſtrat Newtonus; et vi $\overline{\mathcal{T} + L} \times DL$, quâ corpus L trahebatur ad centrum D ante acceſſum corporis S, jam additur vis $S \times DL$, ita ut vis tota quâ corpus L trahitur ad centrum D jam ſit $\overline{S + \mathcal{T} + L} \times DL$; minuitur ergo tempus periodicum corporum $\mathcal{T}$ et L circa commune ipſorum gravitatis centrum D per acceſſum corporis S in ſubduplicatâ ratione $S + \mathcal{T} + L$ ad $\mathcal{T} + L$; et corpus alterutrum, puta L, trahitur ad centrum D perinde ac ſi corpora S et $\mathcal{T}$ ſubmoverentur, et corpus $S + \mathcal{T} + L$ in communi centro D collocaretur. Similiter ſi accedat corpus quartum V, trahetur corpus L ad centrum D perinde ac ſi corpora V, S, $\mathcal{T}$ ſubmoverentur, et corpus $V + S + \mathcal{T} + L$ in centro D collocaretur, et tempus periodicum acceſſu corporis V minuetur in ſubduplicatâ ratione $V + S + \mathcal{T} + L$ ad $S + \mathcal{T} + L$.

Hæc

SECTIO SEXTA.

ſed faciunt ut ipſa æqualiter accedant ad lineam IK; quam ductam concipe per medium corporis S, et lineæ DS perpendicularem. Impedietur autem iſte ad lineam IK acceſſus faciendo ut ſyſtema corporum $\mathcal{T}$ et L ex una parte, et corpus S ex altera, juſtis cum velocitatibus, gyrentur circa commune gravitatis centrum C. Tali motu corpus S, eo quod ſumma virium motricium $SD \times \mathcal{T}$ et $SD \times L$, diſtantiæ CS proportionalium, tendit verſus centrum C, deſcribit ellipſin circa idem C; et punctum D, ob proportionales CS, CD, deſcribet ellipſin conſimilem e regione. Corpora autem $\mathcal{T}$ et L viribus motricibus $SD \times \mathcal{T}$ et $SD \times L$, prius priore, poſterius poſteriore, æqualiter et ſecundum lineas parallelas $\mathcal{T}I$ et LK, ut dictum eſt, attracta, pergent (per legum corollarium quintum et ſextum) circa centrum mobile D ellipſes ſuas deſcribere, ut prius. Q. E. I.

Addatur jam corpus quartum V, et ſimili argumento concludetur hoc et punctum C ellipſes circa omnium commune centrum gravitatis,

Hæc ſunt phænomena motuum binorum quorumcunque corporum circa commune ipſorum gravitatis centrum. Videamus jam phænomena motuum reſpectu reliquorum centrorum C et B. Corpus S trahitur ad corpus $\mathcal{T}$ vi centripeta $\mathcal{T} \times \mathcal{T}S$ æquali viribus $\overline{\mathcal{T} \times \mathcal{T}D} + \overline{\mathcal{T} \times SD}$; ſimiliter vis, quâ corpus S trahitur ad corpus L, æquatur viribus $\overline{L \times LD} + \overline{L \times SD}$; quare ſumma virium quibus corpus trahitur a corporibus $\mathcal{T}$ et L, eſt $\overline{\mathcal{T} \times \mathcal{T}D} + \overline{L \times LD} + \overline{\overline{\mathcal{T}+L} \times SD}$. Sed vires $\overline{\mathcal{T} \times \mathcal{T}D}$ et $\overline{L \times LD}$, cum ſint æquales et contrariæ, ex naturâ centri gravitatis ſe mutuo deſtruunt; manet itaque vis $\overline{\mathcal{T}+L} \times SD$ quâ corpus trahitur a corporibus $\mathcal{T}$ et L, pariter ac ſi corpora illa $\mathcal{T}$ et L in unum coaleſcerent, et in communi centro D locarentur. Porro cum ſint ex naturâ centri gravitatis S ad $\mathcal{T}+L$ ut CD ad CS, et componendo $S+\mathcal{T}+L$ ad $\mathcal{T}+L$ ut SD ad SC, erit $\overline{\mathcal{T}+L} \times SD = \overline{S+\mathcal{T}+L} \times SC$; ergo corpus S trahitur ad commune centrum C cum vi $\overline{S+\mathcal{T}+L} \times SC$. Accedat rurſus corpus quartum V, et vis quâ V trahitur ad S erit $S \times VS = \overline{S \times SC} + \overline{S \times VC}$; et vis quâ corpus V trahitur a corporibus $\mathcal{T}$ et L erit $\overline{\overline{\mathcal{T}+L} \times CD} + \overline{\overline{\mathcal{T}+L} \times VC}$, uti ante dictum eſt; quare vis tota qua corpus V trahitur a corporibus S, $\mathcal{T}$, L, eſt $\overline{S \times SC} + \overline{\overline{\mathcal{T}+L} \times CD} + \overline{\overline{S+\mathcal{T}+L} \times VC}$. Sed vires $S \times SC$ et $\overline{\mathcal{T}+L} \times CD$ ſe mutuo deſtruunt ut prius; quare vis quâ corpus V trahitur a corporibus S, $\mathcal{T}$, L eſt $\overline{S+\mathcal{T}+L} \times VC$: eſt autem V ad $S+\mathcal{T}+L$ ut BC ad VB, et componendo $V+S+\mathcal{T}+L$ eſt ad $S+\mathcal{T}+L$ ut

gravitatis B deſcribere; manentibus motibus priorum corporum T, L et S circa centra D et C, ſed acceleratis. Et eadem methodo corpora plura adjungere licebit. Q. E. I.

Hæc ita ſe habent, etſi corpora T et L trahunt ſe mutuo viribus acceleratricibus majoribus vel minoribus quam quibus trahunt corpora reliqua pro ratione diſtantiarum. Sunto mutuæ omnium attractiones acceleratrices ad invicem ut diſtantiæ ductæ in corpora trahentia, et ex præcedentibus facile deducetur quod corpora omnia æqualibus temporibus periodicis ellipſes varias, circa omnium commune gravitatis centrum B, in plano immobili deſcribunt. Q. E. I.

PROPOSITIO XXXVII. THEOREMA XXVI.

Corpora plura, quorum vires decreſcunt in duplicata ratione diſtantiarum ab eorundem centris, moveri poſſe inter ſe in ellipſibus; et radiis ad umbilicos ductis areas deſcribere temporibus proportionales quam proxime.

In propoſitione ſuperiore demonſtratus eſt caſus ubi motus plures peraguntur in ellipſibus accurate. Quo magis recedit lex virium a lege ibi poſita, eo magis corpora perturbabunt mutuos motus; neque fieri poteſt, ut corpora, ſecundum legem hic poſitam ſe mutuo trahentia, moveantur in ellipſibus accurate, niſi ſervando

ut VC ad VB: eſt ergo $\overline{S+T+L} \times VC = \overline{V+S+T+L} \times VB$. Trahitur ergo corpus unumquodque V ad commune omnium centrum B omnino ſimiliter ac ſi corpus $V+S+T+L$ æquale nempe toti ſyſtemati in communi centro B conſtitueretur; et vires abſolutæ ad centra B, C, D, tendentes æquales ſunt inter ſe. Sunt ergo tempora periodica tum corporis uniuſcujuſque circa centrum B, tum trium quorumcunque circa centrum C, tum duorum quorumcunque circa centrum D æqualia inter ſe, et ad tempus periodicum corporis L circa centrum immotum T in ſubduplicatâ ratione corporis T ad totum ſyſtema $V+S+T+L$. Trahant jam corpora T et L ſe mutuo viribus vel majoribus vel minoribus quam quibus trahunt cætera, et tempus periodicum ſyſtematis $T+L$ circa centrum D minuetur vel augebitur in ſubduplicatâ ratione virium auctarum vel diminutarum (155); ſed motus reliquorum ex hâc virium intenſione vel remiſſione minime perturbabitur.

SECTIO SEXTA.

vando certam proportionem diſtantiarum ab invicem. In ſequentibus autem caſibus non multum ab ellipſibus errabitur.

Caſ. 1. Pone corpora plura minora circa maximum aliquod ad varias ab eo diſtantias revolvi, tendantque ad ſingula vires abſolutæ proportionales iiſdem corporibus. Et quoniam omnium commune gravitatis centrum (per legum corol. quartum) vel quieſcit vel movetur uniformiter in directum, fingamus corpora minora tam parva eſſe, ut corpus maximum nunquam diſtet ſenſibiliter ab hoc centro: et maximum illud vel quieſcet, vel movebitur uniformiter in directum, ſine errore ſenſibili; minora autem revolventur circa hoc maximum in ellipſibus, atque radiis ad idem ductis deſcribent areas temporibus proportionales; niſi quatenus errores inducuntur, vel per errorem maximi a communi illo gravitatis centro, vel per actiones minorum corporum in ſe mutuo. Diminui autem poſſunt corpora minora, uſque donec error iſte, et actiones mutuæ ſint datis quibuſvis minores; atque ideo donec orbes cum ellipſibus quadrent, et areæ reſpondeant temporibus, ſine errore, qui non ſit minor quovis dato. *Q. E. O.*

Caſ. 2. Fingamus jam ſyſtema corporum minorum modo jam deſcripto circa maximum revolventium, aliudve quodvis duorum circum ſe mutuo revolventium corporum ſyſtema progredi uniformiter in directum, et interea vi corporis alterius longe maximi et ad magnam diſtantiam ſiti urgeri ad latus. Et quoniam æquales vires acceleratrices, quibus corpora ſecundum lineas parallelas urgentur, non mutant ſitus corporum ad invicem, ſed ut ſyſtema totum, ſervatis partium motibus inter ſe, ſimul transferatur, efficiunt: manifeſtum eſt quod, ex attractionibus in corpus maximum, nulla prorſus orietur mutatio motus attractorum inter ſe, niſi vel ex attractionum acceleratricum inæqualitate, vel ex inclinatione linearum ad invicem, ſecundum quas attractiones fiunt. Pone ergo attractiones omnes acceleratrices in corpus maximum eſſe inter ſe reciproce ut quadrata diſtantiarum; et augendo corporis maximi diſtantiam, donec rectarum ab hoc ad reliqua ductarum differentiæ reſpectu earum longitudinis, et inclinationes

clinationes ad invicem minores ſint, quam datæ quævis; perſeverabunt motus partium ſyſtematis inter ſe ſine erroribus, qui non ſint quibuſvis datis minores. Et quoniam, ob exiguam partium illarum ab invicem diſtantiam, ſyſtema totum ad modum corporis unius attrahitur; movebitur idem hac attractione ad modum corporis unius; hoc eſt, centro ſuo gravitatis deſcribet circa corpus maximum ſectionem aliquam conicam (*viz.* Hyperbolam vel parabolam attractione languida, ellipſin fortiore) et radio ad maximum ducto deſcribet areas temporibus proportionales, ſine ullis erroribus, niſi quas partium diſtantiæ, perexiguæ ſane et pro lubitu minuendæ, valeant efficere. Q.E.O. (p)

Simili

(p) 157. Sumatur pro hypotheſi centrum ſyſtematis mundani quieſcere (quod ab omnibus conceſſum eſt, dum aliqui terram, alii ſolem in centro ſyſtematis quieſcere contendunt) et videamus quid inde ſequatur.

1mò. *Commune gravitatis centrum terræ, ſolis, et planetarum omnium quieſcit.* Nam centrum illud (per legum Cor. IV.) vel quieſcet, vel progredietur uniformiter in directum. Sed centro illo ſemper progrediente, centrum mundi movebitur quoque contra hypotheſin.

2dò. *Sol motu perpetuo agitatur, ſed nunquam a communi gravitatis centro planetarum omnium longe recedit.* Nam cum materia in ſole (119) ſit ad materiam in jove ut 1067 ad 1, et diſtantia jovis a ſole ſit ad ſemidiametrum ſolis in ratione paulo majore [eſt enim ut 1115 ad 1,] incidet commune centrum gravitatis jovis et ſolis in punctum paulo ſupra ſuperficiem ſolis. Eodem argumento cum materia in ſole ſit ad materiam in ſaturno ut 3021 ad 1, et diſtantia ſaturni a ſole ſit ad ſemidiametrum ſolis in ratione paulo minore, incidet commune gravitatis centrum ſaturni et ſolis in punctum paulo infra ſuperficiem ſolis. Et ejuſdem calculi veſtigiis inſiſtendo, ſi terra et planetæ omnes ex una ſolis parte conſiſterent, commune omnium gravitatis centrum vix integra ſolis diametro a centro ſolis diſtaret. Aliis in caſibus, diſtantia centrorum ſemper minor eſt. Et propterea cum centrum illud gravitatis perpetuo quieſcit, ſol pro vario planetarum ſitu in omnes partes movebitur, ſed a centro illo nunquam longe recedet.

Hinc commune gravitatis centrum terræ, ſolis et planetarum omnium pro centro mundi habendum eſt. Nam cum terra, ſol, et planetæ omnes gravitent in ſe mutuo, et propterea pro vi gravitatis ſuæ ſecundum leges motus perpetuo agitentur: perſpicuum eſt, quod horum centra mobilia pro mundi centro quieſcente haberi nequeunt. Si corpus illud in centro locandum eſſet in quod corpora omnia maxime gravitant (uti vulgi eſt opinio) privilegium iſtud concedendum eſſet ſoli. Cum autem ſol moveatur, eligendum erit punctum quieſcens, a quo centrum ſolis quam minime diſcedit, et a quo idem adhuc minus diſcederet, ſi modo ſol denſior eſſet et major, ut minus moveretur.

SECTIO SEXTA.

Simili argumento pergere licet ad caſus magis compoſitos in infinitum.

Corol. 1. In caſu ſecundo, quo propius accedit corpus omnium maximum ad ſyſtema duorum vel plurium, eo magis turbabuntur motus partium ſyſtematis inter ſe; propterea quod linearum a corpore maximo ad has ductarum jam major eſt inclinatio ad invicem, majorque proportionis inæqualitas.

Corol. 2. Maxime autem turbabuntur, ponendo quod attractiones acceleratrices partium ſyſtematis, verſus corpus omnium maximum, non ſint ad invicem reciproce ut quadrata diſtantiarum a corpore illo maximo; præſertim ſi proportionis hujus in-

3tiò. *Planetæ moventur in ellipſibus umbilicum habentibus in centro ſolis, et radiis ad centrum illud ductis areas deſcribunt temporibus proportionales.* Diſputavimus ſupra de his motibus ex phænomenis. Jam cognitis motuum principiis, ex his colligimus motus cœleſtes a priori. Quoniam pondera planetarum in ſolem ſunt reciprocè ut quadrata diſtantiarum a centro ſolis, ſi ſol quieſceret et planetæ reliqui non agerent in ſe mutuo, forent orbes eorum elliptici, ſolem in umbilico communi habentes, et areæ deſcriberentur temporibus proportionales (per prop. 1, et XIII, et Cor. 1. prop. XV.): actiones autem planetarum in ſe mutuo perexiguæ ſunt (ut poſſint contemni) et motus planetarum in ellipſibus circa ſolem mobilem minus perturbant, quam ſi motus illi circa ſolem quieſcentem peragerentur.

Actio quidem jovis in ſaturnum non eſt omnino contemnenda. Nam gravitas in jovem eſt ad gravitatem in ſolem (paribus diſtantiis) ut 1 ad 1067 (119); ideoque in conjunctione jovis et ſaturni, quoniam diſtantia ſaturni a jove eſt ad diſtantiam ſaturni a ſole fere ut 4 ad 9, erit gravitas ſaturni in jovem ad gravitatem ſaturni in ſolem, ut 81 ad 16 × 1067, ſeu ut 1 ad 211 circiter. Et hinc oritur perturbatio orbis ſaturni in ſingulis planetæ hujus cum jove conjunctionibus adeo ſenſibilis ut ad eandem aſtronomi hæreant. In his conjunctionibus gravitates acceleratrices ſolis in ſaturnum, jovis in ſaturnum, et jovis in ſolem, ſunt fere ut 16, 81, et $\frac{16 \times 81 \times 3021}{25}$ ſeu 156609, ideoque differentia gravitatum ſolis in ſaturnum et jovis in ſaturnum eſt ad gravitatem jovis in ſolem, ut 65 ad 156609, ſeu 1 ad 2409. Huic autem differentiæ proportionalis eſt maxima ſaturni efficacia ad perturbandum jovis motum, et propterea perturbatio orbis jovialis longe minor eſt quam ea ſaturnii. Reliquorum orbium perturbationes ſunt adhuc longe minores præterquam quòd orbis terræ ſenſibiliter perturbatur a luna. Commune centrum gravitatis terræ ac lunæ, ellipſin circa ſolem in umbilico poſitum percurrit, et radio ad ſolem ducto areas in eâdem temporibus proportionales deſcribit, terra vero circa hoc centrum commune motu menſtruo revolvitur.

inæqualitas major ſit quam inæqualitas proportionis diſtantiarum a corpore maximo. Nam ſi vis acceleratrix, æqualiter et ſecundum lineas parallelas agendo, nil perturbat motus inter ſe, neceſſe eſt, ut ex actionis inæqualitate perturbatio oriatur, majorque ſit vel minor pro majore vel minore inæqualitate. Exceſſus impulſuum majorum, agendo in aliqua corpora et non agendo in alia, neceſſario mutabunt ſitum eorum inter ſe. Et hæc perturbatio addita perturbationi, quæ ex linearum inclinatione et inæqualitate oritur, majorem reddet perturbationem totam.

Corol. 3. Unde ſi ſyſtematis hujus partes in ellipſibus, vel circulis ſine perturbatione infigiti moveantur; manifeſtum eſt, quod eædem a viribus acceleratricibus, ad alia corpora tendentibus, aut non urgentur niſi leviſſime, aut urgentur æqualiter, et ſecundum lineas parallelas quamproxime.

PROPOSITIO XXXVIII. THEOREMA XXVII.

Si corpora tria, quorum vires decreſcunt in duplicata ratione diſtantiarum, ſe mutuo trahant; et attractiones acceleratrices binorum quorumcunque in tertium ſint inter ſe reciproce ut quadrata diſtantiarum; minora autem circa maximum revolvantur: dico quod interius circa intimum et maximum, radiis ad ipſum ductis, deſcribet areas temporibus magis proportionales, et figuram ad formam ellipſeos umbilicum in concurſu radiorum habentis magis accedentem; ſi corpus maximum his attractionibus agitetur; quam ſi maximum illud vel a minoribus non attractum quieſcat, vel multo minus vel multo magis attractum, aut multo minus aut multo magis agitetur.

Liquet fere ex demonſtratione corollarii ſecundi propoſitionis præcedentis; ſed argumento magis diſtincto et latius cogente ſic evincitur.

SECTIO SEXTA.

TAB. IX. FIG. 77.

Caſ. 1. Revolvantur corpora minora P et S in eodem plano circa maximum T, quorum P deſcribat orbem interiorem PAB, et S exteriorem ESE. Sit SK mediocris diſtantia corporum P et S; et corporis P verſus S attractio acceleratrix, in mediocri illa diſtantia, exponatur per eandem. In duplicata ratione SK ad SP capiatur SL ad SK, et erit SL attractio acceleratrix corporis P verſus S in diſtantia quavis SP. Junge PT, eique parallelam age LM occurrentem ST in M; et attractio SL reſolvetur (per legum corol. 2.) in attractiones SM, LM. Et ſic urgebitur corpus P vi acceleratrice triplici. Vis una tendit ad T, et oritur a mutua attractione corporum T et P. Hac vi ſola corpus P circum corpus T, ſive immotum, ſive hac attractione agitatum, deſcribere deberet et areas, radio PT, temporibus proportionales, et ellipſin cui umbilicus eſt in centro corporis T. Patet hoc per prop. xiii. et corollaria 2. et 3. theor. xxii. Vis altera eſt attractionis LM, quæ quoniam tendit a P ad T, ſuperaddita vi priori coincidet cum ipſa, et ſic faciet ut areæ etiamnum temporibus proportionales deſcribantur per corol. 3. theor. xxii. At quoniam non eſt quadrato diſtantiæ PT reciproce proportionalis (q), componet ea cum vi priore vim ab hac proportione aberrantem, idque eo magis, quo major eſt proportio hujus vis ad vim priorem, cæteris paribus. Proinde cum (per prop. xiii. et per corol. 2. theor. xxii.) vis, qua ellipſis circa umbilicum T deſcribitur, tendere debeat ad umbilicum illum, et eſſe quadrato diſtantiæ PT reciproce proportionalis; vis illa compoſita, aberrando ab hac proportione, faciet ut orbis PAB aberret a forma ellipſeos umbilicum habentis in T; idque eo magis, quo major eſt aberratio ab hac proportione; atque ideo etiam quo major eſt proportio vis ſecundæ LM ad vim primam, cæteris paribus. Jam vero

(q) 158. Si detur SK mediocris diſtantia corporum P et S, vis LM erit ut $\frac{PT}{SP^3}$; nam ex conſtructione $SL : SK :: SK^2 : SP^2$, ideoque $SL \times SK : SK \times SP$ (id eſt $SL : SP$) $:: SK^3 : SP^3$; ſed $SL : SP :: LM : PT$; ergo $LM : PT :: SK^3 : SP^3$, et $LM = \frac{PT \times SK^3}{SP^3}$, id eſt datâ SK, ut $\frac{PT}{SP^3}$.

vero vis tertia SM, trahendo corpus P ſecundum lineam ipſi ST parallelam, componet cum viribus prioribus vim, quæ non amplius dirigitur a P in T; quæque ab hac determinatione tanto magis aberrat, quanto major eſt proportio hujus tertiæ vis ad vires priores, cæteris paribus: atque ideo quæ faciet ut corpus P, radio TP, areas non amplius temporibus proportionales deſcribat; atque ut aberratio ab hac proportionalitate tanto major ſit, quanto major eſt proportio vis hujus tertiæ ad vires cæteras. Orbis vero PAB aberrationem a forma elliptica præfata hæc vis tertia duplici de cauſa adaugebit, tum quod non dirigatur a P ad T, tum etiam quod non ſit reciproce proportionalis quadrato diſtantiæ PT (r). Quibus intellectis, manifeſtum eſt, quod areæ temporibus tum maxime fiunt proportionales, ubi vis tertia, manentibus viribus cæteris, fit minima; et quod orbis PAB tum maxime accedit ad præfatam formam ellipticam, ubi vis tam ſecunda quam tertia, ſed præcipue vis tertia fit minima, vi prima manente.

Exponatur corporis T attractio acceleratrix verſus S per lineam SN; et ſi attractiones acceleratrices SM, SN æquales eſſent; hæ trahendo corpora T et P æqualiter et ſecundum lineas parallelas nil mutarent ſitum eorum ad invicem. Iidem jam forent corporum illorum motus inter ſe (per legum corol. vi.) ac ſi hæ attractiones tollerentur. Et pari ratione ſi attractio SN minor eſſet attractione SM, tolleret ipſa attractionis SM partem SN, et maneret pars ſola MN, qua temporum et arearum proportionalitas et orbitæ forma illa elliptica perturbaretur. Et ſimiliter ſi attractio SN major eſſet attractione SM, oriretur ex differentia ſola MN perturbatio proportionalitatis et orbitæ (s). Sic per

(r) 159. Si dentur mediocris diſtantia SK et diſtantia ST, erit vis SM ut $\frac{1}{SP^3}$; nam $SM : LM :: ST : PT$, unde $SM = \frac{LM \times ST}{PT}$, ſed (158) $LM = \frac{PT \times SK^3}{SP^3}$, ergo $SM = \frac{ST \times SK^3}{SP^3}$, id eſt, datis SK et ST, ut $\frac{1}{SP^3}$.

(s) 160. Linea per quadraturas C, D ducta orbitam PAB bifariam ſecaret: dum corpus P in eâ orbitæ ſuæ parte quod corpori S proximum eſt verſetur,

SECTIO SEXTA.

per attractionem SN reducitur ſemper attractio tertia ſuperior SM ad attractionem MN, attractione prima et ſecunda manentibus prorſus immutatis: et propterea areæ ac tempora ad proportionalitatem, et orbita PAB ad formam præfatam ellipticam tum maxime accedunt, ubi attractio MN vel nulla eſt, vel quam fieri poſſit minima; hoc eſt, ubi corporum P et T attractiones acceleratrices, factæ verſus corpus S, accedunt quantum fieri poteſt ad æqualitatem; id eſt, ubi attractio SN non eſt nulla, neque minor minima attractionum omnium SM, ſed inter attractionum omnium SM maximam et minimam quaſi mediocris, hoc eſt, non multo major neque multo minor attractione SK. Q.E.D.

Caſ. 2. Revolvantur jam corpora minora P, S circa maximum T in planis diverſis; et vis LM, agendo ſecundum lineam PT in plano orbitæ PAB ſitam, eundem habebit effectum ac prius, neque corpus P de plano orbitæ ſuæ deturbabit. At vis altera NM, agendo ſecundum lineam quæ ipſi ST parallela eſt (atque ideo, quando corpus S verſatur extra lineam nodorum, inclinatur ad planum orbitæ PAB) præter perturbationem motus in longitudinem jam ante expoſitam, inducet perturbationem motus in latitudinem, trahendo corpus P de plano ſuæ orbitæ. Et hæc perturbatio, in dato quovis corporum P et T ad invicem ſitu, erit ut vis illa generans MN, ideoque minima evadet ubi MN eſt minima, hoc eſt (uti jam expoſui) ubi attractio SN non eſt multo major, neque multo minor attractione SK. Q.E.D.

Corol. 1. Ex his facile colligitur, quod, ſi corpora plura minora P, S, R, &c. revolvantur circa maximum T, motus corporis intimi P minime perturbabitur attractionibus exteriorum, ubi corpus maximum T pariter a cæteris, pro ratione virium acceleratricum, attrahitur et agitatur, atque cætera a ſe mutuo.

Corol. 2. In ſyſtemate vero trium corporum T, P, S, ſi attractiones acceleratrices binorum quorumcunque in tertium ſint ad invicem

verſetur, attractio SN minor eſt quam SM; in oppoſitâ parte major eſt quam SM; iiſque in locis, in quibus SP, SK æquantur, coeuntibus K et L, coeunt quoque SM, SN; et ibi attractiones SN, SM æquales fiunt.



Fig. 73





Fig. 74






Fig. 75




Fig 76




Fig. 77

invicem reciproce ut quadrata diſtantiarum; corpus P, radio PT, aream circa corpus T velocius deſcribet prope conjunctionem A et oppoſitionem B, quam prope quadraturas C, D. Namque vis omnis qua corpus P urgetur et corpus T non urgetur, quæque non agit ſecundum lineam PT, accelerat vel retardat deſcriptionem areæ, perinde ut ipſa in conſequentia vel in antecedentia dirigitur. Talis eſt vis NM. Hæc in tranſitu corporis P a C ad A tendit in conſequentia, motumque accelerat; dein uſque ad D in antecedentia, et motum retardat; tum in conſequentia uſque ad B, et ultimo in antecedentia tranſeundo a B ad C (t).

Corol. 3. Et eodem argumento patet quod corpus P, cæteris paribus, velocius movetur in conjunctione et oppoſitione quam in quadraturis (u).

Corol. 4. Orbita corporis P, cæteris paribus, curvior eſt in quadraturis quam in conjunctione et oppoſitione. Nam corpora velociora minus deflectunt a recto tramite. Et præterea vis KL, vel NM, in conjunctione et oppoſitione contraria eſt vi, qua corpus T trahit corpus P; ideoque vim illam minuit; corpus autem P minus deflectet a recto tramite, ubi minus urgetur in corpus T (x).

Corol. 5.

(t) 161. Vis ablatitia MN in motu corporis a quadratura C ad conjunctionem A, agens in directione Pm ipſi ST parallelâ, faciet ut P ad centrum T non tendat, ſed verſus plagam in quam fit motus; contra, in motu a conjunctione A ad quadraturam D, faciet ut P tendat in antecedentia: deſcriptio autem arearum acceleratur, ſi vires declinant in conſequentia; et retardatur, ſi in antecedentia (20). In oppoſitâ parte orbitæ vis ablatitia MN trahens T a P verſus S, diminuit gravitatem ipſius P verſus T, et conſideranda eſt tanquam vis agens in corpus P in contrariâ directione ipſi ST parallelâ; et proinde in tranſitu a D ad B, faciet ut corpus tendat ad centrum in conſequentia, et in tranſitu a B ad C, ad centrum in antecedentia poſitum. TAB. X. FIG. 78.

(u) 162. Reſolvendo vim ablatitiam Pm in duas vires, quarum una Pn agit in directione ipſius TP, altera nm in directione parallela tangenti, vis nm in tranſitu a quadraturis ad ſyzygias, agens in directione quâ movetur corpus, motum ejus accelerat; et in tranſitu a ſyzygiis ad quadraturas, agens in contrariâ directione, motum ejus retardat.

(x) 163. Quò major eſt vis, et quò minor velocitas, eò major eſt curvatura; et contra.

SECTIO SEXTA.

Corol. 5. Unde corpus P, cæteris paribus, longius recedet a corpore T in quadraturis, quam in conjunctione et oppoſitione ([y]). Hæc ita ſe habent excluſo motu excentricitatis. Nam ſi orbita corporis P excentrica ſit, excentricitas ejus (ut mox in hujus corol. 9. oſtendetur) evadet maxima ubi apſides ſunt in ſyzygiis; indeque fieri poteſt ut corpus P, ad apſidem ſummam appellans, abſit longius a corpore T in ſyzygiis quam in quadraturis.

Corol. 6. Quoniam vis centripeta corporis centralis T, qua corpus P retinetur in orbe ſuo, augetur in quadraturis per additionem vis LM, ac diminuitur in ſyzygiis per ablationem vis KL, et ob magnitudinem vis KL, magis diminuitur quam augetur; eſt autem vis illa centripeta (per corol. 2. prop. iv.) in ratione compoſita ex ratione ſimplici radii TP directe et ratione duplicata temporis periodici inverſe: patet hanc rationem compoſitam diminui per actionem vis KL; ideoque tempus periodicum, ſi maneat orbis radius TP, augeri, idque in ſubduplicata ratione, qua vis illa centripeta diminuitur: auctoque ideo vel diminuto hoc radio, tempus periodicum augeri magis, vel diminui minus quam in radii hujus ratione ſeſquiplicata, (per corol. vi. prop.iv.) ([z]). Si vis illa corporis centralis paulatim langueſceret, corpus P minus ſemper et minus attractum perpetuo recederet longius a centro T; et contra, ſi vis illa augeretur, accederet propius. Ergo ſi actio corporis longinqui S, qua vis illa diminuitur, augeatur ac diminuatur per vices: augebitur ſimul ac diminuetur radius TP per vices; et tempus periodicum augebitur ac diminuetur in ratione cempoſita ex ratione ſeſquiplicata radii, et ratione ſubduplicata, qua vis illa centripeta corporis centralis T, per incrementum

([y]) 164. Vis LM qua corpus P ad centrum T impellitur maxima eſt circa quadraturas, minima in ſyzygiis. Motus vero, qui in corpus P per vim addititiam circa quadraturas imprimitur, faciet ut corpus accedat verſus centrum uſque ad ſyzygias: retinet enim corpus motum impreſſum, uſque dum vis ablatitia tollat hunc motum, novumque imprimat in contrariam partem; deinde corpus recedet iterum a ſyzygiis ad quadraturas.

([z]) 165. Vis acceleratrix eſt ut vis abſoluta directè et quadratum diſtantiæ inverſe: quoniam vero vis acceleratrix eſt ut radius directè et quadratum temporis periodici inversè, (ponendo A pro vi acceleratrici, V pro vi abſolutâ, R pro

tum vel decrementum actionis corporis longinqui S, diminuitur vel augetur.

Corol. 7. Ex præmiſſis conſequitur etiam, quod ellipſeos a corpore P deſcriptæ axis, ſeu apſidum linea, quoad motum angularem, progreditur et regreditur per vices, ſed magis tamen progreditur, et per exceſſum progreſſionis fertur in conſequentia. Nam vis qua corpus P urgetur in corpus T in quadraturis, ubi vis MN evanuit, componitur ex vi LM et vi centripeta, qua corpus T trahit corpus P. Vis prior LM, ſi augeatur diſtantia PT, augetur in eadem fere ratione cum hac diſtantia, et vis poſterior decreſcit in duplicata illa ratione, ideoque ſumma harum virium decreſcit in minore quam duplicata ratione diſtantiæ PT ([a]), et propterea (per corol. 1. prop. xxx.) efficit ut aux, ſeu apſis ſumma, regrediatur ([b]). In conjunctione vero et oppoſitione vis, qua

pro radio, et P pro tempore periodico) erit $\frac{V}{R^2} = \frac{R}{P^2}$; et $P^2 = \frac{R^3}{V}$; ideoque $P = \frac{R^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{V}}$.

166. Hinc patet menſes lunares hybernos æſtivis eſſe longiores; quoniam enim in tempeſtate hybernâ tellus in perihelio verſatur, magis diminuitur vis gravitatis quâ cum luna ad centrum telluris tendit quam in æſtate, et proinde dilatatur orbita lunaris: tempus igitur periodicum lunæ augetur in ſeſquiplicatâ ratione diſtantiæ auctæ, et in inversâ ſubduplicatâ vis gravitatis diminutæ.

([a]) 167. Si, creſcente diſtantiâ, addatur vis, quæ variatur in inversâ duplicatâ ratione diſtantiæ, vi varianti in eâdem ratione, ſumma harum virium decreſcet in eâdem illâ ratione duplicatâ. Si vero, creſcente diſtantiâ, addatur vis quæ creſcit ut diſtantia, ſumma major erit quàm in priori caſu; non tanto igitur decremento diminuta, decreſcet ſumma in minori quàm duplicatâ ratione diſtantiæ.

([b]) 168. Vis centrifuga in omni orbitâ variatur inversè ut cubus diſtantiæ (127); ſi vero corpus deſcendere incipiat, in quâcunque demum ratione fingatur creſcere vis centrifuga, corpus nunquam aſcendere incipiet donec ad apſidem perveniat; conatur igitur perpetuò vis centrifuga corpus ad apſidem perducere: quò vero majus eſt diſcrimen inter variationem vis centrifugæ et vis gravitatis, eò citius vis centrifuga valebit ad corpus a centro repellendum, vel ad apſidem perducere, ſi unquam repellere vel ad apſidem perducere poteſt. Si vis gravitatis ſit in inversâ duplicatâ ratione diſtantiæ, vis centrifuga valet ad corpus a centro repellendum poſtquam angulum graduum 180 deſcripſerit:

Sectio Sexta.

qua corpus P urgetur in corpus T, differentia eſt inter vim, qua corpus T trahit corpus P, et vim KL; et differentia illa, propterea quod vis KL augetur quamproxime in ratione diſtantiæ PT, decreſcit in majore quam duplicata ratione diſtantiæ PT (c), ideoque (per corol 1. prop. xxx.) efficit ut aux progrediatur (d). In locis inter ſyzygias et quadraturas (e) pendet motus augis ex cauſa utraque conjunctim, adeo ut pro hujus vel alterius exceſſu progrediatur ipſa vel regrediatur. Unde cum vis KL in ſyzygiis ſit quaſi duplo major quam vis LM in quadraturis, exceſſus erit penes vim KL, transferetque augem in conſequentia. Veritas autem hujus et præcedentis corollarii facilius intelligetur concipiendo ſyſtema corporum duorum T, P corporibus pluribus S, S, S, &c, in orbe ESE conſiſtentibus, undique cingi. Namque horum actionibus actio ipſius T minuetur undique, decreſcetque in ratione pluſquam duplicata diſtantiæ.

Corol. 8.

rit: ſi vis gravitatis ſit in minori ratione, citius prævalebit vis centrifuga, et corpus ad apſidem perveniet in minori quàm dimidiâ revolutione. (Vid. 145.)

(c) 169. Vis, compoſita ex vi ablatitiâ quæ variatur directè ut diſtantia, et vi gravitatis quæ variatur inversè in ratione illâ duplicatâ, decreſcente diſtantiâ, plus augetur quàm ſi vis ablatitia eſſet inversè ut quadratum diſtantiæ; vis enim ablatitia quæ variatur inversè ut quadratum diſtantiæ magis augetur, decreſcente diſtantiâ, quàm ſi vis illa eſſet directè ut diſtantia; et contra.

(d) 170. Si vis centripeta ſit in majori quàm in inversâ duplicata ratione diſtantiæ, vis centrifuga in deſcenſu ad centrum difficilius gravitatem ſuperabit, nec valebit ad corpus a centro repellendum niſi poſt partem revolutionis pluſquam dimidiam; progrediuntur igitur apſides in plagam eandem quâ movetur corpus. (Vid. 145.)

(e) 171. LEMMA. *Sint* $a \pm b$ *et* a *duæ quantitates, quarum differentia* b *quàm minima eſt reſpectu quantitatum; erit* $2ab \pm b^2$, *differentia quadratorum harum quantitatum, ad* a^2, *ut* $2b$, *differentia bis ſumpta, ad* a. Nam $2ab : a^2 :: 2b : a$, et $2ab \pm b^2 = 2ab$ quamproximè, per hypotheſin; unde $2ab \mp bb : a^2 :: 2b : a$.

Tab. X. Fig. 79.

172. Si diſtantia mediocris SK ingens fuerit reſpectu radii TP, lineæ SL SM pro parallelis haberi poſſunt, et NM vel $TM = PL$. Sed ex conſtructione $SL : SK :: SK^2 : SP^2$, ideoque $SL : KL :: SK^2 : SK^2 - SP^2$; ſed per lemma $SK^2 : SK^2 - SP^2 :: SK$ vel $SL : 2PK$ quamproximè, quare $KL = 2PK$, et NM vel $PL = 3PK$.

173. Si igitur vis LM ſit ut PT, ML eſt ad NM ut ſinus totus ad triplum ſinum diſtantiæ angularis corporis P a quadraturâ proximâ.

Corol. 8. Cum autem pendeat apſidum progreſſus vel regreſſus a decremento vis centripetæ facto in majori vel minori quam duplicata ratione diſtantiæ TP, in tranſitu corporisab apſide ima ad apſidem ſummam; ut et a ſimili incremento in reditu ad apſidem imam; atque ideo maximus ſit ubi proportio vis in apſide ſumma ad vim in apſide ima maxime recedit a duplicata ratione diſtantiarum inverſa: manifeſtum eſt quod apſides in ſyzygiis ſuis, per vim ablatitiam KL ſeu $NM - LM$, progredientur velocius, inque quadraturis ſuis tardius recedent per vim addititiam LM. Ob diuturnitatem vero temporis, quo velocitas progreſſus vel tarditas regreſſus continuatur, fit hæc inæqualitas longe maxima.

Corol. 9. Si corpus aliquod, vi reciproce proportionali quadrato diſtantiæ ſuæ a centro, revolveretur circa hoc centrum in ellipſi; et mox, in deſcenſu ab apſide ſumma ſeu auge ad apſidem imam, vis illa per acceſſum perpetuum vis novæ augeretur in ratione pluſquam duplicata diſtantiæ diminutæ: manifeſtum eſt quod corpus, perpetuo acceſſu vis illius novæ impulſum ſemper in centrum, magis vergeret in hoc centrum, quam ſi urgeretur vi ſola creſcente in duplicata ratione diſtantiæ diminutæ; ideoque orbem deſcriberet orbe elliptico interiorem, et in apſide ima propius accederet ad centrum quam prius. Orbis igitur, acceſſu hujus vis novæ, fiet magis excentricus. Si jam vis, in receſſu corporis ab apſide ima ad apſidem ſummam, decreſceret iiſdem gradibus quibus ante creverat, rediret corpus ad diſtantiam priorem, ideoque ſi vis decreſcat in majori ratione, corpus jam minus attractum aſcendet ad diſtantiam majorem et ſic orbis excen-

174. Cum vero LM ſeu vis addititia eſt ubique ut radius PT, eſt vis ablatitia in ſyzygiis ad vim addititiam in quadraturis ut $3PT - PT$ ad PT, ſeu ut 2 ad 1; nam in ſyzygiis $3PK = 3PT$.

175. Si quæratur locus inter quadraturas et ſyzygias in quo vis ablatitia et vis addititia ſunt æquales, fiat $Pm = 3PK$, et reſolvatur hæc in duas mn et Pn, quarum Pn ſit radio PT æqualis: erit, (ob ſimilia triangula Pmn, TPK,) Pm ceu $3PK$: Pn ceu PT :: PT : PK; quare $3PK^2 = PT^2$, et PT : PK :: $\sqrt{3}$: 1, ceu ut 1732 ad 1000; in quo caſu angulus $PTC = 35^\circ\ 26'$ circiter.

SECTIO SEXTA.

centricitas adhuc magis augebitur. Quare ſi ratio incrementi et decrementi vis centripetæ ſingulis revolutionibus augeatur, augebitur ſemper excentricitas; et contra, diminuetur eadem, ſi ratio illa decreſcat (f). Jam vero in ſyſtemate corporum *T*, *P*, *S*, ubi apſides orbis *PAB* ſunt in quadraturis, ratio illa incrementi ac decrementi minima eſt, et maxima fit ubi apſides ſunt in

(f) 176. Fingamus vim addi quæ variatur ut diſtantia a centro, ſumma variabitur in minori quam duplicata ratione diſtantiæ (167), corpuſque ad diſtantiam ſuam minimam vel apſidem perveniet, priuſquam angulum 180 graduum confecerit (168); ſin fingatur vis addititia variari inverſe ut diſtantiæ quadratum, corpus ad apſidem perveniet, poſtquam angulum graduum 180 deſcripſerit; quoniam vero tempora perveniendi ad apſidem in utroque caſu æqualia ſunt, viriumque centripetarum ſumma in poſteriori caſu major eſt quam in priori, conſtat eorundem effectum in apſidibus imis, vel effectum in æqualibus temporibus productum, majorem eſſe quando virium centripetarum ſumma major evadat; hoc eſt, diſtantia a foco in apſide ima minor erit ſi vis addititia creſcat ut diſtantiæ quadratum inverſe, quam ſi in directa ratione diſtantiæ creſcere ponatur. Deſcribatur ellipſis, cujus diſtantia maxima eſt diſtantia corporis in orbita ab apſide ſumma, et minima, diſtantia ab apſide ima, quando vis addititia ut diſtantia creſcit, ut inveniatur orbitæ mobilis forma; et patebit excentricitatem hujuſce ellipſeos minorem eſſe excentricitate illius, quæ deſcribitur vi creſcente in inversâ duplicatâ ratione diſtantiæ.

Addatur vis, quæ variatur in majori quam inversâ duplicata ratione diſtantiæ, corpuſque angulum majorem angulo graduum 180 deſcribet, et ad minorem diſtantiam deſcendet, priuſquam ad apſidem vis centrifuga perducere potis ſit, ob ſummam virium centripetarum in hoc caſu majorem (170). Capiatur ut prius diſtantia ab apſide ſumma, et diſtantia ab apſide imâ, et his diſtantiis deſcribatur ellipſis, ut inveniatur orbitæ mobilis forma, et excentricitas hujuſce ellipſeos major erit quam prioris.

Auferatur vis creſcens in ratione pluſquam duplicata diſtantiæ, reſiduum variabitur in minori quam inversâ duplicata; vel vis, ſi corpus deſcendere incipiat, minor erit quam ſi ſubtrahatur vis, quæ eſt inverſe ut quadratum diſtantiæ; et proinde corpus ad apſidem perveniet angulo 180 *gr.* nondum deſcripto. Et diſtantia ejus ab apſide major erit quam ſi ſubtraheretur vis creſcens in duplicata ratione diſtantiæ. Deſcribatur igitur ellipſis, cujus diſtantia maxima eſt diſtantia corporis in orbitâ ab apſide ſummâ, et minima, diſtantia ab apſide imâ, ut inveniatur orbitæ mobilis forma, et excentricitas minor erit quam in orbita, quæ deſcriberetur ſi vis ablatitia in ratione duplicatâ diſtantiæ creviſſet.

Sit vis ablatitia in minore quam duplicata ratione diſtantiæ inversâ, vel ut ipſa diſtantia creſcat, et reſiduum erit majus quam in caſu priori, et in ratione majori variabitur; corpuſque hâc vi agitatum orbitam deſcribens, cujus apſides in conſequentiâ feruntur, propius accedet ad centrum, priuſquam illud vis centrifuga

in ſyzygiis (g). Si apſides conſtituantur in quadraturis, ratio prope apſides minor eſt et prope ſyzygias major quam duplicata diſtantiarum, et ex ratione illa majori oritur augis motus directus uti jam dictum eſt. At ſi conſideretur ratio incrementi vel decrementi totius in progreſſu inter apſides, hæc minor eſt quam duplicata diſtantiarum. Vis in apſide ima eſt ad vim in apſide ſumma

trifuga ad apſidem perducere potis ſit. Deſcribatur ut prius ellipſis diſtantiis ab apſidibus pro maximâ et minimâ diſtantiâ, ut inveniatur orbitæ mobilis forma, et excentricitas hujuſce ellipſeos major erit quam in caſu priori.

Attamen notandum eſt, nos non comparare orbitam, quæ vi addititicâ vel ablatitiâ deſcribetur, cum orbitâ quæ deſcriberetur nulla vi additicia vel ablatitiâ agente: ſolummodo vero comparamus orbitam, quæ deſcribitur vi additicia vel ablatitia variantibus in minori quam duplicata ratione inversâ, cum orbitis quæ viribus additicis vel ablatitiis, in ratione duplicata vel pluſquam duplicata inversâ creſcentibus, deſcriberentur; et ex præmiſſis conſequitur, excentricitatis mutationem eo eſſe majorem vel minorem, quo magis vel minus vires ablatitiæ et addititicæ ſummam vel reſiduum virium centripetarum ab inverſa duplicata ratione diſtantiæ recedere cogant. Si enim excentricitas orbitæ, quæ deſcribitur vi ablatitia varianti ut diſtantia, major ſit quam ſi vis illa ablatitia foret in inverſa duplicata ratione diſtantiæ; patet, quo magis vis ablatitia vim centripetam ab inversâ duplicata ratione diſtantiæ recedere cogat, eo majorem eſſe excentricitatis variationem; vel ut Newtoni verba uſurpemus, ſi ratio incrementi et decrementi ſingulis revolutionibus augeatur, augebitur excentricitas; et contra, diminuetur eadem, ſi ratio illa decreſcat.

(g) 177. Quandocunque apſides in quadraturis conſtituuntur, lex vis centripetæ ab inversâ duplicatâ ratione diſtantiæ minus deflectit, quam in alio quocunque eorum ſitu. Attamen quamvis in hoc caſu vis centripeta in majori quam inversâ duplicatâ ratione diſtantiæ augeatur in deſcenſu corporis ab apſide ſumma ad apſidem imam, et exinde ſequatur apſides etiam nunc, motu ſcilicet lentiſſimo, progredi debere (170), atque excentricitatem majorem fieri quam ſi vis in ipsâ duplicatâ ratione variaretur; conſtat tamen, vim centripetam minus ab hac lege deflectere in hoc apſidum ſitu, quam in alio quolibet; ideoque (quoniam excentricitas ex variatione vis pendeat per not. 176) excentricitatem magis magiſque augeri prout apſides a quadraturis recedunt. Hæc a Newtono ſic demonſtrari videntur. Patet in cor. VII. vim KL in ſyzygiis quaſi duplo majorem eſſe vi LM in quadraturis, ideoque exceſſum earum virium ſemper eſſe verſus vim KL, reſiduumque vis centripetæ et hujuſce exceſsûs, in tranſitu corporis ab apſide ſummâ ad apſidem imam, eſſe in majori quam inversâ duplicata ratione diſtantiæ. Quum igitur vis centripeta ab inversâ duplicata ratione in ullo apſidum ſitu deflectit, oſtendendum eſt, eam minus in hoc apſidum ſitu ab eâ lege deflectere, quam in ullo alio: ſubtrahamus ſigillatim vires additicias a viribus ablatitiis in

diverſis

SECTIO SEXTA.

ſumma in minore quam duplicata ratione diſtantiæ apſidis ſummæ ab umbilico ellipſeos ad diſtantiam apſidis imæ ab eodem umbilico: et contra, ubi apſides conſtituuntur in ſyzygiis, vis in apſide ima eſt ad vim in apſide ſumma in majore quam duplicata ratione diſtantiarum. Nam vires LM in quadraturis additæ viribus corporis T componunt vires in ratione minore, et vires KL in ſyzygiis ſubductæ a viribus corporis T relinquunt vires in ratione majore. Eſt igitur ratio decrementi et incrementi totius, in tranſitu inter apſides, minima in quadraturis, maxima in ſyzygiis: et propterea in tranſitu apſidum a quadraturis ad ſyzygias perpetuo augetur, augetque excentricitatem ellipſeos; inque tranſitu a ſyzygiis ad quadraturas perpetuo diminuitur, et excentricitatem diminuit.

Corol. 10. ([h]) Ut rationem ineamus errorum in latitudinem, fingamus planum orbis EST immobile manere; et ex errorum expoſita diverſis revolutionibus, et patet differentiam earum eſſe minimam in eâ revolutione, in qua vires addititicæ maximæ evadunt vireſque ablatitiæ minimæ; et ſatis quoque conſtat, deflectionem vis centripetæ a ratione duplicata eſſe in eâ revolutione minimam. Vires autem addititicæ tum ſunt maximæ, cum in ſemirevolutione ab apſide ſummâ ad apſidem imam vis ab inversâ duplicatâ ratione diſtantiæ longiſſime recedit, *i. e.* in apſidum quadraturis; ibi enim, ſi in hoc tranſitu conſideretur ratio totius incrementi vel decrementi, â vi centripetâ et vi additicia oriunda, minor ea evadit quam in inversâ duplicatâ ratione diſtantiæ; aberratio tamen ab eâ ratione major erit, quo diſtantiarum inæqualitas fit major. Similiter ſi in eodem tranſitu conſideretur ratio incrementi, a vi centripetâ et vi ablatitiâ oriunda, hæc major evadit quam in inversâ duplicatâ ratione diſtantiarum; atque aberratio ab eâ ratione nunc quoque major erit, quo diſtantiarum inæqualitas ſit major. His præmiſſis facile conſtat, quoniam vires addititicæ maximæ ſunt, vireſque ablatitiæ minimæ, quando apſides in quadraturis locantur, differentiam earum in hoc ſitu, ob cauſas utraſque, minimam eſſe; eandemque differentiam maximam eſſe, quando apſides in ſyzygiis conſtituantur, quoniam ibi vires addititicæ maximæ ſunt, vires vero ablatitiæ minimæ; conſtat præterea rationem incrementi vel decrementi vis centripetæ augeri perpetuo, in tranſitu apſidum a quadraturis ad ſyzygias, et in tranſitu a ſyzygias ad quadraturas diminui.

([h]) 178. Orbitam PAB linea nodorum in duos ſemicirculos dirimit, quorum uterque binas habet facies, alteras plano EST inclinatas, alteras reclinatas; et quanquam vis MN agit ſemper ſecundum rectas plano EST parallelas, dicemus tamen in ſequentibus agere eam *ad* planum vel *a* plano EST, prout ab

expoſita cauſa manifeſtum eſt, quod ex viribus *NM*, *ML*, quæ ſunt cauſa illa tota, vis *ML* agendo ſemper ſecundum planum orbis *PAB*, nunquam perturbat motus in latitudinem; quodque vis *NM*, ubi nodi ſunt in ſyzygiis, agendo etiam ſecundum idem orbis planum, non perturbat hos motus; ubi vero ſunt in quadraturis, eos maxime perturbat, corpuſque *P* de plano orbis ſui perpetuo trahendo, minuit inclinationem plani in tranſitu (i) corporis a quadraturis ad ſyzygias, augetque viciſſim eandem in tranſitu

ab *inclinatâ* vel *reclinatâ* facie immediate dirigatur. Dicemus etiam motum corporis *P* fieri *ad* planum vel *a* plano *EST*, prout corpus illud ad nodum proximum, vel a nodo proximo tendit. His præmiſſis effata quædam proferemus, quibus ad corollaria 10 et 11 aditus ampliſſimus pateat, quæ alias vix aut ne vix quidem intelligi poſſunt.

Reg. 1. Si vis *MN* et motus corporis *P* ejuſdem fuerint affectionis, *h. e.* ſi fiat uterque *ad* planum vel *a* plano *EST*, inclinatio orbitæ *PAB* ceu angulus inclinationis perpetuo augebitur, alias minuetur. Ex. gratia. Si corpus *P*, in linea *AT* deſcendens *ad* planum *ETe*, vel in lineâ *TA* aſcendens *a* plano *ETe*, trahatur vi *Aa* vel *Tt*, quæ *ad* planum vel *a* plano dirigitur, completo parallelogrammo *AatT* diagonalis *At* vel *Ta* magis inclinatur verſus planum *ETe*, quam *AT*; id eſt, angulus *ABe* vel *aTe* major eſt quam *ATe*, ceu angulus inclinationis augetur. Si autem corpus, in lineâ *AT* deſcendens *ad* planum vel in lineâ *TA* aſcendens *a* plano, trahatur vi *Aa* vel *Tt*, angulus *ABe* in primo caſu minor eſt quam *ATe*, et in ſecundo *aTe* minor quam *ATe*, ceu angulus inclinationis minuitur.

Tab. X. Fig. 80, 81.

Fig. 82, 83.

Reg. 2. Vis *MN* et motus corporis *P* ejuſdem ſunt affectionis in locis orbitæ *PAB* oppoſitis, et propterea quicquid præſtant in uno ſemicirculo idem præſtabunt in altero; patet per not. 161.

Reg. 3. Linea quadraturarum fertur in conſequentia eadem velocitate cum lineâ ſyzygiarum, idque ſive motus iſte motui corporis *S* circum *T* vel *T* circum *S* debeatur.

Reg. 4. Inter quadraturas et nodum proximum vis *MN* agit *a* plano *EST* aliis in locis *ad* planum: — nam inter quadraturas et nodum proximum a *reclinata* facie dirigitur, aliis in locis ab *inclinata*.

Reg. 5. Si vis *MN* agat *ad* planum *EST* nodi regrediuntur, alias progrediuntur; ideoque per reg. 4. inter quadraturas et nodum proximum nodi progrediuntur, aliis autem in locis regrediuntur.

(i) 179. In tranſitu a quadraturis ad ſyzygias vis *MN* agit *ad* planum *EST*, corpus autem *P* *a* plano movetur, ideoque per reg. 1. angulus inclinationis minuitur; in tranſitu vero a ſyzygiis ad quadraturas, vis *MN* et motus corporis ejuſdem ſunt affectionis, ideoque angulus inclinationis augetur.

SECTIO SEXTA.

tranſitu a ſyzygiis ad quadraturas ([k]). Unde fit ut corpore in ſyzygiis exiſtente inclinatio evadat omnium minima, redeatque ad priorem magnitudinem circiter, ubi corpus ad nodum proximum accedit. At ſi nodi conſtituantur in octantibus poſt quadraturas, id eſt, inter *C* et *A*, *D* et *B*, intelligetur ex modo expoſitis, quod, in tranſitu corporis *P* a nodo alterutro ad gradum inde nonageſimum, ([l]) inclinatio plani perpetuo minuitur; deinde in tranſitu per proximos 45 gradus, uſque ad quadraturam proximam, inclinatio augetur, et poſtea denuo in tranſitu per alios 45 gradus, uſque ad nodum proximum, diminuitur. Magis itaque diminuitur inclinatio quam augetur, et propterea minor eſt ſemper in nodo ſubſequente quam in præcedente. Et ſimili ratiocinio, inclinatio magis augetur, quam diminuitur, ubi nodi ſunt in octantibus alteris inter *A* et *D*, *B* et *C*. Inclinatio igitur ubi nodi ſunt in ſyzygiis eſt omnium maxima ([m]). In tranſitu eorum a ſyzygiis ad quadraturas, in ſingulis corporis ad nodos ap-

([k]) 180. Hinc patet, longitudines heliocentricas planetarum in æqualibus a nodis diſtantiis non ſemper eaſdem manere, ſi ratio illarum habeatur in diverſis revolutionibus ejuſdem planetæ. Nam, ob actionem cæterorum, unuſquiſque planeta in limitibus ſuis modo proprius accedit ad eclipticam, modo longius a plano illo recedit.

([l]) 181. Per hos 90° minuitur inclinatio quoniam vis *MN* agit *ad* planum, corpus autem *a* plano movetur (per reg. 1); ſed per proximos 45° augetur, quoniam vis et motus ejuſdem ſunt affectionis; ac denuo in tranſitu per alios 45° minuitur, quoniam motus corporis *P* eſt *ad* planum, vis vero *MN* agit *a* plano.

([m]) 182. Si conſideratur effectus planetæ cujuſvis, motum aliorum in latitudinem perturbantis, patet, diſtantiam planorum in limitibus planetæ, cujus motus perturbatur, minimam fore, quando ipſe planeta, ſol, et planeta perturbans, in ſyzigiis ſuis, nodique in quadraturis verſantur. Idem etiam de ſole, motum lunæ in latitudinem perturbante, intelligendum eſt. Motus vero non omnino perturbabitur, ſi planeta perturbans in plano motus planetæ inferioris verſetur: hoc eſt, ſi nodi in ſyzigiis conſtituantur: eritque in hoc caſu, ſi lunæ motus conſideretur, heliocentrica latitudo, cæteris paribus, maxima. Quoniam vero, ob diverſum planetarum ſitum, alii alios ad planum eclipticæ attrahunt, dum alii illos a plano recedere cogant, eorundem effectus maximos, in ſyſtemate plurium corporum, non niſi calculo prælongo determinare licet.

appulſibus, diminuitur; fitque omnium minima, ubi nodi ſunt in quadraturis, et corpus in ſyzygiis: dein creſcit iiſdem gradibus, quibus antea decreverat; nodiſque ad ſyzygias proximas appulſis, ad magnitudinem primam revertitur.

Corol. 11. Quoniam corpus *P*, ubi nodi ſunt in quadraturis, perpetuo trahitur de plano orbis ſui, idque in partem verſus *S* in tranſitu ſuo a nodo *C* per conjunctionem *A* ad nodum *D*; et in contrariam partem in tranſitu a nodo *D* per oppoſitionem *B* ad nodum *C*: manifeſtum eſt, quod in motu ſuo a nodo *C* corpus perpetuo recedit ab orbis ſui plano primo *CD*, uſque dum perventum eſt ad nodum proximum; ideoque in hoc nodo, longiſſime diſtans a plano illo primo *CD*, tranſit per planum orbis *EST* non in plani illius nodo altero *D*, ſed in puncto quod inde vergit ad partes corporis *S*, quodque proinde novus eſt nodi locus in anteriora vergens. Et ſimili argumento pergent nodi recedere in tranſitu corporis de hoc nodo in nodum proximum. Nodi igitur in quadraturis conſtituti perpetuo recedunt; in ſyzygiis, ubi motus in latitudinem nil perturbatur, quieſcunt; in locis intermediis, conditionis utriuſque participes, recedunt tardius: ideoque, ſemper vel retrogradi, vel ſtationarii ſingulis revolutionibus feruntur in antecedentia (n).

Corol. 12. Omnes illi in his corollariis deſcripti errores ſunt paulo majores in conjunctione corporum *P*, *S*, quam in eorum oppo-

(n) 183. Si nodi conſtituantur in quadraturis, vis *MN* trahens corpus *P* perpetuò de plano orbis ſui *CD* verſus planum orbis *EST*, faciet ut *P* citius perveniat ad planum *EST*, quàm ſi tali vi non omnino agitetur; tranſibit igitur per planum illud in nodo quod vergit in antecedentia nodi prioris *D*; et ſimili argumento recedent perpetuò nodi in oppoſitâ parte orbitæ (178. Reg. 25). Si conſtituantur nodi in octantantibus inter *C* et *B*, *D* et *A*, regredientur per gradus 135 in tranſitu a *C* ad nodum proximum; deinde in tranſitu per gradus 45 a nodo ad quadraturam *D* progredientur; ſimiliter in oppoſitâ parte orbitæ regredientur perpetuò in tranſitu ipſius *P* per gradus 135, progredientur vero in tranſitu per alios 45: et exceſſu regreſſus ſuper progreſſum ſingulis revolutionibus ferentur in antecedentia. Si nodi ſint in ipſis ſyzygiis, vis *MN* agens in plano orbis *CAD*, nullos inducet errores in latitudinem; et nodi per totam revolutionem quieſcent, niſi quatenus declinant ab hoc ſitu ob motum corporis *S* circum *T*, vel *T* circum *S*: deinde recedent ſingulis revolutionibus, tardius quidem prope ſyzygias, velocius vero prope quadraturas.

SECTIO SEXTA.

oppoſitione; idque ob majores vires generantes *NM* et *ML* (°).

Corol. 13. Cumque rationes horum corollariorum non pendeant a magnitudine corporis *S*, obtinent præcedentia omnia, ubi corporis *S* tanta ſtatuitur magnitudo, ut circa ipſum revolvatur corporum duorum *T* et *P* ſyſtema. Et ex aucto corpore *S*, auctaque ideo ipſius vi centripeta, a qua errores corporis *P* oriuntur evadent errores illi omnes, paribus diſtantiis, majores in hoc caſu quam in altero, ubi corpus *S* circum ſyſtema corporum *P* et *T* revolvitur.

Corol. 14. Cum autem vires *NM*, *ML*, ubi corpus *S* longinquum eſt, ſint quamproxime ut vis *SK* et ratio *PT* ad *ST* conjunctim, hoc eſt, ſi detur tum diſtantia *PT*, tum corporis *S* vis abſoluta, ut *ST cub.* reciproce; ſint autem vires illæ *NM*, *ML* cauſæ errorum et effectuum omnium, de quibus actum eſt in præcedentibus corollariis: manifeſtum eſt, quod effectus illi omnes, ſtante corporum *T* et *P* ſyſtemate, et mutatis tantum diſtantia *ST* et vi abſoluta corporis *S*, ſint quamproxime in ratione compoſita ex ratione directa vis abſolutæ corporis *S*, et ratione triplicata inverſa diſtantiæ *ST*. Unde ſi ſyſtema corporum *T* et *P* revolvatur circa corpus longinquum *S*; vires illæ *NM*, *ML*, et earum effectus erunt (per corol. 2. et 6. prop. IV.) reciproce in duplicata ratione temporis periodici. Et inde etiam, ſi magnitudo corporis *S* proportionalis ſit ipſius vi abſolutæ, erunt vires illæ *NM*, *ML*, et earum effectus directe ut cubus diametri apparentis longinqui corporis *S* e corpore *T* ſpectati, et vice verſa (ᵖ). Nam-

(°) 184. Si orbita *PAB* circularis ſit vel circulari finitimus, vis *LM* in conjunctione eſt ad vim eandem in oppoſitione in ratione triplicatâ diſtantiarum *SP* inverſè. Nam (158) vis *LM* eſt ut $\frac{PT}{SP^3}$; id eſt, datâ *PT*, ut $\frac{1}{SP^3}$.

185. Vis *MN* in conjunctione eſt ad *MN* in oppoſitione, ut *SB* ad *SA*; in conjunctione enim $SM : ST :: ST^2 : SA^2$, ideoque MT vel $MN : ST :: ST^2 - SA^2 : SA^2$ id eſt (171) $:: 2AT : SA$; in oppoſitione vero $ST : SM :: SB^2 : ST^2$, ideoque $ST : TM$ vel $MN :: SB^2 : SB^2 - ST^2$ id eſt (171) ut $SB : 2TB$; quare conjunctis rationibus *MN* in priori caſu, eſt ad *MN* in poſteriori, ut $2AT \times SB$, ad $2TB \times SA$, id eſt, ut $SB : SA$.

TAB. X. FIG. 84.

* (ᵖ) 186. Quo melius intelligantur ea quæ in hoc corollario tradita ſunt, longitudines *LM*, *MN*, quibus vires omnes perturbatrices corporis *P* exponuntur,

Namque hæ rationes eædem ſunt, atque ratio ſuperior compoſita.

Corol. 15. Et quoniam ſi, manentibus orbium ESE et PAB forma proportionibus et inclinatione ad invicem, mutetur eorum magnitudo, et ſi corporum S et T vel maneant, vel mutentur vires

ponuntur, primo ſunt inveſtigandæ. Nam ſi detur diſtantia ST, accipi poteſt longitudo SK æqualis ipſi ST; quo in caſu erit etiam LM in mediocri ſuâ quantitate æqualis diſtantiæ PT; ſin augeatur diſtantia ST, neceſſe erit ut minuatur longitudo SK; adeoque neque longitudines SK, ST, neque longitudines LM, PT amplius pro æqualibus habendæ ſunt, ſed eruenda eſt longitudo LM ex ſimilibus triangulis SLM, SPT per ſequentem analogiam, nempe $SP : PT :: SL : LM$, ideoque $LM = \frac{SL \times PT}{SP}$. Verum quoniam SL nunc major eſt, nunc minor quam SK, et ab eadem SK nunquam aberrat ſenſibiliter, exponatur SL per mediocrem ſuam quantitatem SK, et ſimiliter SP per ST, et prodibit longitudo $LM = \frac{SK \times PT}{ST}$.

Jam vero ut exquiramus longitudinem MN, jungatur KN, et ad rectam ST perpendiculares ducantur LX, PI, et ſi orbita PAB circularis ſit, vel propemodum circularis, æquales erunt SK, SN, et anguli SKN, SNK tantum non erunt recti propter angulum ad S tantum non evaneſcentem : quare rectæ KN et LX pro parallelis habendæ ſunt, ut et rectæ KL, NX pro æqualibus et parallelis : ſed et rectæ SP, SI erunt etiam æquales ob angulum ad I rectum; quare cum ſit $SK : SL :: SP^2 : ST^2$, erit etiam $SK : SL :: SI^2 : ST^2 :: SI : SI + 2IT$, et dividendo $SK : KL :: SI : 2IT$; prodit ergo KL vel $NX = \frac{SK \times 2IT}{SI} = \frac{SK \times 2IT}{ST}$. Rurſus, propter ſimilia triangula SLM et SPT, LMX et PTI, erit $MX : IT :: LM : PT :: SL : SP$; quare MX æquatur $\frac{SL \times IT}{SP} = \frac{SK \times IT}{ST}$; quare longitudo MN ſeu $MX + XN$ erit $\frac{SK \times 3IT}{ST}$. Et univerſaliter LM erit ad MN, ut radius ad triplum coſinus anguli PTS; et in dato ſitu corporum S, T, P, ad invicem, ubi eſt $3IT$ ut PT, ob datum ſpecie triangulum PTI, erit MN ut $SK \times \frac{PT}{ST}$; quare vis LM univerſaliter, et vis MN in integrâ revolutione corporis P circum T, eſt ut $SK \times \frac{PT}{ST}$.

His expeditis, ſit V vis abſoluta attractiva corporis S; et SK erit ut $\frac{V}{ST^2}$, ergo $SK \times \frac{PT}{ST}$, ſeu vires LM, MN erunt ut $V \times \frac{PT}{ST^3}$; unde in dato ſyſtemate

SECTIO SEXTA.

vires in data quavis ratione; hæ vires (hoc eſt, vis corporis T, qua corpus P de recto tramite in orbitam PAB deflectere, et vis corporis S, qua corpus idem P de orbita illa deviare cogitur) agunt ſemper eodem modo, et eadem proportione: neceſſe eſt ut ſimiles et proportionales ſint effectus omnes, et proportionalia effectuum tempora; hoc eſt, ut errores omnes lineares ſint ut orbium diametri, angulares vero iidem qui prius, et errorum linearium ſimilium vel angularium æqualium tempora ut orbium tempora periodica (q).

Corol.

corporum P, T, erunt vires LM, MN ut $\frac{V}{ST^3}$. Sit jam T tempus periodicum corporis T circum S, et per corol. 2. et 6. Prop. 4. erit $\frac{V}{ST^2}$ ut $\frac{ST}{T^2}$, et $\frac{V}{ST^3}$ ut $\frac{1}{T^2}$; ergo in dato ſyſtemate corporum P, T, vires LM, MN ſunt reciproce ut quadratum temporis periodici ſyſtematis circum S revolventis. Poſtremo, ſit D diameter corporis S, et diameter ejus apparens ex centro T ſpectata erit ut $\frac{D}{ST}$, et cubus diametri apparentis ut $\frac{D^3}{ST^3}$. Sunto V et D^3 ſemper proportionales, hoc eſt, magnitudo corporis S et vis abſoluta attractiva vel maneant vel mutentur proportionaliter, eritque $\frac{V}{ST^3}$ ut $\frac{D^3}{ST^3}$; hoc eſt, vires LM, MN erunt ut cubus diametri apparentis corporis S ex centro T ſpectatæ.

* (q) 187. Sit V vis attractiva corporis S, v vis attractiva corporis T, D diameter orbitæ corporis T circum S revolventis, d diameter orbitæ PAB, T tempus periodicum corporis T circum S, t tempus periodicum corporis P circum T, et per *Cor.* 2. *Prop.* 4. erit $\frac{D}{T^2}$ ut V, et $\frac{D}{V}$ ut T^2; unde erit $T^2 : t^2 :: \frac{D}{V} : \frac{d}{v} :: Dv : Vd$, hoc eſt, T^2 erit ad t^2 in ratione compoſitâ ex ratione D ad d et ratione v ad V. Manente orbium proportione mutentur eorum magnitudines, et vel maneant vel mutentur proportionaliter vires V et v, et propter ſervatas rationes componentes inter D et d, et v et V, ſervabitur ratio compoſita inter T^2 et t^2, eritque T ad t in eâdem ratione quâ prius. Tangat jam recta PR orbitam PAB in loco P, et in loco proximo Q age QR diſtantiæ PT parallelam, et quo tempore corpus P ſola vi inſita percurreret tangentem PR, vel addita vi v percurreret arcum quam minimum PQ, eodem tempore idem P totis viribus LM, MN et v percurrat arcum Px, et lineola Qx erit effectus virium LM, MN.

Manentibus

Corol. 16. Unde, ſi dentur orbium forma et inclinatio ad invicem, et mutentur utcunque corporum magnitudines, vires et diſtantiæ; ex datis erroribus et errorum temporibus in uno caſu, colligi poſſunt errores et errorum tempora in alio quovis, quam proxime (r): ſed brevius hac methodo. Vires NM, ML, cæteris

Manentibus orbium formâ, proportione, et inclinatione ad invicem, mutentur eorum magnitudines, ut et magnitudo arcus PQ in eâdem ratione, et vires V et v vel maneant, vel mutentur etiam in datâ aliquâ ratione. Detur poſtremo ſitus tum orbitarum ad invicem, tum corporum S, T, P, in his orbitis, atque ob datum et ſitu et ſpecie triangulum SPT, et datam rationem virium, lineola Qx ſemper erit ſimiliter ſita quoad hoc triangulum. Erunt etiam in hoc caſu vires LM, MN ut vis v, et lineola Qx ut lineola ſimul genita QR, et errores omnes ex lineolâ Qx oriundi, ut Qx vel QR, vel ut diametri orbitarum; atque adeo reddentur proportionales. Denique ob datam rationem inter arcum PQ et totam orbitæ PAB perimetrum, tempus quo generatur Qx erit ut tempus periodicum corporis P circum T, vel corporis T circum S. Sunt itaque errores ſimiles lineares ut orbitarum diametri, et propterea errores angulares ex centro T ſpectati æquales; et errorum linearium ſimilium vel angularium æqualium tempora ſunt ut tempora periodica.

*(r) 188. Sit T tempus periodicum telluris noſtræ circa ſolem, t tempus periodicum lunæ circa centrum telluris, R tempus periodicum jovis circa ſolem, r tempus periodicum ſatellitis alicujus circum-jovialis circa centrum jovis, et propoſitum ſit errores omnes ſatellitis ex analogis erroribus lunaribus ope Corol. 14. et 15. derivare.

Manentibus orbita et tempore periodico ſatellitis, deturbetur *Jupiter* de loco ſuo, et ſtatuatur ad diſtantiam a ſole, quæ ſit ad diſtantiam ſatellitis a centro jovis, ut diſtantia terræ noſtræ a ſole ad diſtantiam lunæ a centro terræ.

Sit S tempus periodicum jovis circa ſolem ad hanc diſtantiam revolventis, eritque per Corol. 15. $r : S :: t : T$; unde $\frac{r}{S} = \frac{t}{T}$, et $\frac{rr}{SS} = \frac{tt}{TT}$. Jam vero ex Corol. 15. manifeſtum eſt errores omnes in motu ſatellitis tempore r commiſſos, æquales eſſe erroribus ſimilibus in motu lunæ commiſſis tempore t. Referat itaque $\frac{tt}{TT}$ quantitates errorum periodicorum lunarium, et huic æqualis $\frac{rr}{SS}$ exhibebit errores analogos æquales in motu ſatellitis. Reſtituatur jam jupiter in locum proprium, et per Corol. 14. mutabuntur quantitates errorum in reciprocâ duplicatâ ratione temporis periodici jovis circa ſolem, hoc eſt, in ratione $\frac{1}{SS}$ ad $\frac{1}{RR}$: quare $\frac{rr}{RR}$ jam exponet quantitates errorum ſatellitis, hoc eſt, errores periodici ſatellitis erunt ad errores analogos lunares ut $\frac{rr}{RR}$ ad $\frac{tt}{TT}$.

Sectio Sexta.

teris ſtantibus, ſunt ut radius TP (s), et harum effectus periodici (per corol. 2. lem. x.) ut vires et quadratum temporis periodici corporis P conjunctim. Hi ſunt errores lineares corporis P; et hinc errores angulares e centro T ſpectati (id eſt, tam motus augis et nodorum, quam omnes in longitudinem et latitudinem errores apparentes) ſunt, in qualibet revolutione corporis P, ut quadratum temporis revolutionis quam proxime. Conjungantur hæ rationes cum rationibus corollarii xiv. et in quolibet corporum T, P, S ſyſtemate, ubi P circum T ſibi propinquum, et T circum S longinquum revolvitur, errores angulares corporis P, de centro T apparentes, erunt, in ſingulis revolutionibus corporis illius P, ut quadratum temporis periodici corporis P directe et quadratum temporis periodici corporis T inverſe. Et inde motus medius augis erit in data ratione ad motum medium nodorum; et motus uterque erit ut tempus periodicum corporis P directe et quadratum temporis periodici corporis T inverſe (t). Augendo vel minuendo excentricitatem et inclinationem orbis PAB non mutantur motus augis et nodorum ſenſibiliter, niſi ubi eædem ſunt nimis magnæ.

Corol. 17. Cum autem linea LM nunc major ſit nunc minor quam radius PT, exponatur vis mediocris LM per radium illum PT; et erit hæc ad vim mediocrem SK vel SN (quam exponere licet per ST) ut longitudo PT ad longitudinem ST. Eſt autem vis mediocris SN vel ST, qua corpus T retinetur in orbe ſuo circum

* (s) 189. Nam vires LM, MN ſunt ut $\frac{SK \times PT}{ST}$, ſed ſi detur ST, dabitur SK ob datam vim abſolutam corporis S, quo in caſu dabitur $\frac{SK}{ST}$, et vires LM, MN erunt ut PT.

* (t) 190. Motus periodici ſunt qui ſpatio unius revolutionis peraguntur, adeoque ſunt ut motus contemporanei et tempora periodica conjunctim; unde fit ut motus contemporanei ſint ut motus periodici directè, et tempora periodica inversè. Sed motus periodici ſunt ut $\frac{tt}{TT}$, ergo motus contemporanei erunt ut $\frac{t}{TT}$.

circum S, ad vim, qua corpus P retinetur in orbe ſuo circum T, in ratione compoſita ex ratione radii ST ad radium PT, et ratione duplicata temporis periodici corporis P circum T ad tempus periodicum corporis T circum S. Et ex æquo, vis mediocris LM ad vim, qua corpus P retinetur in orbe ſuo circum T (quave corpus idem P, eodem tempore periodico, circum punctum quodvis immobile T ad diſtantiam PT revolvi poſſet) eſt in ratione illa duplicata periodicorum temporum ([u]). Datis igitur temporibus periodicis una cum diſtantia PT, datur vis mediocris LM; et ea data, datur etiam vis MN quamproxime per analogiam linearum PT, MN. ([v])

Corol.

([u]) 191. Sit V vis attractiva corporis S, v vis attractiva corporis T; ſit T tempus periodicum corporis T circum S; t tempus periodicum corporis P circum T; et erit vis mediocris $LM : V :: PT : ST$; ſed $V : v :: \frac{ST}{T^2} : \frac{PT}{t^2}$; unde eſt vis mediocris $LM : v :: \frac{PT \times ST}{TT} : \frac{PT \times ST}{tt} :: \frac{1}{TT} : \frac{1}{tt} :: tt : TT$.

([v]) 192. THEOREMA. *Motus omnes lunares, omneſque motuum inæqualitates ex allatis principiis conſequi.* Planetas majores, interea dum circa ſolem feruntur, poſſe alios minores circum ſe revolventes planetas deferre, et minores illos in ellipſibus, umbilicos in centris majorum habentibus, revolvi debere patet per prop. xxxvii. Actione autem ſolis perturbabuntur eorum motus multimode, iiſque adficientur inæqualitatibus quæ in luna noſtra notantur. Hæc utique (per corol. 2, 3, 4, et 5. hujuſce prop.) velocius movetur, ac radio ad terram ducto deſcribit aream pro tempore majorem, orbemque habet minus curvum, atque ideo propius accedit ad terram in ſyzygiis quam in quadraturis, niſi quatenus impedit motus eccentricitatis. Eccentricitas enim maxima eſt (per corol. 9.) ubi apogæum lunæ in ſyzygiis verſatur, et minima ubi idem in quadraturis conſiſtit; et inde luna in perigæo velocior eſt et nobis propior, in apogæo autem tardior et remotior in ſyzygiis quam in quadraturis. Progreditur inſuper apogæum, et regrediuntur nodi, ſed motu inæquabili. Et apogæum quidem (per corol. 7. et 8.) velocius progreditur in ſyzygiis ſuis, tardius regreditur in quadraturis, et exceſſu progreſſus ſupra regreſſum annuatim fertur in conſequentia. Nodi autem (per corol. 11.) quieſcunt in ſyzygiis ſuis, et velociſſime regrediuntur in quadraturis. Sed et major eſt lunæ latitudo maxima in ipſius quadraturis (per corol. 10.) quam in ſyzygiis: et motus medius tardior in perihelio terræ (per corol. 6.) quam in ipſius aphelio. Atque hæ ſunt inæqualitates inſigniores ab aſtronomis notatæ.

Sunt

SECTIO SEXTA.

Corol. 18. Iiſdem legibus, quibus corpus *P* circum corpus *T* revolvitur, fingamus corpora plura fluida circum idem *T* ad æquales ab ipſo diſtantias moveri; deinde ex his contiguis factis conflari annulum fluidum, rotundum ac corpori *T* concentricum; et ſingulæ annuli partes, motus ſuos omnes ad legem corporis

Sunt etiam aliæ quædam a prioribus aſtronomis non obſervatæ inæqualitates, quibus motus lunares adeo perturbantur, ut nulla hactenus lege ad regulam aliquam certam reduci potuerint. Velocitates enim ſeu motus horarii apogæi et nodorum lunæ, et eorundem æquationes, ut et differentia inter eccentricitatem maximam in ſyzygiis et minimam in quadraturis, et inæqualitas quæ variatio dicitur, augentur ac diminuuntur annuatim (per corol. 14.) in triplicata ratione diametri apparentis ſolaris. Et variatio præterea augetur vel diminuitur in duplicata ratione temporis inter quadraturas quam proxime (per corol. 1, et 2. lem. x. et corol. 16. hujuſce prop.) ſed hæc inæqualitas in calculo aſtronomico ad proſthaphæreſin lunæ referri ſolet, et cum ea confundi.

193. PROBLEMA. *Motus inæquales ſatellitum jovis et ſaturni a motibus lunaribus derivare.* Ex motibus lunæ noſtræ motus analogi lunarum ſeu ſatellitum jovis ſic derivantur. Motus medius nodorum ſatellitis extimi jovialis, eſt ad motum medium nodorum lunæ noſtræ, in ratione compoſita ex ratione duplicata temporis periodici terræ circa ſolem ad tempus periodicum jovis circa ſolem, et ratione ſimplici temporis periodici ſatellitis circa jovem ad tempus periodicum lunæ circa terram (per corol. 16.); ideoque annis centum conficit nodus iſte 8 *gr.* 24′. in antecedentia. Motus medii nodorum ſatellitum interiorum ſunt ad motum hujus, ut illorum tempora periodica ad tempus periodicum hujus (per idem corollarium) et inde dantur. Motus autem augis ſatellitis cujuſque in conſequentia eſt ad motum nodorum ipſius in antecedentia, ut motus apogæi lunæ noſtræ ad hujus motum nodorum, (per idem corol.) et inde datur. Diminui tamen debet motus augis ſic inventus in ratione 5 ad 9 vel 1 ad 2 circiter, ob cauſam quam hic exponere non vacat (Vid. Cor. 8.). Æquationes maximæ nodorum et augis ſatellitis cujuſque fere ſunt ad æquationes maximas nodorum et augis lunæ reſpective, ut motus nodorum et augis ſatellitum tempore unius revolutionis æquationum priorum, ad motus nodorum et apogæi lunæ tempore unius revolutionis æquationum poſteriorum (Vid. Cor. 16.). Variatio ſatellitis e jove ſpectati, eſt ad variationem lunæ, ut ſunt ad invicem toti motus nodorum temporibus quibus ſatelles et luna ad ſolem revolvuntur, per idem corollarium; ideoque in ſatellite extimo non ſuperat 5″. 12‴.

194. Hactenus ſatellitum motus deſcripſimus reſpectu ad plana quæ circa ſolem cum primariis ſuis deferuntur. Adjiciantur pauca de proprietatibus ſemitæ, quam ſatelles motu compoſito ex motu ejus circa primarium et primarii circa ſolem in plano immobili deſcribit; poſito quod motus ſatellitis circa primarium, et primarii circa ſolem fiant uniformiter in circulis in eodem plano jacentibus.

pag. 160




Fig. 78




Fig. 79




Fig. 80.




Fig. 82




Fig. 81




Fig. 83




Fig. 84

poris *P* peragendo, propius accedent ad corpus *T*, et celerius movebuntur in conjunctione et oppositione ipsarum et corporis *S*, quam in quadraturis. Et nodi annuli hujus, seu intersectiones ejus cum plano orbitæ corporis *S* vel *T*, quiescent in syzygiis; extra syzygias vero movebuntur in antecedentia, et velocissime quidem

SECTIO SEXTA.

jacentibus. Sit *S* sol, *Aa* orbita primarii, et *L x L* orbita satellitis circa primarium descripta; centro *S* et radio *S L*, cum satelles *L* sit in conjunctione, describatur arcus circuli *Ll*; et si linea *Ll* æqualis sit peripheriæ orbitæ satellitis, et tempus synodicæ revolutionis satellitis, vel tempus quod labitur inter duas conjunctiones proximas, sit æquale tempori quo describit primarius lineam *Aa*, quæ est ad peripheriam orbitæ satellitis ut *SA* ad *S L*, patet semitam satellitis esse epicycloidem, a puncto quovis in peripheria circuli *L x* descriptam, interea dum circulus ille *L x* super basim circularem *L l* revolvitur. Quod si tempus synodicæ revolutionis satellitis non tale sit, erit semita ejus epicyclois quædam descripta a puncto *L* in plano circuli cujusdam dati, interea dum circulus ille super alium quendam circularem basim revolvitur, cujus proprietates a signentibus theorematis innotescunt.

TAB. XI. FIG. 85.

195. THEOREMA. I. *Diameter circularis basis SE est ad diametrum circuli revolventis EA, ut tempus periodicum primarii circa solem, ad tempus synodicum satellitis circa primarium.*

TAB. XI. FIG. 86.

DEM. Sit enim *T* tempus periodicum primarii circa solem, et *t* tempus synodicum satellitis circa primarium, hoc est, tempus quod, ob motum compositum satellitis circa primarium et primarii circa solem, labitur inter duas proximas conjunctiones: sit *S* sol, *Aa* orbita primarii circa solem, *CL* orbita mobilis satellitis *L* circa primarium *A*; et centris *S* et *A* describantur circuli *EeZ*, *EMF* tales, ut dum circulus *EMF* super *EeZ* revolvatur, centro ejus movente cum velocitate quam habet primarius in orbitâ suâ, punctum *L* in plano circuli revolventis veram describat semitam satellitis in plano immobili: describat jam primarius arcum *Aa*, et sumatur $er = EM$, et $mr = eE$; et satelles *L* describet interea arcum *rm* æqualem arcui *Ee*: est igitur angulus *ram*, quem satelles circa primarium revera describit, ad angulum *ESe* vel *ASa*, quem primarius circa solem interea describit, ob æquales arcus subtendentes, inverse ut radius *ar*, vel *AE*, ad *ES*: tempora vero *T* et *t* sunt inverse ut angulares velocitates; ergo erit $T : t :: ES : EA$. Q.E.D.

196. *Cor.* 1. Hinc sequitur esse $AS : AE :: T + t : t$, hoc est, ut tempus periodicum primarii ad tempus periodicum satellitis.

197. *Cor.* 2. Quoniam circulus *EMF* circa punctum *E* revolvat, erit directio tangentis, in quâ movetur perpetuò satelles, ipsi *EL* perpendicularis: et velocitas satellitis ad uniformem velocitatem primarii, ut *EL* ad *EA*.

198. THEOREMA .II. *Capiatur* AB *ipsis* AS *et* AE *tertia proportionalis*; *super* EB *describatur semicirculus* BKE, *occurrens lineæ* EL *in* K; *et producatur* LE *ad punctum* O, *ita ut* LK *sit ad* LE, *ut* LE *ad* LO, *erit* LO *radius osculi ad punctum semitæ* L.

Sectio Sexta.

quidem in quadraturis, tardius aliis in locis. Annuli quoque inclinatio variabitur, et axis ejus ſingulis revolutionibus oſcillabitur, completaque revolutione ad priſtinum ſitum redibit, niſi quatenus per præceſſionem nodorum circumfertur.

Corol.

Dem. Quoniam LE et le perpendiculares ſint ſemitæ in L et l, et productæ occurrant in O, ultima earum interſectio centrum erit curvaturæ. Ducatur qe, quæ producta occurrat LE in V, et jungatur VS; patet angulum $SeV = qea = LEA = SEV$, ideoque angulum $eVE = eSE$, et $EVS = EeS$: ergo SV eſt ultimo ad EV perpendicularis, et $EV : EK :: ES : EB :: AS : AE$; ultimo autem angulus EOe eſt ad angulum EVe (ſeu ESe) ut EV ad EO; hoc eſt, ut $EV \times AE$ (ſeu $EK \times AS$) ut ad $EO \times AE$. Motus angulares linearum LE et EA in ſtatu naſcenti æquantur, ideoque angulus $LEl = AEa$. Ultimo angulus EOe eſt ad angulum LEl ut LE ad LO, et LEl (ceu AEa): $ESe :: AS : AE$, ergo eſt $EOe : ESe :: AS \times LE : AE \times LO$. Sed ex præmiſſis $EOe : ESe :: EK \times AS : EO \times AE$; ergo $EK \times AS : EO \times AE :: AS \times LE : AE \times LO$, unde $EK : EO :: LE : LO$, ideoque $LO : LE :: LE : LK$ convertendo et dividendo. Q. E. D.

199. *Cor.* 1. Si AB major ſit quam AC, LK et LO ad eandem puncti L partem jacebunt, ideoque ſemita Ll erit ubique verſus S concava. Si $AB = AC$, tum in conjunctione evaneſcit curvatura; et ſemita punctum rectitudinis habet. Sin AB minor ſit quam AC, circulis CLD et BKE ſeſe jam interſecantibus, portio quædam ſemitæ, quæ prope conjunctionem eſt, convexa erit verſus S; atque interſectionum loca puncta erunt contrariæ flexuræ.

200. *Cor.* 2. Ex hypotheſi $AE : AS :: p : P$ (poſitis p et P pro temporibus periodicis ſatellitis et primarii) ergo $AB : AS :: p^2 : P^2$. In caſu lunæ noſtræ $p^2 : P^2 :: 1 : 178$, et $AB = \frac{1}{178} \times AS$; ſed $AC = \frac{1}{337} \times AS$ quamproximè, ideoque cum AB major ſit quam AC, orbita lunaris eſt ubique verſus ſolem concava.

201. THEOREMA. III. *Iiſdem poſitis, exprimatur gravitas primarii verſus ſolem per* BA; *et vis, quâ retinetur ſatelles in ſemitâ ſuper planum immobile deſcriptâ, exprimetur per* LB, *et tendet ad punctum* B.

Dem. Componi enim intelligatur vis illa a duabus aliis, quarum una agit in directione LO ad ſemitam perpendiculari, altera vero in directione tangentis ſemitæ: et quoniam vires, quibus corpora in curvas quaſcunque deflectuntur, ſunt ut quadrata velocitatum directè, et ut chordæ illæ curvaturæ quæ per centra virium tranſeunt inversè (42), erit vis prior, quæ agit in directione ad ſemitam perpendiculari ad vim gravitatis primarii verſus ſolem, ut $\frac{EL^2}{LO}$ ad $\frac{EA^2}{AS}$, hoc eſt, ut LK ad AB (198): gravitate igitur primarii dictâ AB, vis prior

tellitis

Corol. 19. Fingas jam globum corporis T, ex materia non fluida conſtantem, ampliari et extendi uſque ad hunc annulum, et alveo per circuitum excavato continere aquam, motuque eodem periodico circa axem ſuum uniformiter revolvi. Hic liquor per vices acceleratus et retardatus (ut in ſuperiore corollario) in ſyzygiis velocior erit, in quadraturis tardior quam ſuperficies globi,

ſatellitis recte exprimitur per LK. Vis altera quæ in ſatellitem in directione tangentis agit, atque a celerat vel retardat motum ejus, eſt ut incrementum velocitatis directè, et ut incrementum temporis inverſe; incrementum temporis eſt ut incrementum ſpatii directè, et ut velocitas inversè, *i. e.* ut $\frac{Aa}{EA} = \frac{Ee}{EB} = \frac{rn}{EB} = \frac{lq \times AE}{EB \times AC} =$ (ſi an et qu ſint perpendiculares ad en et el in n et u, et proinde $lq : lu :: ac : an :: AC : AN$) $= \frac{AE \times lu}{EB \times AN} = \frac{lu}{BK}$: eſt autem lu incrementum velocitatis; et proinde eſt vis ut lu directè, et ut $\frac{lu}{BK}$ inversè, hoc eſt, directe ut BK. Quoniam igitur vis in directione LO agens exprimatur per LK, et vis altera in directione tangentis per BK, vis ex his compoſita rectè exprimetur per LB, et a puncto L ad punctum B tendet. Q. E. D.

202. *Cor.* 1. Si LH ſit æqualis et parallela AB, et ſi compleatur parallelogrammum $LABH$, vis LK componi poteſt ex viribus LH et LA, quarum una LH parallela eſt et æqualis ipſi AB, quæ exprimit gravitatem primarii verſus ſolem, altera vero LA ad primarium tendit, et æqualis eſt gravitati quâ ſatelles circulum circa primarium ſuum deſcriberet in eodem tempore periodico p, ſi nulla eſſet actio ſolis; eſt enim gravitas illa ad AB gravitatem primarii circa ſolem, ut $\frac{AL}{AE^2}$ ad $\frac{AS}{AS^2}$, vel ut AL ad $\frac{AE^2}{AS} = AB$.

203. *Cor.* 2. Hinc ſequitur, omnem vim perturbatricem ſolis in ſatellitem oriri, vel ex inæqualitate actionis ejus in ſatellitem et primarium, vel ex obliquitate directionis: nam ſi ſatelles trahatur verſus ſolem vi LB æquali et parallelâ vi AB, quâ agitatur primarius, revolvet circa primarium cum vi AL eodem modo, ac ſi primarius quieſceret, et actio ſolis tolleretur.

204. *Cor.* 3. Quoniam in caſu lunæ AB ſemper major eſt quàm AC, luna in conjunctione plus attrahitur verſus ſolem quàm verſus tellurem; non tamen ob hanc cauſam relinquit tellurem; nam velocitas ejus abſoluta multò major eſt quàm quæ ſufficit ut corpus deſcribat circulum, ſi agitetur a vi quæ eſt differentia inter vires AB, AC; luna igitur recedet a ſole donec perventum eſt ad oppoſitionem, et poſtea agitata ſummâ virium AB, AC, accedet verſus conjunctionem: et ſic orbita lunaris reſpectu ad ſolem, duas habet apſides in ſingulis revolutionibus ejus circa terram.

SECTIO SEXTA.

globi, et ſic fluet in alveo refluetque ad modum maris. Aqua, revolvendo circa globi centrum quieſcens, ſi tollatur attractio corporis *S*, nullum acquiret motum fluxus et refluxus. Par eſt ratio globi uniformiter progredientis in directum, et interea revolventis circa centrum ſuum (per legum corol. v.) ut et globi de curſu rectilineo uniformiter tracti, (per legum corol. 6.) Accedat autem corpus *S*, et ab ipſius inæquabili attractione mox turbabitur aqua. Etenim major erit attractio aquæ propioris, minor ea remotioris. Vis autem *LM* trahet aquam deorſum in quadraturis, facietque ipſam deſcendere uſque ad ſyzygias; et vis *KL* trahet eandem ſurſum in ſyzygiis, ſiſtetque deſcenſum ejus, et faciet ipſam aſcendere uſque ad quadraturas: niſi quatenus motus fluendi et refluendi ab alveo aquæ dirigatur, et per frictionem aliquatenus retardetur.

Corol. 20. Si annulus jam rigeat, et minuatur globus, ceſſabit motus fluendi et refluendi; ſed oſcillatorius ille inclinationis motus et præceſſio nodorum manebunt. Habeat globus eundem axem cum annulo, gyroſque compleat iiſdem temporibus, et ſuperficie ſua contingat ipſum interius, eique inhæreat; et participando motum ejus, compages utriuſque oſcillabitur, et nodi regredientur. Nam globus, ut mox dicetur, ad ſuſcipiendas impreſſiones omnes indifferens eſt. Annuli globo orbati maximus inclinationis angulus eſt, ubi nodi ſunt in ſyzygiis. Inde in progreſſu nodorum ad quadraturas conatur is inclinationem ſuam minuere, et iſto conatu motum imprimit globo toti. Retinet globus motum impreſſum, uſque dum annulus conatu contrario motum hunc tollat, imprimatque motum novum in contrariam partem: Atque hac ratione maximus decreſcentis inclinationis motus fit in quadraturis nodorum, et minimus inclinationis angulus in octantibus poſt quadraturas; dein maximus reclinationis motus in ſyzygiis, et maximus angulus in octantibus proximis. Et eadem eſt ratio globi annulo nudati, qui in regionibus æquatoris vel altior eſt paulo quam juxta polos, vel conſtat ex materia paulo denſiore. Supplet enim vicem annuli iſte materiæ in

æquatoris



x
a
l
x
A
L
S

Fig. 85.



f
d
m
a
n
g
u
c
r
Semita
Semita
D
A
N
C
B
K
L
H
F
Primary
Satellites
M
c
E
Z
V
O
S

Fig. 86.

æquatoris regionibus exceſſus (x). Et quanquam, aucta utcunque globi hujus vi centripeta, tendere ſupponantur omnes ejus partes deorſum, ad modum gravitantium partium telluris, tamen phænomena hujus et præcedentis corollarii vix inde mutabuntur; niſi quod loca maximarum et minimarum altitudinum aquæ diverſa erunt. Aqua enim jam in orbe ſuo ſuſtinetur et permanet, non per vim ſuam centrifugam, ſed per alveum in quo fluit. Et præterea vis *LM* trahit aquam deorſum maxime in quadraturis,

(x) 205. Hinc facile colligitur puncta æquinoctialia regredi ob actiones ſolis atque lunæ conjunctim. Ponamus enim planetam prope ſuperficiem telluris revolvi in orbita quæ ad orbitam, in quâ revolvitur tellus ipſa, inclinatur; tum, ſole vel lunâ in æquatore exiſtentibus, vis tota perturbatrix agit in plano æquatoris, nullamque mutationem inclinationis vel nodorum motum producet. In locis vero quæ nonaginta gradus a punctis æquinoctialibus diſtant, in tropicis ſcilicet, vis illa perturbatrix efficiet ut nodi regrediantur, motu vero minori ob diminutam planetæ diſtantiam. Idem eveniet ſi numerus planetarum ita augeatur, ut ſolidus ex his conflatus annulus terræ adhereat; velocitas vero regreſſionis minor erit ob quantitatem materiæ motum illum participantis; et regreſſionis motus adhuc minor erit, ſi tellus, altior quidem juxta æquatorem quam apud polos, formæ ſit ſpheroidicæ, ob diffuſam annuli materiam per ſuperficiem totam telluris. Quoniam igitur neque ſol neque luna in plano æquatoris moventur, patet, puncta æquinoctialia ob eorundem actiones regredi debere, et exinde annum tropicalem ſidereo eſſe minorem: ob cauſas vero ſupra memoratas, conſtabit nodorum motum fore lentiſſimum. Hicce vero motus, calculo prælongo inveſtigatus, motui ab aſtronomis deprehenſo (qui talis eſt ut puncta æquinoctialia totam revolutionem in annis 25000 peragerent) accurate reſpondet.

206. Majorem diametrum telluris per æquatorem tranſire, minorem vero per polos, colligi poteſt ex rotatione ejus diurnâ; ob vim enim centrifugam ex motu illo oriundam, niſi terra paulo altior eſſet ſub æquatorem quam apud polos, maria apud polos ſubſiderent, et juxta æquatorem aſcendendo ibi omnia inundarent.

207. Ex proportione vis centrifugæ ad vim gravitatis computum ineund invenit Newtonus, diametrum terræ apud æquatorem eſſe ad ipſius diametrum per polos, ut 230 ad 229: quod, comparatione diverſarum longitudinum pendulorum in diverſis latitudinibus minuta ſecunda oſcillantium inventum, obſervationibus aſtronomorum recentioribus mire convenire videmus.

208. Eodem argumento, ſi conſtitutio jovis eadem ſit ac noſtræ telluris, colligere licet, majorem adhuc inæqualitatem in diametris jovis inveniri debere, ob motum ejus diurnum ſpatio hor. 9. confectum; ita ut non mirum eſt, ſi ea ſit diametrorum jovis differentia quæ obſervationibus aſtronomicis comprobatur.

Sectio Sexta.

ris, et vis KL ſeu $NM—LM$ trahit eandem ſurſum maxime in ſyzygiis. Et hæ vires conjunctæ deſinunt trahere aquam deorſum et incipiunt trahere aquam ſurſum in octantibus ante ſyzygias, ac deſinunt trahere aquam ſurſum incipiuntque trahere aquam deorſum in octantibus poſt ſyzygias. Et inde maxima aquæ altitudo evenire poteſt in octantibus poſt ſyzygias, et minima in octantibus poſt quadraturas circiter; niſi quatenus motus aſcendendi vel deſcendendi ab his viribus impreſſus vel per vim inſitam aquæ paulo diutius perſeveret, vel per impedimenta alvei paulo citius ſiſtatur. (y)

Corol. 21.

(y) 209. *Fluxum et refluxum maris ab actionibus ſolis ac lunæ oriri.* Mare ſingulis diebus tam lunaribus quam ſolaribus bis intumeſcere debere ac bis defluere, patet per corol. 19. et 20. prop. XXXVIII. ut et aquæ maximam altitudinem, in maribus profundis et liberis, appulſum luminarium ad meridianum loci minori quam ſex horarum ſpatio ſequi, uti fit in maris *Atlantici* et *Æthiopici* tractu toto orientali inter *Galliam* et promontorium *Bonæ Spei*, ut et in maris *Pacifici* littore *Chilenſi* et *Peruviano*: in quibus omnibus littoribus æſtus in horam circiter ſecundam, tertiam vel quartam, incidit, niſi ubi motus, ab oceano profundo per loca vadoſa propagatus, uſque ad horam quintam, ſextam, ſeptimam aut ultra retardatur. Horas numero ab appulſu luminaris utriuſque ad meridianum loci, tam infra horizontem quam ſupra, et per horas diei lunaris intelligo vigeſimas quartas partes temporis quo luna motu apparente diurno ad meridianum loci revertitur. Vis ſolis vel lunæ ad mare elevandum maxima eſt in ipſo appulſu luminaris ad meridianum loci. Sed vis eo tempore in mare impreſſa manet aliquamdiu, et per vim novam ſubinde impreſſam augetur, donec mare ad altitudinem maximam aſcenderit; id quod fiet ſpatio horæ unius duarumve, ſed ſæpius ad littora ſpatio horarum trium circiter, vel etiam plurium ſi mare ſit vadoſum.

Motus autem bini, quos luminaria duo excitant, non cernentur diſtincte, ſed motum quendam mixtum efficient. In luminarium conjunctione vel oppoſitione conjungentur eorum effectus, et componetur fluxus et refluxus maximus. In quadraturis ſol attollet aquam ubi luna deprimit, deprimetque ubi luna attollit; et ex effectuum differentia æſtus omnium minimus orietur. Et quoniam, experientia teſte, major eſt effectus lunæ quam ſolis, incidet aquæ maxima altitudo in horam tertiam lunarem circiter. Extra ſyzygias et quadraturas, æſtus maximus qui ſola vi lunari incidere ſemper deberet in horam tertiam lunarem, et ſola ſolari in tertiam ſolarem, compoſitis viribus incidet in tempus aliquod intermedium quod tertiæ lunari propinquius eſt; ideoque in tranſitu lunæ a ſyzygiis ad quadraturas, ubi hora tertia ſolaris præcedit tertiam lunarem, maxima aquæ altitudo præcedet etiam tertiam lunarem, idque maximo in-

Corol. 21. Eadem ratione, qua materia globi juxta æquatorem redundans efficit ut nodi regrediantur, atque ideo per hujus incrementum augetur iſte regreſſus, per diminutionem vero diminuitur, et per ablationem tollitur; ſi materia pluſquam redundans tollatur, hoc eſt, ſi globus juxta æquatorem vel depreſſior reddatur, vel rarior quam juxta polos, orietur motus nodorum in conſequentia.

Corol. 22. Et inde viciſſim, ex motu nodorum innoteſcit conſtitutio globi. Nimirum ſi globus polos eoſdem conſtanter ſervat, et motus fit in antecedentia, matera juxtia æquatorem redundat; ſi in conſequentia, deficit. Pone globum uniformem et perfecte circinatum in ſpatiis liberis primo quieſcere; dein impetu quocunque

intervallo paulo poſt octantes lunæ; et paribus intervallis æſtus maximus ſequetur horam tertiam lunarem in tranſitu lunæ a quadraturis ad ſyzygias.

Hæc ita ſunt in mari aperto. Nam in oſtiis fluviorum fluxus majores cæteris paribus tardius ad ἀκμὴν venient.

Pendent autem effectus luminarium ex eorum diſtantiis a terra. In minoribus enim diſtantiis majores ſunt eorum effectus, in majoribus minores, idque in triplicata ratione diametrorum apparentium (per cor. 14). Igitur ſol tempore hyberno, in perigæo exiſtens, majores edit effectus, efficitque ut æſtus in ſyzygiis paulo majores ſint, et in quadraturis paulo minores (cæteris paribus) quam tempore æſtivo; et luna in perigæo ſingulis menſibus majores ciet æſtus quam ante vel poſt dies quindecim ubi in apogæo verſatur. Unde fit ut æſtus duo omnino maximi in ſyzygiis continuis ſe mutuo non ſequantur.

Pendet etiam effectus utriuſque luminaris ex ipſius declinatione ſeu diſtantia ab æquatore. Nam ſi luminare in polo conſtitueretur, traheret illud ſingulas aquæ partes conſtanter, ſine actionis intenſione et remiſſione, ideoque nullam motus reciprocationem cieret. Igitur luminaria recedendo ab æquatore polum verſus, effectus ſuos gradatim amittent, et propterea minores ciebunt æſtus in ſyzygiis ſolſtitialibus quam in æquinoctialibus. In quadraturis autem ſolſtitialibus majores ciebunt æſtus quam in quadraturis æquinoctialibus; eo quod lunæ jam in æquatore conſtitutæ effectus maxime ſuperat effectum ſolis. Incidunt igitur æſtus maximi in ſyzygias et minimi in quadraturas luminarium, circa tempora æquinoctii utriuſque. Et æſtum maximum in ſyzygiis comitatur ſemper minimus in quadraturis, ut experientia compertum eſt. Per minorem autem diſtantiam ſolis a terra, tempore hyberno quam tempore æſtivo, fit ut æſtus maximi et minimi ſæpius præcedant æquinoctium vernum quam ſequantur, et ſæpius ſequantur autumnale quam præcedant.

Pendent etiam effectus luminarium ex locorum latitudine. Deſignet *ApEP* tellurem aquis profundis undique coopertam; *C* centrum ejus; *P*, *p* polos; *AE* Tab. XII. Fig. 87.

Sectio Sexta.

cunque oblique in ſuperficiem ſuam facto propelli, et motum inde concipere partim circularem, partim in directum. Quoniam globus iſte ad axes omnes per centrum ſuum tranſeuntes indifferenter ſe habet, neque propenſior eſt in unum axem, unumve axis ſitum, quam in alium quemvis; perſpicuum eſt, quod is axem ſuum, axiſque inclinationem vi propria nunquam mutabit. Impellatur jam globus oblique, in eadem illa ſuperficiei parte, qua prius, impulſu quocunque novo; et cum citior vel ſerior impulſus effectum nil mutet, manifeſtum eſt, quod hi duo impulſus ſucceſſive impreſſi eundem producent motum, ac ſi ſimul impreſſi fuiſſent, hoc eſt, eundem, ac ſi globus vi ſimplici ex utroque (per legum corol. 2.) compoſita impulſus fuiſſet, atque ideo ſimplicem,

AE æquatorem; *F* locum quemvis extra æquatorem; *Ff* parallelum loci; *Dd* parallelum ei reſpondentem ex altera parte æquatoris; *L* locum quem luna tribus ante horis occupabat; *H* locum telluris ei perpendiculariter ſubjectum; *h* locum huic oppoſitum; *K*, *k* loca inde gradibus 90 diſtantia, *CH*, *Ch* maris altitudines maximas menſuratas a centro telluris: et *CK*, *Ck* altitudines minimas: et ſi axibus *Hh*, *Kk* deſcribatur ellipſis, deinde ellipſeos hujus revolutione circa axem majorem *Hh* deſcribatur ſphærois *HPKhpk*; deſignabit hæc figuram maris quam proxime, et erunt *CF*, *Cf*, *CD*, *Cd* altitudines maris in locis, *F*, *f*, *D*, *d*. Quinetiam ſi in præfata ellipſeos revolutione punctum quodvis *N* deſcribat circulum *NM*, ſecantem parallelos *Ff*, *Dd* in locis quibuſvis *R*, *T*, et æquatorem *AE* in *S*; erit *CN* altitudo maris in locis omnibus *R*, *S*, *T*, ſitis in hoc circulo. Hinc in revolutione diurna loci cujuſvis *F*, affluxus erit maximus in *F*, hora tertia poſt appulſum lunæ ad meridianum ſupra horizontem; poſtea defluxus maximus in ☋ hora tertia poſt occaſum lunæ; dein affluxus maximus in *f* hora tertia poſt appulſum lunæ ad meridianum infra horizontem; ultimo defluxus maximus in ☋ hora tertia poſt ortum lunæ; et affluxus poſterior in *f* erit minor quam affluxus prior in *F*. Diſtinguitur enim mare totum in duos omnino fluctus hemiſphæricos, unum in hemiſphærio *KHk* ad boream vergentem, alterum in hemiſphærio oppoſito *Khk*; quos igitur fluctum borealem et fluctum auſtralem nominare licet. Hi fluctus ſemper ſibi mutuo oppoſiti veniunt per vices ad meridianos locorum ſingulorum, interpoſito intervallo horarum lunarium duodecim. Cumque regiones boreales magis participant fluctum borealem, et auſtrales magis auſtralem, inde oriuntur æſtus alternis vicibus majores et minores, in locis ſingulis extra æquatorem, in quibus luminaria oriuntur et occidunt. Æſtus autem major, luna in verticem loci declinante, incidet in horam circiter tertiam poſt appulſum lunæ ad meridianum ſupra horizontem, et luna declinationem mutante vertetur in minorem. Et fluxuum differentia maxima incidet

ſimplicem, circa axem inclinatione datum. Et par eſt ratio impulſus ſecundi facti in locum alium quemvis in æquatore motus primi; ut et impulſus primi facti in locum quemvis in æquatore motus, quem impulſus ſecundus ſine primo generaret; atque ideo impulſuum amborum factorum in loca quæcunque: generabunt hi eundem motum circularem ac ſi ſimul et ſemel in locum in-

det in tempora ſolſtitiorum; præſertim ſi lunæ nodus aſcendens verſatur in principio arietis. Sic experientia compertum eſt, quod æſtus matutini tempore hyberno ſuperent veſpertinos et verſpertini tempore æſtivo matutinos, ad *Plymuthum* quidem altitudine quaſi pedis unius, ad *Briſtoliam* vero altitudine quindecim digitorum: obſervantibus *Colepreſſio* et *Sturmio*.

Motus autem hactenus deſcripti mutantur aliquantulum per vim illam reciprocationis aquarum, qua maris æſtus, etiam ceſſantibus luminarium actionibus, poſſet aliquamdiu perſeverare. Conſervatio hæcce motus impreſſi minuit differentiam æſtuum alternorum; et æſtus proxime poſt ſyzygias majores reddit, eoſque proxime poſt quadraturas minuit. Unde ſit ut æſtus alterni ad *Plymuthum* et *Briſtoliam* non multo magis differant ab invicem quam altitudine pedis unius vel digitorum quindecim; utque æſtus omnium maximi in iiſdem portubus, non ſint primi a ſyzygiis, ſed tertii. Retardantur etiam motus omnes in tranſitu per vada, adeo ut æſtus omnium maximi, in fretis quibuſdam et fluviorum oſtiis, ſint quarti vel etiam quinti a ſyzygiis.

Porro fieri poteſt ut æſtus propagetur ab oceano per freta diverſa ad eundem portum, et citius tranſeat per aliqua freta quam per alia: quo in caſu æſtus idem, in duos vel plures ſucceſſive advenientes diviſus, componere poſſit motus novos diverſorum generum. Fingamus æſtus duos æquales a diverſis locis in eundem portum venire, quorum prior præcedat alterum ſpatio horarum ſex, incidatque in horam tertiam ab appulſu lunæ ad meridianum portus. Si luna in hocce ſuo ad meridianum appulſu verſabatur in æquatore, venient ſingulis horis ſenis æquales affluxus, qui in mutuos refluxus incidendo eoſdem affluxibus æquabunt, et ſic ſpatio diei illius efficient ut aqua tranquille ſtagnet. Si luna tunc declinabat ab æquatore, fient æſtus in oceano vicibus alternis majores et minores, uti dictum eſt; et inde propagabuntur in hunc portum affluxus bini majores et bini minores, vicibus alternis. Affluxus autem bini majores component aquam altiſſimam in medio inter utrumque, affluxus major et minor faciet ut aqua aſcendat ad mediocrem altitudinem in medio ipſorum, et inter affluxus binos minores aqua aſcendet ad altitudinem minimam. Sic ſpatio viginti quatuor horarum, aqua non bis ut fieri ſolet, ſed ſemel tantum perveniet ad maximam altitudinem et ſemel ad minimam; et altitudo maxima, ſi luna declinat in polum ſupra horizontem loci, incidet in horam vel ſextam vel triceſimam ab appulſu lunæ ad meridianum, atque luna declinationem mutante mutabitur in defluxum. Quorum

SECTIO SEXTA.

interſectionis æquatorum motuum illorum, quos ſeorſim generarent, fuiſſent impreſſi. Globus igitur homogeneus et perfectus non retinet motus plures diſtinctos, ſed impreſſos omnes componit et ad unum reducit, et quatenus in ſe eſt, gyratur ſemper motu ſimplici et uniformi circa axem unicum, inclinatione ſemper invariabili datum. Sed nec vis centripeta inclinationem axis,

omnium exemplum in portu regni *Tunquini* ad *Batſham* ſub latitudine boreali 20^gr. 50′. *Halleius* ex nautarum obſervationibus patefecit. Ibi aqua die tranſitum lunæ per æquatorem ſequente ſtagnat, dein luna ad boream declinante incipit fluere et refluere, non bis, ut in aliis portubus, ſed ſemel ſingulis diebus; et æſtus incidit in occaſum lunæ, defluxus maximus in ortum. Cum lunæ declinatione augetur hic æſtus, uſque ad diem ſeptimum vel octavum, dein per alios ſeptem dies iiſdem gradibus decreſcit, quibus antea creverat; et luna declinationem mutante ceſſat, ac mox mutatur in defluxum. Incidit enim ſubinde defluxus in occaſum lunæ et affluxus in ortum, donec luna iterum mutet declinationem. Aditus ad hunc portum fretaque vicina duplex patet, alter ad oceano *Sinenſi* inter continentem et inſulam *Luconiam*, alter a mari *Indico* inter continentem et inſulam *Borneo*. An æſtus ſpatio horarum duodecim a mari *Indico* et ſpatio horarum ſex a mari *Sinenſi* per freta illa venientes, et ſic in horam tertiam et nonam lunarem incidentes, componant hujuſmodi motus; ſitne alia marium illorum conditio, obſervationibus vicinorum littorum determinandum relinquo.

210. Commodus hic nobis præbetur locus explicandi tranſitum a binis æſtubus, qui quotidie in regionibus extra circulos polares ſitis eveniunt, ad ſingulos æſtus, qui ſecundum Theoriam noſtram in regionibus polaribus contingere debent. Quoniam enim in zonis temperatis et torridâ quotidie duo fluxus obſervantur, in zonis frigidis autem unum tantum, tranſitio ſubitanea a binario ad unitatem maxime mirabilis ac paradoxa videri poſſet. Sed quia ſi fluxus bini ſucceſſivi inter ſe ſunt inæquales, refluxus aquæ ſeu maxima depreſſio fluxui minori eſt vicinior, bini æſtus quoque ſucceſſivi ratione temporis inter ſe erunt inæquales, ſi quidem voce æſtus intelligamus motum aquæ a ſumma elevatione ad imam depreſſionem uſque, ac viciſſim. Quo magis itaque ab æquatore verſus polos recedatur, eo major deprehendetur inter binos æſtus ſucceſſivos inæqualitas, cum ratione magnitudinis tum temporis, major enim diutius durabit quam minor, ambo vero ſimul ubique abſolventur tempore 12 horarum cum 24′ circiter: quod ſi itaque in eas regiones uſque perveniatur, in quibus luna utrâque vice vel ſuper horizonte vel ſub horizonte meridianum attingit, æſtus minor omnino evaneſcit, ſoluſque major ſupererit, qui tempus 12°, 24′ adimplebit. Ex quibus perſpicuum eſt, ſi luna habeat declinationem, inæqualitatem binorum æſtuum ſucceſſivorum ad polos accedendo continuo fieri majorem, atque tandem minorem omnino evaneſcere debere, quod cum evenit, bini æſtus in unum coaleſcunt.

axis, aut rotationis velocitatem mutare poteſt. Si globus plano quocunque, per centrum ſuum et centrum in quod vis dirigitur tranſeunte, dividi intelligatur in duo hemiſphæria; urgebit ſemper vis illa utrumque hemiſphærium æqualiter, et propterea globum, quoad motum rotationis, nullam in partem inclinabit. Addatur vero alicubi inter polum et æquatorem materia nova in formam montis cumulata, et hæc, perpetuo conatu recedendi a centro ſui motus, turbabit motum globi, facietque ut poli ejus errent per ipſius ſuperficiem, et circulos circum ſe punctumque ſibi oppoſitum perpetuo deſcribant. Neque corrigetur iſta vagationis enormitas, niſi locando montem illum vel in polo alterutro, quo in caſu (per corol. xxi.) nodi æquatoris progredientur; vel in æquatore, qua ratione (per corol. xx.) nodi regredientur; vel denique ex altera axis parte addendo materiam novam, qua mons inter movendum libretur, et hoc pacto nodi vel progredientur, vel recedent, perinde ut mons et hæcce nova materia ſunt vel polo vel æquatori propriores.

Sectio Sexta.

PROPOSITIO XXXIX. THEOREMA XXVIII.

Tab. XII. Fig. 88.

Poſitis iiſdem attractionum legibus, dico quod corpus exterius S, *circa interiorum* P, T *commune gravitatis centrum* O, *radiis ad centrum illud ductis, deſcribit areas temporibus magis proportionales et orbem ad formam ellipſeos umbilicum in centro eodem habentis magis accedentem, quam circa corpus intimum et maximum* T, *radiis ad ipſum ductis, deſcribere poteſt.*

Nam corporis *S* attractiones verſus *T* et *P* componunt ipſius attractionem abſolutam, quæ magis dirigitur in corporum *T* et *P* commune gravitatis centrum *O*, quam in corpus maximum *T*, quæque quadrato diſtantiæ *SO* magis eſt proportionalis reciproce, quam quadrato diſtantiæ *ST*: ut rem perpendenti facile conſtabit.

Sectio Sexta.

PROPOSITIO XL. THEOREMA XXIX.

Positis iisdem attractionum legibus, dico quod corpus exterius S, *circa interiorum* P *et* T *commune gravitatis centrum* O, *radiis ad centrum illud ductis, describit areas temporibus magis proportionales, et orbem ad formam ellipseos umbilicum in centro eodem habentis magis accedentem, si corpus intimum et maximum his attractionibus perinde atque cætera agitetur, quam si id vel non attractum quiescat, vel multo magis aut multo minus attractum aut multo magis aut multo minus agitetur.*

Demonstratur eodem fere modo cum prop. xxxviii. sed argumento prolixiore, quod ideo prætereo. Sufficeret rem sic æstimare. Ex demonstratione propositionis novissimæ liquet centrum, in quod corpus *S* conjunctis viribus urgetur, proximum esse communi centro gravitatis duorum illorum. Si coincideret hoc centrum cum centro illo communi, et quiesceret commune centrum gravitatis corporum trium; describerent corpus *S* ex una parte, et commune centrum aliorum duorum ex altera parte, circa commune omnium centrum quiescens, ellipses accuratas. Liquet hoc per corollarium secundum propositionis xxxii. collatum cum demonstratis in prop. xxxvi et xxxvii. Perturbatur iste motus ellipticus aliquantulum per distantiam centri duorum a centro, in quod tertium *S* attrahitur. Detur præterea motus communi trium centro, et augebitur perturbatio. Proinde minima est perturbatio, ubi commune trium centrum quiescit; hoc est, ubi corpus intimum et maximum *T* lege cæterorum attrahitur: fitque major semper, ubi trium commune illud centrum, minuendo motum corporis *T*, moveri incipit, et magis deinceps magisque agitatur.

Corol. Et hinc, si corpora plura minora revolvantur circa maximum, colligere licet quod orbitæ descriptæ propius accedent ad ellip-

ellipticas, et arearum deſcriptiones fient magis æquabiles, ſi corpora omnia viribus acceleratricibus, quæ ſunt ut eorum vires abſolutæ directe et quadrata diſtantiarum inverſe, ſe mutuo trahant agitentque, et orbitæ cujuſque umbilicus collocetur in communi centro gravitatis corporum omnium interiorum (nimirum umbilicus orbitæ primæ et intimæ in centro gravitatis corporis maximi et intimi; ille orbitæ ſecundæ, in communi centro gravitatis corporum duorum intimorum; iſte tertiæ, in communi centro gravitatis trium interiorum; et ſic deinceps) quam ſi corpus intimum quieſcat et ſtatuatur communis umbilicus orbitarum omnium.

Deſcripſimus jam ſyſtema ſolis, terræ, lunæ, et planetarum: ſupereſt ut de cometis nonnulla adjiciantur.

LEMMA XIII.

Cometas eſſe luna ſuperiores et in regione planetarum verſari.

Ut defectus parallaxeos diurnæ extulit cometas ſupra regiones ſublunares, ſic ex parallaxi annua convincitur eorum deſcenſus in regiones planetarum. Nam cometæ, qui progrediuntur ſecundum ordinem ſignorum, ſunt omnes ſub exitu apparitionis aut ſolito tardiores aut retrogradi, ſi terra eſt inter ipſos et ſolem; at juſto celeriores ſi terra vergit ad oppoſitionem. Et contra, qui pergunt contra ordinem ſignorum ſunt juſto celeriores in fine apparitionis, ſi terra verſatur inter ipſos et ſolem; et juſto tardiores vel retrogradi, ſi terra ſita eſt ad contrarias partes. Contingit hoc maxime ex motu terræ in vario ipſius ſitu, perinde ut fit in planetis, qui pro motu terræ vel conſpirante vel contrario nunc retrogradi ſunt, nunc tardius progredi videntur, nunc vero celerius. Si terra pergit ad eandem partem cum cometa, et motu angulari circa ſolem tanto celerius fertur, ut recta per terram et cometam perpetuo ducta convergat ad partes ultra cometam, cometa e terra ſpectatus ob motum ſuum tardiorem apparet eſſe retro-

Sectio Sexta.

trogradus; ſin terra tardius fertur, motus cometæ (detracto motu terræ) fit ſaltem tardior. At ſi terra pergit in contrarias partes, cometa exinde velocior apparet. Ex acceleratione autem vel retardatione vel motu retrogrado diſtantia cometæ in hunc modum colligitur. Sunto ♈ ♌*A*, ♈ ♌*B*, ♈ ♌*C* obſervatæ tres longitudines cometæ ſub initio motus, ſitque ♈ ♌*F* longitudo ultimo obſervata, ubi cometa videri deſinit. Agatur recta *ABC*, cujus partes *AB*, *BC* rectis ♌*A* et ♌*B*, ♌*B* et ♌*C* interjectæ, ſint ad invicem ut tempora inter obſervationes tres primas. Producatur *AC* ad *G*, ut ſit *AG* ad *AB* ut tempus inter obſervationem primam et ultimam ad tempus inter obſervationem primam et ſecundam, et jungatur ♌*G*. Et ſi cometa moveretur uniformiter in linea recta, atque terra vel quieſceret, vel etiam in linea recta uniformi cum motu progrederetur; foret angulus ♈ ♌*G* longitudo cometæ tempore obſervationis ultimæ. Angulus igitur *F*♌*G*, qui longitudinum differentia eſt, oritur ab inæqualitate motuum cometæ ac terræ. Hic autem angulus, ſi terra et cometa in contrarias partes moventur, additur angulo ♈ ♌*G*, et ſic motum apparentem cometæ velociorem reddit: ſin cometa pergit in eaſdem partes cum terra, eidem ſubducitur, motumque cometæ vel tardiorem reddit, vel forte retrogradum; uti modo expoſui. Oritur igitur hic angulus præcipue ex motu terræ, et idcirco pro parallaxi cometæ merito habendus eſt, neglecto videlicet ejus incremento vel decremento nonnullo, quod a cometæ motu inæquabili in orbe proprio oriri poſſit. Diſtantia vero cometæ ex hac parallaxi ſic colligitur. Deſignet *S* ſolem, *acT* orbem magnum, *a* locum terræ in obſervatione prima, *c* locum terræ in obſervatione tertia, *T* locum terræ in obſervatione ultima, et *T*♈ lineam rectam verſus principium arietis ductam. Sumatur angulus ♈ *TV* æqualis angulo ♈ ♌*F*, hoc eſt, æqualis longitudini cometæ ubi terra verſatur in *T*. Jungatur *ac*, et producatur ea ad *g*, ut ſit *ag* ad *ac* ut *AG* ad *AC*, et erit *g* locus quem terra tempore obſervationis ultimæ, motu in recta *ac* uniformiter continuato, attingeret. Ideoque ſi ducatur *g* ♈ ipſi *T*♈ parallela, et capiatur augulus ♈ *gV* angulo ♈ ♌*G* æqualis, erit hic angulus ♈ *gV* æqualis longitudini co-

Tab. XII. Fig. 89.

Tab. XII. Fig. 89, 90.

cometæ e loco g ſpectati; et angulus TVg parallaxis erit, quæ oritur a tranſlatione terræ de loco g in locum T: ac proinde V locus erit cometæ in plano eclipticæ. Hic autem locus V orbe *Jovis* inferior eſſe ſolet.

Idem colligitur ex curvatura viæ cometarum. Pergunt hæc corpora propemodum in circulis maximis quamdiu moventur celerius; at in fine curſus, ubi motus apparentis pars illa, quæ a parallaxi oritur, majorem habet proportionem ad motum totum apparentem, deflectere ſolent ab his circulis, et quoties terra movetur in unam partem, abire in partem contrariam. Oritur hæc deflexio maxime ex parallaxi, propterea quod reſpondet motui terræ; et inſignis ejus quantitas, meo computo, collocavit diſparentes cometas ſatis longe infra jovem. Unde conſequens eſt quod in perigæis et periheliis, ubi propius adſunt, deſcendunt ſæpius infra orbes martis et inferiorum planetarum.

Confirmatur etiam propinquitas cometarum ex luce capitum. Nam corporis cœleſtis a ſole illuſtrati et in regiones longinquas abeuntis, diminuitur ſplendor in quadruplicata ratione diſtantiæ: in duplicata ratione videlicet ob auctam corporis diſtantiam a ſole, et in alia duplicata ratione ob diminutam diametrum apparentem. Unde ſi detur et lucis quantitas et apparens diameter cometæ, dabitur diſtantia, dicendo quod diſtantia ſit ad diſtantiam planetæ, in ratione diametri ad diametrum directe et ratione ſubduplicata lucis ad lucem inverſe. Sic minima capillitii cometæ anni 1682 diameter, per tubum opticum ſexdecim pedum a *Flamſtedio* obſervata et micrometro menſurata, æquabat $2'.\ 0''$; nucleus autem ſeu ſtella in medio capitis vix decimam partem latitudinis hujus occupabat, ideoque lata erat tantum $11''$ vel $12''$; Luce vero et claritate capitis ſuperabat caput cometæ anni 1680, ſtellaſque primæ vel ſecundæ magnitudinis æmulabatur. Ponamus ſaturnum cum annulo ſuo quaſi quadruplo lucidiorem fuiſſe: et quoniam lux annuli propemodum æquabat lucem globi intermedii, et diameter apparens globi ſit quaſi $21''$, ideoque lux globi et annuli conjunctim æquaret lucem globi, cujus diameter eſſet $30''$:

erit

SECTIO SEXTA.

erit diſtantia cometæ ad diſtantiam ſaturni ut 1 ad $\sqrt{4}$ inverſe, et 12″ ad 30″ directe, id eſt, ut 24 ad 30 ſeu 4 ad 5. Rurſus cometa anni 1665 menſe aprili, ut auctor eſt *Hevelius*, claritate ſua pene fixas omnes ſuperabat, quinetiam ipſum ſaturnum, ratione coloris videlicet longe vividioris. Quippe lucidior erat hic cometa altero illo, qui in fine anni præcedentis apparuerat, et cum ſtellis primæ magnitudinis conferabatur. Latitudo capillitii erat quaſi 6′, at nucleus cum planetis ope tubi optici collatus plane minor erat jove, et nunc minor corpore intermedio ſaturni, nunc ipſi æqualis judicabatur. Porro cum diameter capillitii cometarum raro ſuperet 8′ vel 12′, diameter vero nuclei, ſeu ſtellæ centralis ſit quaſi decima vel forte decima quinta pars diametri capillitii, patet ſtellas haſce ut plurimum ejuſdem eſſe apparentis magnitudinis cum planetis. Unde cum lux earum cum luce ſaturni non raro conferri poſſit, eamque aliquando ſuperet; manifeſtum eſt, quod cometæ omnes in periheliis vel infra ſaturnum collocandi ſint, vel non longe ſupra. Errant igitur toto cœlo, qui cometas in regionem fixarum prope ablegant: qua certe ratione non magis illuſtrari deberent a ſole noſtro, quam planetæ, qui hic ſunt, illuſtrantur a tellis fixis.

Hæc diſputavimus non conſiderando obſcurationem cometarum per fumum illum maxime copioſum et craſſum, quo caput circundatur, quaſi per nubem obtuſe ſemper lucens. Nam quanto obſcurius redditur corpus per hunc fumum, tanto proprius ad ſolem accedat neceſſe eſt, ut copia lucis a ſe reflexæ planetas æmuletur. Inde veriſimile fit cometas longe infra ſphæram ſaturni deſcendere, uti ex parallaxi probavimus. Idem vero quam maxime confirmatur ex caudis. Hæ vel ex reflexione fumi ſparſi per æthera, vel ex luce capitis oriuntur. Priore caſu minuenda eſt diſtantia cometarum, ne fumus a capite ſemper ortus per ſpatia nimis ampla incredibili cum velocitate et expanſione propagetur. In poſteriore referenda eſt lux omnis tam caudæ quam capillitii ad nucleum capitis. Igitur ſi concipiamus lucem hanc omnem congregari et intra diſcum nuclei coarctari, nucleus ille jam




Fig. 87




Fig. 88.




Fig. 89.




Fig. 90

jam certe, quoties caudam maximam et fulgentiſſimam emittit, jovem ipſum ſplendore ſuo multum ſuperabit. Minore igitur cum diametro apparente plus lucis emittens, multo magis illuſtrabitur a ſole, ideoque erit ſoli multo propior. Quinetiam capita ſub ſole deliteſcentia, et caudas cum maximas tum fulgentiſſimas inſtar trabium ignitarum nonnunquam emittentia, eodem argumento infra orbem veneris collocari debent. Nam lux illa omnis ſi in ſtellam congregari ſupponatur, ipſam venerem ne dicam veneres plures conjunctas quandoque ſuperaret.

Idem denique colligitur ex luce capitum creſcente in receſſu cometarum a terra ſolem verſus, ac decreſcente in eorum receſſu a ſole verſus terram. Sic enim cometa poſterior anni 1665 (obſervante *Hevelio*) ex quo conſpici cœpit, remittebat ſemper de motu ſuo apparente, ideoque præterierat perigæum; ſplendor vero capitis nihilominus indies creſcebat, uſque dum cometa radiis ſolaribus obtectus deſiit apparere. Cometa anni 1683 (obſervante eodem *Hevelio*) in fine menſis julii, ubi primum conſpectus eſt, tardiſſime movebatur, minuta prima 40 vel 45 circiter ſingulis diebus in orbe ſuo conficiens. Ex eo tempore motus ejus diurnus perpetuo augebatur uſque ad *Sept.* 4. quando evaſit graduum quaſi quinque. Igitur toto hoc tempore cometa ad terram appropinquabat. Id quod etiam ex diametro capitis micrometro menſurata colligitur: quippe quam *Hevelius* reperit *Aug.* 6. eſſe tantum 6′. 5″ incluſa coma, at *Sept.* 2. eſſe 9′. 7″. Caput igitur initio longe minus apparuit quam in fine motus, at initio tamen in vicinia ſolis longe lucidius extitit quam circa finem, ut refert idem *Hevelius*. Proinde toto hoc tempore, ob receſſum ipſius a ſole, quoad lumen decrevit, non obſtante acceſſu ad terram. Cometa anni 1618 circa medium menſis *Decembris*, et iſte anni 1680 circa finem ejuſdem menſis, celerrime movebantur, ideoque tunc erant in perigæis. Verum ſplendor maximus capitum contigit ante duas fere ſeptimanas, ubi modo exierant de radiis ſolaribus; et ſplendor maximus caudarum paulo ante, in majore vicinitate ſolis. Caput cometæ prioris, juxta obſervationes *Cyſati*, *Decemb.* 1. majus videbatur ſtellis primæ

 magui-

SECTIO SEXTA.

magnitudinis, et *Decemb.* 16. (jam in perigæo exiſtens) magnitudine parum, ſplendore ſeu claritate luminis plurimum defecerat. *Jan.* 7. *Keplerus* de capite incertus finem fecit obſervandi. Die 12 menſis *Decemb.* conſpectum et a *Flamſtedio* obſervatum eſt caput cometæ poſterioris in diſtantia novem graduum a ſole; id quod ſtellæ tertiæ magnitudinis vix conceſſum fuiſſet. *Decemb.* 15 et 17 apparuit idem ut ſtella tertiæ magnitudinis, diminutum utique ſplendore nubium juxta ſolem occidentem. *Decemb.* 26. velociſſime motus, inque perigæo propemodum exiſtens, cedebat ori pegaſi, ſtellæ tertiæ magnitudinis. *Jan.* 3. apparebat ut ſtella quartæ, *Jan.* 9. ut ſtella quintæ, *Jan.* 13. ob ſplendorem lunæ creſcentis diſparuit. *Jan.* 25. vix æquabat ſtellas magnitudinis ſeptimæ. Si ſumantur æqualia a perigæo hinc inde tempora, capita quæ temporibus illis in longinquis regionibus poſita, ob æquales a terra diſtantias, æqualiter lucere debuiſſent, in plaga ſolis maxime ſplenduere, ex altera perigæi parte evanuere. Igitur ex magna lucis in utroque ſitu differentia, concluditur magna ſolis et cometæ vicinitas in ſitu priore. Nam lux cometarum regularis eſſe ſolet, et maxima apparere ubi capita velociſſime moventur, atque ideo ſunt in perigæis; niſi quatenus ea major eſt in vicinia ſolis.

Corol. 1. Splendent igitur cometæ luce ſolis a ſe reflexa.

Corol. 2. Ex dictis etiam intelligitur cur cometæ tantopere frequentant regionem ſolis. Si cernerentur in regionibus longe ultra ſaturnum, deberent ſæpius apparere in partibus ſoli oppoſitis. Forent enim terræ viciniores, qui in his partibus verſarentur; et ſol interpoſitus obſcuraret cæteros. Verum percurrendo hiſtorias cometarum, reperi quod quadruplo vel quintuplo plures detecti ſunt in hemiſphærio ſolem verſus, quam in hemiſphærio oppoſito, præter alios proculdubio non paucos, quos lux ſolaris obtexit. Nimirum in deſcenſu ad regiones noſtras neque caudas emittunt, neque adeo illuſtrantur a ſole, ut nudis oculis ſe prius detegendos exhibeant, quam ſint ipſo jove propriores. Spatii autem tantillo intervallo circa ſolem deſcripti pars longe major ſita

eſt

eſt a latere terræ, quod ſolem reſpicit; inque parte illa majore cometæ, ſoli ut plurimum viciniores, magis illuminari ſolent.

Corol. 3. Hinc etiam manifeſtum eſt, quod cœli reſiſtentia deſtituuntur. Nam cometæ vias obliquas et nonnunquam curſui planetarum contrarias ſecuti, moventur omnifariam liberrime, et motus ſuos, etiam contra curſum planetarum diutiſſime conſervant. Fallor ni genus planetarum ſint, et motu perpetuo in orbem redeant. Nam quod ſcriptores aliqui meteora eſſe volunt, argumentum a capitum perpetuis mutationibus ducentes, fundamento carere videtur. Capita cometarum atmoſphæris ingentibus cinguntur; et atmoſphæræ inferne denſiores eſſe debent. Unde nubes ſunt, non ipſa cometarum corpora, in quibus mutationes illæ viſuntur. Sic terra ſi e planetis ſpectaretur, luce nubium ſuarum procul dubio ſplenderet, et corpus firmum ſub nubibus prope deliteſceret. Sic cingula jovis in nubibus planetæ illius formata ſunt, quæ ſitum mutant inter ſe, et firmum jovis corpus per nubes illas difficilius cernitur. Et multo magis corpora cometarum ſub atmoſphæris et profundioribus et craſſioribus abſcondi debent.

PROPOSITIO. XLI. THEOREMA. XXX.

Cometas in ſectionibus conicis umbilicos in centro ſolis habentibus moveri, et radiis ad ſolem ductis areas temporibus proportionales deſcribere.

Patet per corol. 1. prop. xv. collatum cum notâ (157).

Corol. 1. Hinc ſi cometæ in orbem redeunt; orbes erunt ellipſes, et tempora periodica erunt ad tempora periodica planetarum in axium principalium ratione ſeſquiplicata. Ideoque cometæ maxima ex parte ſupra planetas verſantes, et eo nomine orbes axibus majoribus deſcribentes, tardius revolventur. Ut ſi axis orbis cometæ ſit quadruplo major axe orbis ſaturni, tempus revolutionis cometæ erit ad tempus revolutionis ſaturni, id eſt, ad annos 30, ut 4 $\sqrt{}$ 4 (ſeu 8) ad 1, ideoque erit annorum 240.

Corol. 2.

SECTIO SEXTA.

Corol. 2. Orbes autem erunt parabolis adeo finitimi, ut eorum vice parabolæ ſine erroribus ſenſibilibus adhiberi poſſint.

Corol. 3. Et propterea (per corol. 7. prop. xviii) velocitas cometæ omnis, erit ſemper ad velocitatem planetæ cujuſvis circa ſolem in circulo revolventis, in ſubduplicata ratione duplæ diſtantiæ planetæ a centro ſolis, ad diſtantiam cometæ a centro ſolis quamproxime. Ponamus radium orbis magni, ſeu ellipſeos in qua terra revolvitur ſemidiametrum maximam eſſe partium 100000000: et terra motu ſuo diurno mediocri deſcribet partes 1720212, et motu horario partes $71675\frac{1}{2}$. Ideoque cometa in eadem telluris a ſole diſtantia mediocri, ea cum velocitate quæ ſit ad velocitatem telluris ut $\sqrt{2}$ ad 1, deſcribet motu ſuo diurno partes 2432747, et motu horario partes $101364\frac{1}{2}$. In majoribus autem vel minoribus diſtantiis, motus tum diurnus tum horarius erit ad hunc motum diurnum et horarium in ſubduplicata ratione diſtantiarum reciproce, ideoque datur.

Corol. 4. Unde ſi latus rectum parabolæ quadruplo majus ſit radio orbis magni, et quadratum radii illius ponatur eſſe partium 100000000: area quam cometa radio ad ſolem ducto ſingulis diebus deſcribit, erit partium $1216373\frac{1}{2}$, et ſingulis horis area illa erit partium $50682\frac{1}{4}$. Sin latus rectum majus ſit vel minus in ratione quavis, erit area diurna et horaria major vel minor in eadem ratione ſubduplicata.

FINIS.